圖書集成醫部全錄

第二十冊

滯下門　大小便門　淋濁遺精門

通俗圖書刊行社刊行
會文堂新記書局發行

欽定古今圖書集成醫部全錄第三十册目錄

卷二百五十九彙考二百五十九

滯下門一……一

黃帝素問……一

㈠至眞要大論—一 ㈡氣厥論—二 ㈢著至教論—二 ㈣陰陽別論—二 ㈤通評虛實論—二 ㈥大奇論—三 ㈦脈要精微論—三 ㈧太陰陽明篇—四 ㈨六元正紀大論—四

靈樞經……四

㈠經脈篇—四

扁鵲難經……四

㈠滯下—四

張機金匱要略……五

㈠滯下膿血—五

華佗中藏經……五

中国科学院图书室藏 植物研究所

6513132

局方發揮……一九
㈠滯下辨論—一九
羅天益衞生寶鑑……一九
㈠論治法—一九
虞摶醫學正傳……二〇
㈠總論—二〇
戴思恭證治要訣……二〇
㈠論治法—二一
樓英醫學綱目……二二
㈠運氣爲病—二二

卷二百六十彙考二百六十

滯下門二……二五
王綸明醫雜著……二五
㈠痢疾—二五
李梴醫學入門……二六

孫思邈千金方……五
㈠論臟腑虛實寒熱生死—五
楊登父直指方……七
㈠熱冷痟蝕諸痢論—五
嚴用和濟生方……八
㈠痢病證治—七
劉完素六書……八
㈠痢疾—八
張從政儒門事親……一二
㈠滯下—八
李杲十書……一三
㈠論痢—一三
朱震亨心法……一四
㈠腸澼下血論—一三
平治會粹……一七
㈠痢病—一四　㈡治法—一五
㈠滯下辨論—一七

滯下門三……五一
方一……五一
(一)桃花湯—五一 (二)桃花丸—五一 (三)金寶神丹—五一 (四)甘露丸—五一 (五)白頭翁湯—五二
(六)四製黃連丸—五二 (七)薑連散—五二 (八)香連丸—五二 (九)變通丸—五二 (十)勝金丸—五二
(十一)返魂丹—五二 (十二)艾薑丸—五三 (十三)二靈散—五三 (十四)萸芩丸—五三 (十五)獨聖丸—五三 (十六)退陰散—五三 (十七)百歲丸—五三 (十八)青六丸—五三 (十九)戊己丸—五四 (二十)二色丸—五四 (二一)調氣飲—五四 (二二)膠蠟湯—五四 (二三)黑牛散—五四 (二四)黃連阿膠丸—五四 (二五)苦參橘皮丸—五四 (二六)又方—五四 (二七)龍骨丸—五五 (二八)又方—五五 (二九)又方—五五 (三十)又方—五五 (三一)又方—五五 (三二)白頭翁湯—五五 (三三)又方—五六 (三四)茯苓湯—五六 (三五)溫脾湯—五六 (三六)黃連湯—五六 (三七)女萎圓—五六 (三八)聖湯—五六 (三九)溫脾湯—五七 (四十)健脾圓—五七 (四一)增損健脾圓—五七 (四二)駐車圓—五七 (四三)大桃花湯—五七 (四四)又方—五七 (四五)附子湯—五八 (四六)馬藺子圓—五八 (四七)倉米湯—五八
(四八)疳痢方—五八 (四九)灌方—五八 (五十)又方—五九 (五一)又方—五九 (五二)又祕方—五九 (五三)又方—五九 (五四)又方—五九 (五五)越桃散—六〇 (五六)香豉湯—六〇 (五七)黃芩芍藥湯—六〇 (五八)大黃湯—六〇
(五九)芍藥湯—六〇 (六十)白朮黃芪湯—六〇 (六一)導氣湯—六一 (六二)地榆芍藥湯—六一 (六三)益元散—六一 (六四)元青丸—六一 (六五)阿膠梅連丸—六一 (六六)牛黃神金丸—六二 (六七)芍藥蘗皮丸—六二
(六八)杏仁丸—六二 (六九)痢方—六二 (七十)閙板丹—六二 (七一)升陽去熱和血湯—六二 (七二)涼血地黃湯—六三 (七三)白朮安胃散—六三 (七四)聖餅子—六三 (七五)當歸和血散—六三 (七六)訶黎勒丸—六三 (七七)訶子皮散—六三 (七八)益智和中湯—六四 (七九)槐花散—六四 (八十)茯苓湯—六四 (八一)黑圓子—六四

㈠病因—二八　㈡裏急腹痛後重—二九　㈢辨五色—二九　㈣審七情—三〇　㈤虛勞—三〇　㈥休息—三〇　㈦蠱疰—三〇　㈧治法—三一　㈨愈後—三一　㈩辨似—三一

李中梓醫宗必讀……三一

㈠總論—三一　㈡證治—三三　㈢死證—三四　㈣脈候—三四

王肯堂證治準繩……三四

㈠滯下—三四

趙獻可醫貫……三五

㈠痢病—三五

喻昌醫門法律……三八

㈠痢疾論—三八　㈡律三條—四〇

張介賓景岳全書……四一

㈠論證—四一　㈡論虛實—四一　㈢論寒熱—四二　㈣論積垢—四二　㈤論五色—四三　㈥論腹痛—四三　㈦論裏急後重—四四　㈧論大孔腫痛—四四　㈨論口渴—四五　㈩論小水—四五　⑪論陰陽疑似—四六　⑫論治—四七

陳士鐸石室祕籙……四八

㈠痢病治法—四八

卷二百六十一彙考二百六十一

(一四八)玉抱肚－七七　(一四九)軟紅丸－七七　(一五〇)豆蔻丸－七七　(一五一)雲母散－七七　(一五二)金星鱔散－七八
(一五三)蕪荑丸－七八　(一五四)香粟散－七八　(一五五)五奇湯－七八　(一五六)麥蘖丸－七八　(一五七)茯苓湯－七八　(一五八)消痞丸－七八
(一五九)猪肝丸－七九　(一六〇)倉廩湯－七九　(一六一)參苓白朮散－七九　(一六二)通神丸－七九　(一六三)三奇散－七九
(一六四)白朮聖散子－七九　(一六五)下痢方－七九　(一六六)經驗三根飲－八〇　(一六七)右歸飲－八〇
(一六八)加減一陰煎－八〇　(一六九)赤金豆－八〇　(一七〇)百順丸－八〇　(一七一)保陰煎－八〇　(一七二)大分清飲－八一
(一七三)清流飲－八一　(一七四)六味回陽飲－八一　(一七五)理陰煎－八一　(一七六)温胃飲－八一　(一七七)五君子煎－八二
(一七八)胃關煎－八二　(一七九)佐關煎－八二　(一八〇)抑扶煎－八二　(一八一)四維散－八二　(一八二)五德丸－八二
(一八三)復陽丹－八二　(一八四)九炁丹－八三　(一八五)聖朮煎－八三

卷二百六十三彙考二百六十三

滯下門五……八五
單方……八五
鍼灸……九八
導引……九九
醫案……一〇〇

卷二百六十四彙考二百六十四

(八二)烏梅圓—六四　(八三)當歸圓—六五　(八四)香茸圓—六五　(八五)茜根圓—六五　(八六)木香檳榔丸—六五　(八七)調胃承氣湯—六五　(八八)和中丸—六五　(八九)水煮木香膏—六六

卷二百六十二彙考二百六十二……六七

滯下門四……六七

方二……

(九〇)導滯湯—六七　(九一)香連丸—六七　(九二)加味香連丸—六七　(九三)四味香連丸—六八　(九四)六神丸—六八　(九五)加味清六丸—六八　(九六)古薑墨丸—六八　(九七)感應丸—六八　(九八)神效丸—六九　(九九)養臟湯丸—六九　(一〇〇)黃連補腸湯—六九　(一〇一)百中散—六九　(一〇二)氣痢丸—六九　(一〇三)胃風湯—六九　(一〇四)地榆散—六九　(一〇五)聖散子—七〇　(一〇六)水煮木香丸—七〇　(一〇七)黃連阿膠丸—七〇　(一〇八)地榆散—七〇　(一〇九)蒼朮芍藥湯—七〇　(一一〇)露宿湯—七〇　(一一一)木香豆蔻丸—七〇　(一一二)纏金丹—七一　(一一三)白朮調中丸—七一　(一一四)治痢仙方—七一　(一一五)斷痢散—七一　(一一六)六神散—七一　(一一七)如聖散—七二　(一一八)痢藥乳香散—七二　(一一九)遇仙立效散—七二　(一二〇)犀角丸—七二　(一二一)聖棗子—七二　(一二二)眞方聖散子—七三　(一二三)苦蔞散—七三　(一二四)止痢法—七三　(一二五)百歲丸—七三　(一二六)玉粉散—七三　(一二七)木香散—七三　(一二八)葛根湯—七四　(一二九)木香散—七四　(一三〇)歸連丸—七四　(一三一)附子散—七四　(一三二)加減當歸地榆散—七四　(一三三)和中散—七四　(一三四)楊子建萬全護命方—七五　(一三五)還眞散—七五　(一三六)十寶湯—七五　(一三七)外灸膏—七五　(一三八)五神散—七五　(一三九)黃芪散—七六　(一四〇)犀角散—七六　(一四一)黃連丸—七六　(一四二)生地黃湯—七六　(一四三)鬱金散—七六　(一四四)如聖湯—七六　(一四五)艾葉丸—七六　(一四六)赤白痢方—七七　(一四七)安和飲子—七七

㈠大便—一二九 ㈡小便—一三〇 ㈢遺尿—一三一
劉完素六書……一三一
㈠大小便祕澀—一三一
李杲十書……一三二
㈠結燥論—一三二 ㈡關則不得小便—一三二 ㈢酒毒小便赤澀宜五苓散—一三二
王履泝洄集……一三三
㈠小便原委論—一三三
朱震亨心法……一三三
㈠燥結—一三三 ㈡脾約丸論—一三四 ㈢論通大便禁忌—一三四 ㈣小便不禁—一三四 ㈤小便不通—一三五
虞摶醫學正傳……一三六
㈠祕結論—一三六 ㈡小便赤澀—一三六
戴思恭證治要訣……一三七
㈠大便祕—一三七 ㈡閉癃—一三八 ㈢頻數遺尿—一三八
王綸明醫雜著……一三九
㈠不禁頻數—一三九
樓英醫學綱目……一三九

大小便門一

大小便門一……一〇九

黃帝素問……一〇九

㈠陰陽應象大論—一〇九　㈡玉機眞臟論—一〇九　㈢標本病傳論—一〇九　㈣奇病論—一一〇　㈤厥論—一一二　㈥靈蘭祕典論—一一二　㈦五臟別論—一一三　㈧氣厥論—一一三　㈨五常政大論—一一三　⑩宣明五氣論—一一三　⑪六元正紀大論—一一三　⑫調經論—一一三　⑬至眞要大論—一一三　⑭刺熱篇—一一四

靈樞經……一一四

㈠邪氣臟腑病形篇—一一四　㈡營衛生會篇—一一五　㈢經脈篇—一一五　㈣五癃津液別篇—一一六　㈤五味篇—一一六　㈥九鍼篇—一一六

張機金匱要略……一一六

㈠大便難—一一六　㈡小便數—一一七　㈢小便不利—一一七

王叔和脈訣……一一八

㈠大小便病脈—一一八

孫思邈千金方……一一九

㈠閉塞—一一九

朱肱活人書……一一九

(一)大便燥結—一四四　(二)小便不通—一四四

方一……………………………………………………一四五

(一)麻仁丸—一四五　(二)麻仁丸—一四五　(三)皂角丸—一四六　(四)疎風散—一四六　(五)枳殼丸—一四六　(六)二仁丸—一四六　(七)半硫丸—一四六　(八)六磨湯—一四七　(九)活血潤腸丸—一四七　(一〇)橘杏丸—一四七　(一一)蘇麻粥—一四七　(一二)小通氣散—一四七　(一三)大承氣湯—一四七　(一四)小承氣湯—一四七　(一五)大黃飲子—一四七　(一六)威靈仙丸—一四八　(一七)蓯蓉潤腸丸—一四八　(一八)導滯通幽湯—一四八　(一九)益血丹—一四八　(二〇)五仁丸—一四八　(二一)黃芪湯—一四八　(二二)益血潤腸丸—一四九　(二三)木香和中丸—一四九　(二四)神功丸—一四九　(二五)潤腸丸—一四九　(二六)三白散—一四九　(二七)萬全木通散—一五〇　(二八)茯苓琥珀散—一五〇　(二九)平補丸—一五〇　(三〇)八正散—一五〇　(三一)淸肺散—一五〇　(三二)導氣除燥湯—一五〇　(三三)導赤丸—一五〇　(三四)地膚子湯—一五〇　(三五)宣氣散—一五一　(三六)通關丸—一五一　(三七)猪苓湯—一五一　(三八)透泉散—一五一　(三九)二石散—一五一　(四〇)蒲黃散—一五一　(四一)滑石散—一五一　(四二)葱白湯—一五一　(四三)徐長卿湯—一五二　(四四)倒換散—一五二　(四五)通關散—一五二　(四六)縮泉丸—一五二　(四七)五子丸—一五二　(四八)家韭子丸—一五二　(四九)參芪湯—一五三　(五〇)雞膍胵散—一五三　(五一)大菟絲子丸—一五三　(五二)茸香丸—一五三　(五三)旣濟丸—一五三　(五四)煨腎丸—一五三　(五五)蒲灰散—一五三　(五六)滑石白魚散—一五四　(五七)茯苓戎鹽湯—一五四　(五八)猪苓湯—一五四　(五九)葵子散—一五四　(六〇)二黃湯—一五四　(六一)五柔丸—一五四　(六二)大五柔丸—一五四　(六三)濡臟湯—一五四　(六四)又方—一五五　(六五)芒硝丸—一五五　(六六)又方—一五五　(六七)又方—一五五　(六八)又方—一五五　(六九)暖腎丸—一五五　(七〇)琥珀散—一五六　(七一)檳榔散—一五六　(七二)通幽湯—一五六　(七三)潤燥湯—一五六　(七四)升陽瀉濕湯—一五六　(七五)潤腸湯—一五六　(七六)白飛霞自製天一丸—一五六　(七七)又方—一五七　(七八)通關丸—一五七　(七九)又方—一五七

㊀閉癃—一二九　㊁不利—一二九
李梴醫學入門……一三〇
㊀大便燥結—一三〇　㊁小便不通—一三一　㊂小便不禁—一三一
李中梓醫宗必讀……一三一
㊀大便不通—一三二　㊁小便閉癃—一三二　㊂小便不禁—一三三　㊃傷寒小便不通—一三四　㊄
傷寒小便數—一三四
薛己醫案……一三四
㊀小便證治—一三四

卷二百六十五彙考二百六十五

大小便門二……一三七
趙獻可醫貫……一三七
㊀大便不通—一三七　㊁小便不通幷不禁論—一三八
張介賓景岳全書……一四〇
㊀癃閉論證—一四〇　㊁論治—一四一　㊂遺溺不禁論證—一四二　㊃論治—一四三
陳士鐸石室祕錄……一四四

卷二百六十七彙考二百六十七
大小便門四……一七九
鍼灸……一七九
導引……一八三
醫案……一八四
卷二百六十八彙考二百六十八
淋濁遺精門一……一九三
黃帝素問……一九三
㈠六元正紀大論一一九三　㈡生氣通天論一一九三
靈樞經……一九三
㈠本神篇一一九三
張機金匱要略……一九四
㈠淋一一九四　㈡失精一一九四
華佗中藏經……一九四

(80)草蜜湯—一五七　(81)蒲黃湯—一五七

卷二百六十六彙考二百六十六……一五九

大小便門三……一五九

方二……

(82)王瓜散—一五九　(83)黃連阿膠丸—一五九　(84)調氣散—一五九　(85)二香丸—一五九　(86)潤腸湯—一六〇　(87)檳榔丸—一六〇　(88)牛黃散—一六〇　(89)三仁丸—一六〇　(90)小提盆散—一六〇　(91)枳殼丸—一六〇　(92)通心飲—一六〇　(93)肉蓯蓉丸—一六〇　(94)茯苓琥珀湯—一六一　(95)通關瞿麥湯—一六一　(96)又方—一六一　(97)獨蒜塗臍方—一六一　(98)牛膝湯—一六一　(99)猪肚丸—一六一　(100)雞胵丸—一六二　(101)水芝丸—一六二　(102)雙白丸—一六二　(103)二氣丹—一六二　(104)茯苓丸—一六二　(105)桑螵蛸散—一六二　(106)鹿角霜丸—一六二　(107)牡蠣丸—一六三　(108)雞腸散—一六三　(109)固脬丸—一六三　(110)又方—一六三　(111)澤瀉散—一六三　(112)又方—一六三　(113)阿膠飲—一六四　(114)白薇散—一六四　(115)白茯苓散—一六四　(116)鹿茸散—一六四　(117)鹿茸散—一六四　(118)菟絲子散—一六四　(119)又方—一六五　(120)左歸飲—一六五　(121)右歸飲—一六五　(122)六安煎—一六五　(123)抽薪飲—一六五　(124)大分清飲—一六五　(125)化陰煎—一六五　(126)菉豆飲—一六六　(127)大補元煎—一六六　(128)四味回陽飲—一六六　(129)六味回陽飲—一六六　(130)五君子煎—一六六　(131)溫胃飲—一六六　(132)四維散—一六六　(133)鞏隄丸—一六七

單方……一六七

李梴醫學入門……二〇四
㈠五淋一二〇五 ㈡赤白濁一二〇七、㈢夢遺一二〇七
李中梓醫宗必讀……二〇八
㈠諸淋證治一二〇九 ㈡脈候一二一〇 ㈢遺精一二一〇 ㈣濁一二一一
王肯堂證治準繩……二一一
㈠淋一二一二 ㈡赤白濁一二一三 ㈢遺精一二一三
趙獻可醫貫……二一六
㈠夢遺精滑論一二一六
張介賓景岳全書……二一七
㈠淋濁論證一二一七 ㈡論治一二一八 ㈢遺精論證一二一九 ㈣論治一二二〇
陳士鐸石室祕錄……二二〇
㈠石淋一二二〇 ㈡遺精一二二一

卷二百六十九彙考二百六十九

淋濁遺精門二……二二三
方……二二三

㈠論淋瀝小便不利—一九五

王叔和脈訣……一九五

㈠遺精淋病脈—一九五

孫思邈千金方……一九六

㈠淋閉—一九六

劉完素六書……一九六

㈠淋—一九六　㈡小便渾濁—一九七　㈢虛勞爲白淫—一九七

李杲十書……一九七

㈠小便淋閉論—一九七

朱震亨心法……一九八

㈠淋—一九八　㈡赤白濁—一九九　㈢夢遺—二〇〇

戴思恭證治要訣……二〇〇

㈠淋—二〇〇　㈡白濁—二〇二　㈢遺精—二〇三

樓英醫學綱目……二〇三

㈠遺精—二〇三

王綸明醫雜著……二〇四

㈠夢遺精滑—二〇四

子湯—二三八 (88)石葦散—二三八 (89)麥門冬散—二三八 (90)四汁飲—二三八 (91)瞿麥湯—二三八 (92)石葦散—二三八 (93)牛膝膏—二三九 (94)神效琥珀散—二三九 (95)如聖散—二三九 (96)立效散—二三九 (97)白芍藥丸—二三九 (98)肉蓯蓉丸—二三九 (99)必效散—二三九 (100)海金沙散—二四〇 (101)星半蛤粉丸—二四〇 (102)檸檗丸—二四〇 (103)金蓮丸—二四〇 (104)萆薢分清飲—二四〇 (105)蒼朮難名丹—二四〇 (106)加減珍珠粉丸—二四〇 (107)秘精丸—二四一 (108)固本丸—二四一 (109)加味清心飲—二四一 (110)妙應丸—二四一 (111)水火分清飲—二四一 (112)桑螵蛸散—二四一 (113)內補鹿茸丸—二四二 (114)水陸二仙丹—二四二 (115)地黃丸—二四二 (116)子午丸—二四二 (117)小溫金散—二四二 (118)左歸丸—二四三 (119)右歸丸—二四三 (120)五福飲—二四三 (121)加減一陰煎—二四三 (122)二陰煎—二四三 (123)大分清飲—二四四 (124)蒼朮二陳煎—二四三 (125)小分清飲—二四四 (126)抽薪飲—二四四 (127)徙薪飲—二四四 (128)菉豆飲—二四四 (129)五君子煎—二四四 (130)壽脾煎—二四四 (131)秘元煎—二四五 (132)固陰煎—二四五 (133)菟絲煎—二四五 (134)蒼朮菟絲丸—二四五

卷二百七十彙考二百七十

淋濁遺精門三……二四七
單方……二四七
鍼灸……二五八
導引……二五九

(一)茯神湯—二二三 (二)大金花丸—二二三 (三)祕眞丸—二二三 (四)治淋方—二二三 (五)又方—二二四
(六)又方—二二四 (七)石葦散—二二四 (八)小薊飲子—二二四 (九)固精丸—二二四 (十)又方—二二四
(十一)通祕散—二二四 (十二)白薇散—二二五 (十三)又方—二二五 (十四)生附湯—二二五 (十五)又方—二二五 (十六)定志丸—二二五 (十七)通滑散—二二五 (十八)又方—二二五 (十九)威喜丸—二二六 (二十)珍珠粉丸—二二六
(二十一)補眞玉露丸—二二六 (二十二)王瓜散—二二六 (二十三)導赤散—二二六 (二十四)瞿麥散—二二六 (二十五)海金沙散—二二六 (二十六)清肺飲子—二二七 (二十七)猪苓湯—二二七 (二十八)楡皮飲—二二七 (二十九)通草散—二二七 (三十)王不留行散—二二七 (三十一)當歸湯—二二七 (三十二)羚羊角散—二二七 (三十三)雞蘇飲子—二二八 (三十四)金黃散—二二八 (三十五)神效方—二二八 (三十六)如聖散—二二八 (三十七)取石方—二二八 (三十八)體氣壯健先進方—二二八
(三十九)鹿茸益精丸—二二九 (四十)四精丸—二二九 (四十一)玉鎖固眞丹—二二九 (四十二)桑螵蛸丸—二二九 (四十三)仙方固眞丹—二二九 (四十四)鎖陽丹—二三〇 (四十五)鎖精丸—二三〇 (四十六)無名丹—二三〇 (四十七)煨腎附子散—二三〇 (四十八)心腎丸—二三〇 (四十九)固眞散—二三一 (五十)枸杞丸—二三一 (五十一)葛眞人百補交精丸—二三一
(五十二)王荊公妙香散—二三一 (五十三)香茸丸—二三一 (五十四)人參湯—二三一 (五十五)韭子丸—二三二 (五十六)固氣丸—二三二 (五十七)內固丸—二三二 (五十八)安中湯—二三二 (五十九)金鎖玉關丸—二三二 (六十)通靈散—二三二 (六十一)玉鎖丸—二三三 (六十二)二參丸—二三三 (六十三)椒腎丸—二三三 (六十四)韭子丸—二三三 (六十五)摶金散—二三四
(六十六)坎離丹—二三四 (六十七)三仙丸—二三四 (六十八)赤脚道人龍骨丸—二三四 (六十九)益智湯—二三五 (七十)祖傳經驗祕眞丹—二三五 (七十一)金鎖正元丹—二三五 (七十二)金鎖丹—二三五 (七十三)固眞丹—二三五 (七十四)既濟丹—二三五
(七十五)桂枝加龍骨牡蠣湯—二三六 (七十六)天雄散—二三六 (七十七)滑石散—二三六 (七十八)硼砂散—二三六
(七十九)秋石丸—二三六 (八十)香兒散—二三六 (八十一)瀉腎湯—二三七 (八十二)紫石英丸—二三七 (八十三)沉香散—二三七 (八十四)沉香丸—二三七 (八十五)磁石丸—二三七 (八十六)海金砂散—二三七 (八十七)地黃丸—二三七 (八十八)地膚

欽定古今圖書集成醫部全錄

醫部彙考二百五十九

滯下門一

黃帝素問

少陽司天，火淫所勝，民病泄注赤白。㊀至眞要大論

註　少陽司天，寅申歲也。泄注赤白，熱盛也。

歲少陽在泉，火淫所勝，民病注泄赤白，腹痛溺赤，甚則血便。

註　少陽在泉，巳亥歲也。熱傷血分則注赤，熱傷氣分則注白，熱在下焦故少腹痛而溺赤，甚則血出於小便也。

厥陰之勝，少腹痛，注下赤白。

註　此風之傷人也。

少陰之勝，腹滿痛溏泄，傳爲赤沃。

註　腹滿溏泄陰寒在下也。傳爲赤沃，君火下淫也。

少陽之勝，少腹痛，下沃赤白。

醫案……………………………………………………………………………………………………二〇

也。身不熱者，陽不外脫也。脈不懸絕，陰不下脫也。懸濇者，陽明之生氣已脫，故死。夫胃氣絕，則眞臟之脈見，故當以臟期之。肝至懸絕，十八日死。心至懸絕，九日死。肺至懸絕，十二日死。腎至懸絕，七日死。脾至懸絕，四日死。懸絕者，絕無陽明之胃氣，而眞臟孤懸也。

㊅大奇論

脾脈外鼓，沉爲腸澼，久自已。肝脈小緩爲腸澼，易治。腎脈小搏沉爲腸澼下血，血溫身熱者死。心肝澼亦下血，二臟同病者可治。其脈沉小濇爲腸澼，其身熱者死。熱見七日死。

註脾爲陰臟，位居中央，受三陽陽盛之氣，迫而上行，則其脈外鼓，搏而下沉，則爲腸澼下痢。然脾爲陰中之至陰，雖受陽熱之氣，久而自已。若陽熱之氣，干薄臟陰，致肝臟之血氣下泄而虛，則其脈小緩。然肝主藏血，雖受陽邪，尙爲易治。腎主藏精，爲精血之原，陽熱之氣，下薄於腎，故爲腸澼下血。陰血傷，故脈小。熱干於腎，故沉而搏也。夫陰陽相和則生，偏害則死，血受熱傷，故血溫也。身熱者，三陽盛而三陰之氣絕也，故死。夫心主生血，肝主藏血，是以心肝二臟，受陽盛之氣而爲腸澼者，亦下血。如二臟同病，則陰血盛而可以對待陽邪，故尙爲可治之證。如脈小沉濇，爲陽薄所傷也。其身熱者，陽盛而陰絕也。七日死者，六臟之陰氣終矣。此係奇恆之病，三陽之氣，直幷於陰，陰氣受傷，是以脈小沉濇，初起之時，裏證卽急，或禁口腹痛，或下重痢甚，或發驚昏沉，或嗌乾喉塞，身雖熱而熱微，外證輕而裏急，當急用抑陽養陰之藥以救援。若見身有微熱而用表散之輕劑，因脈小濇而用和調之緩方，三日之後，卽成不救矣。

㊆脈要精微論

數動一代者，病在陽之脈也，洩及便膿血。

註陽熱在經，故脈數動。熱傷血分，故便膿血。經血下洩，故一代也。

註　此熱淫於下也。

腎移熱於脾，傳爲虛，腸澼，死不治。㊁氣厥論

註　太陰濕土主氣，不能制水而反受濕熱相乘，脾氣虛傷，則不能磨運水穀而爲腸澼下利，穀氣已絕，故爲不治之死證。

三陽者，至陽也，積并則爲驚，病起疾風，至如礔礰，九竅皆塞，陽氣滂溢，乾嗌喉塞，并於陰則上下無常，薄爲腸澼。㊂著至教論

註　至陽謂陽之至盛而無極，有如天之疾風，若礔礰之雷火驟至，陽盛則爲驚也。九竅爲水注之器，九竅之水氣皆竭，而陽氣溢於竅中。夫肺腎上下交通，陽獨盛而水液竭，故嗌乾喉塞也。并於陰則使陰氣上下無常，薄於陰液則爲腸澼下痢。

陰陽虛腸澼死。㊃陰陽別論

註　榮衛氣血，皆水穀之所生，胃爲受納之腑，腸爲傳導之官，陰陽兩虛，又失所生之本，故死。

㊄通評虛實論

帝曰：『腸澼便血何如？』岐伯曰：『身熱則死，寒則生。』帝曰：『腸澼下白沫何如？』岐伯曰：『脈沉則生，脈浮則死。』帝曰：『腸澼下膿血何如？』岐伯曰：『脈懸絕則死，滑大則生。』帝曰：『腸澼之屬，身不熱，脈不懸絕何如？』曰：『滑大者曰生，懸濇者曰死，以臟期之。』

註　腸澼者，邪僻積於腸間而爲便利也。腸澼便血者，陰絡之血溢也。白沫乃腸外之寒汁沫，膿血乃汁沫與血相摶，并合而下也。便血乃陰泄於內，發熱爲陽脫於外，本經曰：『陰陽虛腸澼死。』下白沫者，陰液下注，故脈沉者

漢張機金匱要略

㊀滯下膿血

下利脈數而渴者，今自愈。設不差，必圊膿血，以有熱故也。

下痢寸脈反浮數，尺中自濇者，必圊膿血。

華佗中藏經

㊀論臟腑虛實寒熱生死

病腸澼者，下膿血，病人脈急皮熱，食不入，腹脹，目瞪者，死。或一身厥冷，脈沉細而不生者，亦死。食如故，脈沉浮有力而不絕者，生。

脾者土也，虛則多澼，喜呑酸，利不已。脾氣虛則大便滑，小便利，汗出不止，五液注下，爲五色注下利也。

腸澼轉筋，脈極數者死。腸澼下白膿者，死。腸澼下膿血，脈懸絕者，死。滑大者，生。腸澼下膿血，身有寒，脈絕者，死。

唐孫思邈千金方

㊀熱冷疳蝕諸痢論

余立身以來，三遭熱痢，一經冷痢，皆日夜百餘行，乃至移牀就廁，其困篤如此。但率意自治者，尋手皆愈，乃知此疾天下易治。但縱性之徒，率情驕倨，良藥苦口，不能克己早餌，朝遇暮過，望其自瘥，疾勢日增，胃氣漸弱，心力俱微，食飲與藥，皆不能進，既不得愈，便稱痢病難治，斯皆自誤也。學者須深達斯旨。然此病隨宜服一物皆使得瘥，惟須力意苦己服食，以瘥爲限，則無不愈也。又大須愼口味，重者後百日，次者一月日，所以當衰。驕恣者不能自愼，興言及

八太陰陽明篇

食飮不節，起居不時則陰受之。陰受之則入五臟，入五臟則䐜滿閉塞，下爲飧泄，久爲腸澼。

註入五臟者，謂太陰之行氣於三陰。太陰病則五臟之氣皆爲之病矣。脾氣逆則脹滿，太陰爲開，開折則倉廩無所輸而爲飧泄，久則爲腸澼矣。

九六元正紀大論

太陽司天之政，四之氣，風濕交爭，民病注下赤白。

註加臨之氣，乃厥陰風木，四之主氣乃太陰濕土，是以風濕交爭，注下赤白者，濕熱之交感也。

靈樞經

一經脈篇

腎足少陰之脈，是主腎所生病者腸澼。

註氣逆於下所爲也。

扁鵲難經

一滯下

大腸泄者，食已窘迫，大便色白，腸鳴切痛。
小腸泄者，溲而便膿血，少腹痛。
大瘕泄者，裏急後重，數至圊而不能便，莖中痛。

下利大孔痛者當温暖之

下利腹脹滿，身體疼痛者先温其裏，乃攻其表。

下利清穀，不可攻其表，汗出必脹滿。

下利氣者，當利其小便。

下利脈反弦，發熱身汗者，自愈。

下利，舌黃燥而不渴，胷中熱下不止者死。

下利後脈絕手足厥冷，晬時脈還，手足温者，生。不還不温者，死。生死之決，此之謂也。

凡六腑氣絕於外者手足寒上氣脚縮。五臟氣絕於內者下不自禁，下甚者手足不仁也，細尋取之，萬不失一。下病體略，例如此耳。

素問曰『春傷於風，夏爲膿血，』多滯下也。『夏傷於風，秋必洞泄，』多下水也。患是冷也。夫積冷積熱，及水穀實而下者，以大黃湯下之。強人勿過兩劑，皆消息五六日更進一劑。其補澀湯不效者，三兩日可進一劑。

舊治冷痢，貴於用建脾丸，多效今治積久冷痢，先以温脾湯下訖後以建脾丸補之，未有不效者。

痢濕之病，皆由暑月多食肥濃油膩，取冷眠睡之所得。禮云『君子盛暑之月，薄滋味，無食肥濃煑餅，』此時以不利入養生者宜深戒之。不爾多患痢濕痢。

宋楊登父直指方

㈠痢病證治

凡泄痢無已，變作白膿點滴而下，爲之温脾不愈，法當温腎。蓋腎主骨髓，白膿者，骨髓之異名也，其證面色微黑，骨力羸弱的見腎虛當用破故紙當歸木香乾薑肉桂之屬。又宜以阿膠珠當歸青皮赤茯苓黃連作劑，入烏梅白蜜

此，以爲至慨矣。古今痢方千萬首，不可具載，此中但撮其要者，七八而已。雖然，究之在人也何則陟釐丸烏梅丸松皮散等，暴痢服之，何有不瘥？其温脾湯建脾丸久下得之，焉能不愈？大凡痢有四種，謂冷熱疳蠱，冷則白，熱則赤，疳則赤白相雜，無復節度，多睡眼澀，蠱則純痢瘀血，熱則多益黃連，去其乾薑，冷則加以熱藥，疳則以藥吹灌下部，蠱毒則以蠱法治之，藥既主對相當，痢者復自勉勵服餌，焉有不愈者也？凡服止痢藥，初服皆劇，愚人不解，卽止其藥不服，此特不可，但使藥與病源的相主對，雖劇，但服不過再三服，漸漸自知，惟非其主對者，本勿服也。

凡痢病患忌生冷酢滑猪鷄魚油乳酪酥乾脯醬粉鹹，所食諸食，皆須大熟爛爲佳，亦不得傷飽，此將息之大經也。若將息失所，聖人不救也。

下利脈滑而數，有宿食，當下之。

下利脈遲而滑者，實也，利爲未止，急下之。

下利脈反滑，當有所去，下乃愈。

下利不欲食者，有宿食，當下之。

下利而腹痛滿，爲寒實，當下之。

下利腹中堅者，當下之。

下利而譫語者，腹內有燥屎，宜下之。

下利二部皆平，一作浮　按其心下堅者，急下之。

下利已瘥，至其年月日時復發者，此爲下不盡，更下之，愈。風寒重者不可下，下之後，心下堅痛，脈遲，一作浮。此爲寒，但當温之。脈沉緊下之亦然。脈大浮弦，下之當已。下利脈浮大，此爲虛，以強下之故。設脈浮革，因而腸鳴者，當温之。

下利脈遲緊，爲痛未欲止，當温之。得冷者，滿而便腸垢。

下利大孔痛者，當温煖之，可與理中四逆附子湯諸温之屬。

夫痢者五臟寃毒解而不散，或感冷物，或冒寒暑，失饑不能開發，又傷冷熱等食；或服暖藥過極，鬱化成痢。古人以白痢爲寒赤痢乃熱悞也。今人瘡癤初發，刺開乃血，多日成膿，何爲先熱而後寒也？叔和云：『濕多成五泄，腸走若雷奔。』愚醫不悟。三口黃者乃熱，青痢是冷。太素曰：『五泄有溏泄鶩泄飧泄濡泄滑泄，此乃五泄。五泄者，青是感肝木之象，其色青；赤者，受心火之氣，其色赤；白者，得西方金肺之氣，其色白；黃者脾土之色；蒼者土氣之下，水位承之，其色蒼也。若下利熱極頻併，寃痛或久不愈，諸藥不能止者，須下之，以開除濕熱痞閉積滯，而使氣液宣行，宜逐之，兼宣利積熱。

臟腑瀉痢，其證多種，大抵從風濕熱論，是知寒少而熱多，寒則不能久也。故曰暴瀉非陽，久瀉非陰。論曰：『春宜緩形，形動則肝木乃榮，反靜密則是行秋令，金能制木，風氣內藏，夏至則火盛而金去，火獨居，木旺而脾土損矣。輕則飧泄身熱，脈洪，穀不能化；重則下利，膿血稠粘，皆屬於火。』經曰：『溲而便膿血，知氣行而血止，宜大黃湯下之，是爲重劑；黃芩芍藥湯爲之輕劑。是實則瀉其子，木能自虛而脾土實矣。』故經曰：『春傷於風，夏必飧泄。』此逆四時之氣，人所自爲也。有自太陰脾經受濕而爲水泄，虛滑，微滿，身重，不知穀味，假令春宜益黃散補之，夏宜瀉之。法云：『宜補，宜和，宜止。』假令和則芍藥湯是也，止則訶子湯是也。久則防變而爲膿血，脾經傳腎，謂之賊邪，故難愈。若先痢而後滑，謂之微邪，故易痊。此皆脾土受濕，天行爲也，雖聖智不能逃。口食味，鼻食氣，從鼻而入，留積於脾而爲水瀉。有厥陰經動，下痢不止，其脈沉而遲，手足厥逆，涕唾膿血，此爲難治，宜麻黃小續命汗之。法曰：謂有表邪縮於內，當散表邪而愈。有暴下無聲，身冷自汗，小便清利，大便不禁，氣難布息，脈微，嘔吐，急以重藥溫之，漿水散是也。故法云：『後重則宜下，腹痛則宜和，身重則除濕，脈弦則去風，膿血稠黏，以重藥刼之，身冷自汗，以毒藥溫之，風邪內縮，宜汗之則愈，鶩溏爲痢，當溫之。』又云：『在表者發之，在裏者下之，在上者湧之，在下者竭之，身表熱者內疎之，小便澀者分利之。』又曰：『盛者和之，去者送之，過者止之。』兵法云：『避其來銳，擊其惰歸。』此之謂也。凡病

同煎，最能蕩滌惡穢，積滯既去，則徧數自疎矣。痢出於積滯。積，物積也，滯，氣滯也。物積欲出，氣滯而不與之出，故下墜裏急，乍起乍出，日夜凡百餘度，不論色之赤白，脈之大小，皆通利之，以無積不成痢也。

嚴用和濟生方

㈠痢疾

今之所謂痢疾者，古所謂滯下是也。之在推原其故：胃者脾之腑，爲水穀之海，榮衛充焉。大腸者，肺之腑，爲傳導之官，化物出焉。夫人飲食起居失其宜，運動勞役過其度，則脾胃不充，大腸虛弱，而風冷暑濕之邪，得以乘間而入，故爲痢疾。大凡傷熱則爲赤，傷冷則爲白，傷風則純下清血，傷濕則下如豆羹汁，冷熱交并，則赤白兼下。或飲冷酒物，恣情房室，勞傷精血，而成久毒痢者，雖可因證辨治，然常嘆世人初感此病，往往用罌粟殼石榴皮訶子肉豆蔻輩，以止濇之，殊不知痢疾多因飲食停滯於腸胃所致，倘不先以巴豆等劑，推其積滯，逐其邪穢，鮮有不致精神危困，久而羸弱者。余每遇此證，必先導滌腸胃，次正根本，然後辨其風冷暑濕而爲治法。故傷熱而赤者清之，傷冷而白者溫之，傷風而純下清血者祛逐之，傷濕而下如豆羹汁者分利之。又如冷熱交并者，則溫涼以調之，傷損而成久毒痢者，則化毒以保衞之。夫如是，藥無不應，而疾無不愈者，然又當觀脈之虛實如何，如下利脈微小者生，脈浮洪者難治。腸澼頻下膿血者，脈宜滑大，若弦急者必死。又身寒則生，身熱則死。苟臨病之際，由此驗治，萬不失一矣。

金劉完素六書

㈠滯下

皮丸四季通用，宜加減平胃散七宣丸之類。後宜服此藥，去其餘邪，兼平胃氣。

四時以胃氣爲本，久下血痢，則脾虛損而血不流，於四肢入於胃中爲血，宜滋養脾胃則愈。

夫五洩之病，其治法各不同者，外證各異也。胃泄者，飲食不化，多黃承氣湯下之。脾泄者，腹脹滿泄，注食即嘔吐逆，建中及理中湯。大腸泄者，食已窘迫，大便色白，腸鳴切痛，乾薑及附子湯。小腸泄者，溲便膿血，小腹痛，承氣湯；大瘕泄者，裏急後重，數至圊而不能便，足少陰是也。莖中痛，小便不利，此五泄之病也。胃小腸大瘕之證，皆清涼飲子主之，其泄自止。後厥陰少陰二證，另有治法。厥陰證加甘草，謂主莖中痛是肝也。內經曰：『肝苦急，急食甘以緩之。』少陰經證，多裏急後重，故加大黃，令急推過，物去則輕矣。又曰：『因其重而減之。』又曰：『在下者引而竭之。』又有太陰陽明二經證，當進退大承氣湯主之。太陰證不能食，當先補而後瀉之，乃進藥法也。先煎厚朴半兩，俱依本方，加製水一盞半，煎至一半服之。若三兩服後未已，爲有宿食不消，又加枳實二錢，同煎服。三兩服，泄又未已，如稍加食尚有熱毒，又加大黃三錢推過，泄止住藥。如泄未止，爲腸胃有久塵垢滑黏，加芒硝半合，宿垢去盡則愈矣。

瀉白爲寒，青黃赤黑皆爲熱也。蓋瀉白者肺之色，由寒水甚而制火不能平金，則金肺自甚，故色白，如濁水凝冰則自然清瑩而明白也。青者肝木之色，由火盛制金不能平木，則肝木自甚，故色青。或言利色青爲寒者，誤也。仲景曰：『少陰病下利清水，色純青者，熱在裏也，大承氣湯下之。』及夫小兒熱甚急驚，利色多青，爲熱明矣。利色黃者，由火盛則水必衰而脾土自旺，故色黃。紅爲熱者，心火之色也。或赤者，熱深甚也。至若利色黑，亦言爲熱者，由火熱過極，則反兼水化制之，故色黑也。如傷寒陽明病熱極，則日晡潮熱，甚則不識人，循衣摸牀，獨語如見鬼狀，法當大承氣湯下之。大便不黑者易治，黑者難治，諸痢同法。』然辯痢色以明寒熱者，更當審其飲食藥物之色。如小兒病熱，吐利霍亂，其乳未及消化而痢，尚白者，不可便言爲寒，當以脈證別之。大法瀉痢小便清白不澀爲寒，赤色者爲熱，又完穀不化而色不變，吐利腥穢，澄澈清冷，小便清白不澀，身涼不渴，脈遲細而微者，寒證也。穀雖不化而色變非白，

泄而惡風寒是太陰傳少陰，木來剋土也，用除濕白朮茯苓，安脾芍藥桂黃連破血也。火邪不能勝水也。太陰經不能傳少陰，而火邪上乘肺經，而痢必白膿也，加黃連當歸之類。又裏急後重脈大而洪實爲裏熱，是有物結墜也。若脈浮大甚不宜下，雖裏急後重而脈沉細弱者，謂寒邪在內而氣散也，可溫養而自愈。裏急後重閉者，大腸經氣不宣通也，宜加木香檳榔宣通其氣。如痢或泄而嘔者，胃中氣不和也。上焦不和，治以生薑橘皮，中焦不和，治以芍藥當歸茯苓，下焦不和，寒治以輕熱，甚以重熱藥。大便虛祕澀久不愈，恐太陰傳少陰，多傳變爲痢，太陰是爲賊邪，先以枳實厚朴湯以防其變。若四肢懶倦，小便少或不利，大便走沉困，飲食減，宜調胃去濕，白朮芍藥茯苓三味水煎服，以白朮之甘能入胃而除脾胃之濕，芍藥之酸澀除胃中之濕熱，茯苓之淡泄能通水道走濕，此三味泄痢須用此。如發熱惡寒，腹不痛，加黃芩爲主；如未見膿而惡寒，乃太陰欲傳少陰，加黃連爲主，桂枝佐之；如腹痛甚者，加當歸倍芍藥；如見血加黃連爲主，桂枝當歸佐之；如躁煩或先白膿後血，或發熱或惡寒，非黃芩不止，此上部血也。如惡寒脈沉，或腰痛，或血痢下痛，非黃連不能止，此中部血也。

如便膿血相雜而脈浮大，愼不可以大黃下之，下之必死，謂氣下竭而陽無所收也。凡陰陽不和，惟可以分陰陽藥治之。又云：暴泄非陽，久泄非陰，大便完穀下，有寒有熱，熱者脈疾，身多動，音聲響亮，暴注下迫，此陽也。寒者脈沉而細疾，身不動作，目睛不了了，飲食不下，鼻準氣息微，此陰也。薑附湯主之。若身重四肢不舉，朮附湯主之。

諸瀉痢久不止，或暴下者，皆太陰經病，故不可離於芍藥。若不受濕，不能下痢，故須用白朮。是以聖人立法，若四時下痢，於芍藥白朮內，春加防風，夏加黃芩，秋加厚朴，冬加桂附。然更詳外證寒熱處之。如裏急後重，須加大黃；如身困倦，須加白朮；如通身自汗，逆冷，氣息微，加桂附以溫之；如或後重膿血稠黏，雖在盛冬，於濕藥內亦加大黃。諸下痢之後，小便利而腹中虛痛不可忍者，此謂陰陽交錯，不和之甚也，當服神效越桃散。

治寒積痢，男子小兒婦人皆不問赤白，或淸利如水，不後重者，寒也。經云：『澄澈淸冷，皆屬寒，』皆爲虛寒，中有積，

經曰『少腹冤熱溲出白液。』冤者，屈滯也，病非本經，爲他經冤抑而成此疾也。冤一作客，猶寄也。遺客熱於少腹，久不去，從金化而爲白，設若赤白痢，赤者新積，從心火，白者舊積，從肺金，故赤白痢不可曲分寒熱，止可分新舊而治之。假如癰瘍，始赤血，次潰白膿，又豈爲寒者哉？而病者未信也。此劉河間常言之，皆云：寒多則白，以乾薑赤石脂桃花丸治痢雖愈，後必生血疾。如白帶下病，徑以白芍藥乾薑，白帶雖愈，則小溲必不利。治瀉痢與治帶下，皆不可驟用峻熱之藥燥之；若燥之則內水涸，水涸則必煩渴，煩渴則小溲不利，小溲不利則足腫面浮，漸至不治。

夫腸澼下血，可用調胃承氣湯，加當歸瀉訖；次用芍藥蘗皮丸，黃連解毒湯，五苓益元各停，調下五七錢服之。內經曰：『腸澼便血何如？』答曰『澼者，腸間積水也，身熱則死，寒則生，熱爲血氣敗，故死，寒爲榮氣在則生。七日而死者，死於火之成數也。』

夫下利膿血，腹痛不止，可用調胃承氣湯，加生薑棗煎，更下藏用七八十丸，量虛實加減瀉訖；次用長流水，調五苓散五七錢；或加燈心煎，或調益元散五七錢亦可。大忌油膩一切熱物則愈矣。

夫小腸泄者，溲而便膿血，小腹痛，宜寒劑奪之，淡劑甘劑分之。

夫裏急後重，數至圊而不能便，先宜清劑寒劑奪之，後以淡劑甘劑分之。或莖中痛亦用。

腸澼大小便膿血，宜不二丸，地榆散，駐車丸及車前子等藥；次宜淡劑甘劑分劑之類。

凡下利膿血腹痛不止者，何也？諸痛痒皆屬於心火，可用通解丸，量其虛實加減瀉之；次用消濕散，加生薑大棗芍藥瀉訖，又用新水調五苓散服之。

李杲十書

㈠腸澼下血論

煩渴，小便赤黃而或澀者，熱證也。凡穀消化者，無問色及他證便爲熱也。寒泄而穀消化者，未之有也。由寒則不能消化穀也。或火主疾速而熱甚，則傳化失常，穀不能化而飧泄者，亦有之矣。仲景曰：『邪熱不殺穀，』然熱而得濕，則飧泄也。或言下痢白爲寒，誤也。若果爲寒，則不能消穀，何由反化爲膿也？所謂下痢化穀反爲膿血，如世之穀肉菓菜，濕熱甚則自然腐爛潰發化爲濁水。故食於腹中，感人濕熱邪氣，則自然潰發化爲膿血也。其熱爲赤，熱屬心火故也。其濕爲黃，濕屬脾土故也。燥鬱爲白，屬肺金也。經曰：『諸氣膹鬱，皆屬於肺，』謂燥金之化也。王冰曰：『鬱奔迫，氣之爲用，金氣用之。』然諸瀉利，皆兼於濕，今反言氣燥者，謂濕熱甚於腸胃之內，而腸胃怫熱，鬱結而又濕主乎痞，以致氣液不得宣通，因以成腸胃之燥，使煩渴不止也。假如下利赤白，俗言寒熱相兼，其說尤誤。豈知水火陰陽寒熱者，猶權衡也，一高則必一下，一盛則必一衰，豈能寒熱俱甚於腸胃，而同爲痢乎？如熱生瘡瘍而出白膿者，豈可以白爲寒歟？由其在皮膚之分屬肺金，故色白也。次在血脈之分屬心火，故爲血癤也。在肌肉屬脾土，故作黃膿。在筋部屬肝木，故其色帶蒼。深至骨屬腎水，故紫黑血出也。各隨五臟之部而見五色，是謂標也。本則一出於熱，但分淺深而已。大法下迫窘痛，後重裏急，小便赤澀，皆屬燥熱，而下痢白者，必多有之，然則爲熱明矣。或曰：『白痢既爲熱病，何故服辛熱之藥亦有愈者耶？』蓋辛熱之藥，能開發腸胃鬱結，使氣液宣通，流濕潤燥，氣和而已。然病微者可愈，甚者鬱結不開，其病轉加而死矣。凡治熱甚吐瀉亦然。夫治諸痢者，莫若以辛苦寒藥治之，或微加辛熱佐之則可。蓋辛熱能發散開通鬱結，苦能燥濕，寒能勝熱，使氣宣平而已。如錢氏香連丸之類是也。故治諸痢者，黃連黃蘗爲君，以至苦大寒，正主濕熱之病。乃若世傳辛熱金石毒藥，治諸吐瀉下痢，或有愈者，以其善開鬱結故也。然雖亦有驗者，或不中效，反更加毒。凡用大毒之藥，必是善藥不能取效，不得已而用之可也。幸有善藥，雖不能取效，但有益而無損者，何必用大毒之藥而謾勞巇嶮也。經曰：『甯小與其大，甯善與其毒，』此之謂也。

赤痢乃自小腸來，白痢乃自大腸來，皆濕熱爲本。赤白帶濁同法。

有風邪下陷，宜升提之，蓋風傷肝，肝主木故也。有濕傷血，宜行濕清熱。

內經所謂身熱則死，寒則生者，此是大概言，必兼證詳之，方可，今豈無身熱而生，寒而死者？

脈沉小留連或微者易治，洪大數者難治也。脈宜滑大，不宜弦急。

仲景治痢可溫者五法，可下者十法。或表解，或利小便，或待其自已。還分易治難治不治之證，至爲詳密，但與瀉同，立論不分，學者當辨之。

大孔痛，一曰溫之，一曰清之，按久病身冷，脈沉小者，宜溫；暴病身熱，脈浮洪者，宜清宜補；有可吐者，亦有可汗可下者。

初得之時，元氣未虛，必推蕩之，此通因通用之法，稍久氣虛，則不可下，壯實初病宜下，虛弱衰老久病宜升之。

先水瀉後膿血，此脾傳腎，賊邪難愈，先膿血後水瀉，此腎傳脾，微邪易愈。

下痢如豆汁者，濕也。蓋脾腎爲水穀之海，無物不受，常兼四臟，故五色之相雜，當先通利，此迎而奪之之義。如虛者亦宜審之，因熱而作，不可用巴豆。如傷冷物者，或可用，宜謹。

又有時疫作痢，一方一家之內，上下傳染相似，卻宜明運氣之勝復以治之。

(二)治法

其或惡寒發熱，身首俱痛，此爲表證，宜微汗和解，用蒼朮木通川芎陳皮芍藥甘草生薑三片煎。

其或腹痛後重，小水短，下積，此爲裏證，宜和中疏氣，用炒枳殼製厚朴芍藥陳皮滑石甘草煎。

其或下墜異常，積中有紫黑血，而又痛甚，此爲死血證，法當用擂碎桃仁滑石行之。或口渴及大便口燥辣，是名挾熱，即加黃芩；或口不渴，身不熱，喜熱手熨盪，是名挾寒，即加乾薑。

太陰陽明論云『食飲不節，起居不時者，陰受之，陰受之則入五臟，入五臟則䐜滿閉塞，下爲飧泄，久爲腸澼。』夫腸澼者爲水穀與血另作一派，如唧桶湧出也。時值長夏濕熱大盛正當客氣勝而主氣弱，故腸澼之病甚，以涼血地黃湯主之。

朱震亨心法

㈠痢病

痢赤屬血，白屬氣。有身熱後重，腹痛下血，身熱挾外感，小柴胡湯去人參。後重乃積與氣墜下之故，兼升兼消，宜木香檳榔丸之類；不愈者，用秦艽皂角子煨大黃當歸桃仁黃連枳殼。若大腸風盛，可作丸服之。保和丸亦治因積作後重者，五日後不可下，蓋脾胃虛故也。後重窘迫者，當和氣木香檳榔之屬。腹痛者，肺金之氣鬱在大腸之間，如實者以劉氏之法下之，虛則以苦梗開之，然後用治痢藥氣用氣藥，血用血藥。有熱用黃芩芍藥之類，無熱腹痛或用溫藥薑桂之屬。下血以四物爲主，下血多主食積與熱，或用朴硝者，又青六丸治血痢效。

痢疾初得一二日間，以利爲法，切不可便用止澀之劑。若實者調胃承氣大小承氣三一承氣下之。有熱先退熱，然後看其氣病血病加減用藥，不可便用參朮。然氣虛者可用，胃虛者亦用之。

血痢久不愈者屬陰虛，四物湯爲主，涼血和血當歸桃仁之屬。又下痢久不止發熱者，屬陰虛，用寒涼藥，必兼升散藥，併熱藥。

下痢大孔痛者，因熱流於下也，以木香檳榔黃連黃芩炒乾薑。

噤口痢者，胃口熱甚故也。大虛大熱，用香連丸蓮肉各一半，共爲末，米湯調下。又方。人參二分，薑汁炒，黃連一分爲末，濃煎，終日細細呷之，如吐則再服，但一呷下，咽便開。人不知此，多用溫熱甘味藥，此以火濟火，以滯益滯。

若升散者以胃風湯防風芍藥湯神朮散蒼朮防風湯敗毒散，皆可汗之。攻裏若有濕者，用導水丸；兼鬱承氣湯和中丸；若積滯用聖餅子脾積丸；冷積用局方蘇感丸；若濕熱甚者，宜宣明元青膏；若後重窘迫，用木香檳榔丸；色白者屬氣，赤白者屬氣血受病；赤黑相兼屬濕熱；青綠雜色是風與火濕。下血者，當涼血，當歸生地。赤者屬血，保命集四物湯，加槐花黃連粟殼醋炒。下利脈沉弱而腹痛，用薑附湯，加對五苓理中，又機要漿水散。若青色者寒兼風。若陽氣下陷者，以升陽益胃湯，加桔梗醋沃南星，用梅葉外貼眉攢，極效。起泡便止。下痢若濕甚勝濕者，以平胃散對五苓散最可。或麯芎丸。老人奉養太過，飲食傷脾爲脾泄，機要白朮芍藥湯，濕勝仙朮炒用。若陰陽不分，當滲泄，以五苓之類，或單用芣苡實炒爲末，米飲調二錢。若血氣俱虛神弱者，以人參白朮當歸芍藥炒茯苓，少加黃連服之。或錢氏白朮散，又或十補湯佳。若暑痢而脈虛者，香薷飲，或淸暑益氣，又或六和湯，藿香正氣，各加木香半錢，名木香交加散。若白痢下如凍膠，或鼻涕，此屬冷痢，宜除濕湯，加木香一錢，虛弱者亦與十補湯。赤痢發熱者，以敗毒散，加陳倉米一撮煎。下痢小便不通者，黃連阿膠丸爲最。

平治會粹

㈠滯下辨論

滯下之病，嘗見世方以赤白而分寒熱，妄用兜澀燥劑止之，或言積滯而行巴硇丸藥攻之，或指濕熱而與淡滲之

其或下墜在血活之後，此氣滯證，宜於前藥加檳榔一枚。

其或在下則纏墜，在上則嘔食，此爲毒積未化，胃氣未平，證當認其寒則溫之，熱則淸之，虛則用參朮補之。毒解積下，食自進。

其或力倦自覺氣少惡食，此爲挾虛證，宜加白朮當歸。身虛甚者加人參。又十分重者，止用參一味，加陳皮補之。虛回而痢自止。

其或氣行血和積少，但虛坐努責，此爲無血證，倍用當歸身尾，却以生芍藥生地生桃仁佐之，復以陳皮和之，血生自安。

其或纏墜退減十之七八，穢積已盡，糟粕未實，當以炒芍藥炒白朮炙甘草陳皮茯苓煎湯，下固腸丸三十粒。然固腸丸性燥，恐有滯氣未盡行者，但單飲此湯，固腸丸未宜遽用。蓋固腸丸有去濕實腸之功。

其或利後糟粕未實，或食粥稍多，或饑甚方食，腹中作痛，毋恐，當以白朮陳皮各半煎湯和之自安。

其或久痢後體虛氣弱，滑下不止，又當澀之，可用訶子肉豆蔻白礬半夏。甚者添牡蠣可擇用之，然須用陳皮爲佐，恐大澀亦能作痛。又甚者灸天樞氣海。

右方用厚朴專瀉滯凝之氣，然厚朴性大溫而散氣，久服大能虛人，滯氣稍行卽去之，餘滯未盡，則用炒枳殼陳皮。然枳殼亦能耗氣，比厚朴稍緩，比陳皮稍重，滯氣稍退，當去之，只用陳皮以和衆藥。然陳皮去白，有補瀉之功，若爲參朮之佐，亦純作補藥用。

凡痢疾腹痛，必以白芍藥甘草爲君，當歸白朮爲佐，惡寒痛者加桂，惡熱痛者加黃蘗。達者更能參以歲氣時令用藥，則萬舉萬全，豈在乎執方而已哉？

[illegible]有風邪有熱有暑有濕氣下陷而感受不一，當分治。瀉輕痢重。諸有積，以肚熱纏痛推之，

㈠滯下辨論

或曰：『河間之言滯下，似無挾虛挾寒者，然乎否乎？』曰：『泄痢之病，水穀或化或不化，並無努責，惟覺困倦，若滯下則不然。或膿或血，或膿血相雜，或腸垢，或無糟粕，或糟粕相混，雖有痛不痛大痛之異，然皆裏急後重，逼迫惱人，攷之於經，察之於證，似乎皆熱證實證也。余近年涉歷，亦有大虛大寒者，不可不知。』

羅天益衞生寶鑑

㈠論治法

內經曰：『膿血稠黏，皆屬於火。』夫太陰主瀉，少陰主痢，是先泄而亡津液，火就燥，腎惡燥，居下焦血分，其受邪者，故便膿血也。然青白爲寒，赤黃爲熱，宜須兩審。治熱以堅中丸、豆蔻香連丸，治寒以白膠香散。或多熱少寒，水煮木香膏。虛滑頻數，宜止濇，宜養臟湯。病氣大退，正氣未服，當補。

且如瀉痢止，脾胃虛難任飲食，不可一槩用剋伐之劑。若補養其脾氣，氣足自然能飲食，宜錢氏方中異功散。若或喜嗜飲食太過，有傷脾胃，而心腹痞滿，嘔逆惡心，則不拘此例，當權用橘皮枳朮丸，一服得快，勿再服。若飲食調節無傷，則胃氣和平矣。

協熱下利，臍下熱，大便赤黃，或有腸垢者，治用仲景黃芩湯。

熱毒入胃，下利膿血，治用仲景黃連阿膠湯。

寒毒下利，臍下寒，腹脹滿，大便或黃白或赤黑，或有清穀，治用理中湯或四逆湯或白通湯。

劑利之，一偏之誤，可不明辨乎？按原病式所論赤白同於一理，反覆陳喻，但不熟察耳。果腸胃積滯不行，法當辛苦寒涼藥，推陳致新，蕩滌而去，不宜巴硇毒熱下之，否則鬱結轉甚而病變危者有之矣。若瀉利不分兩證，混言濕熱不利小便，非其治也。夫泄者水穀濕之象，滯下者，垢瘀之物，同於濕熱而成，治分兩岐而藥亦異。若淡滲之劑，功能散利水道，濁流得快便泄自止，此有無之形，豈可與滯下混同論？治而用導滯行積可乎？其下痢出於大腸傳送之道，了不干於腎氣，所下有形之物，或如魚腦，或下如豆汁，或便白膿，或下純血，或赤或白，或赤白相雜，若此者，豈可與瀉混同論？治而用淡滲利之可乎？當原其本，皆由腸胃日受飲食之積餘不盡，行留滯於內，濕蒸熱瘀，鬱結日深，伏而不作，時逢炎暑大行，相火司令，又調攝失宜，復感酷熱之毒，至秋陽氣始收，火氣下降，蒸發畜積而滯下之證作矣。以其積滯之滯行，故名之曰滯下。其濕熱瘀積，干於血分則赤，干於氣分則白，赤白兼下，氣血俱受邪矣。久而不愈，氣弱不運，脾積不磨，陳積脫滑，下凝猶若魚腦，甚則腸胃空虛，關司失守，濁液并流，色非一類，錯雜混下注出，狀如豆汁矣。若脾氣下陷，虛坐努責，便出色如白膿矣。其熱傷血深，濕毒相瘀，黏結紫色，則紫黑矣。其汚濁積而欲出，氣滯而不與之出，所以下迫窘痛，後重裏急，至圊而不能便，總頻併亦少，乍止乍起而不安，此皆大腸經有所壅遏，窒礙氣液，不得宣通故也。衆言難據，何法則可求之。長沙論云：『利之可下者，悉用大黃之劑，可溫者，悉用薑附之類。』何嘗以巴硇熱毒下之，緊澀酸斂兜之？又觀河間立言：『後重則宜下，腹痛則宜和，身重則宜溫，脈弦則去風，膿血黏稠以重藥刼之，身冷自汗以毒藥溫之，風邪內縮宜汗之，鶩溏爲痢當溫之，在表者汗之，在裏者下之，在上者湧之，在下者竭之，身表熱者內疎之，小便澀者分利之。』用藥輕重之別，又加詳載，行血則便自愈，調氣則後重自除，治實治虛之要論，而大虛大寒證載治驗，觀此諸法，豈可膠柱而鼓瑟？又有胃弱而閉不食，此言禁口痢病，七方未有詳論者，以內大法推之，內格嘔逆，火起炎上之象，究乎此則胃虛木火乘之，是土敗木賊也，見此多成危矣。

痢疾古名滯下，以氣滯成積，積久成痢，治法當以順氣爲先，須當開胃，故謂無飽死痢病也。

痢疾不問赤白，而知爲寒熱之證，若手足和煖則爲陽，先用粟殼飲，調五苓散，進感應丸。若覺手足厥冷則爲陰，當用煖劑，須當識此。

凡痢初發，不論赤白裏急後重，頻欲登圊，及去而所下無多，旣起而腹內復急，宜用藿香正氣散，加木香半錢，吞感應丸，或蘇合香丸吞感應丸。

赤痢血色鮮紅，或如蛇蟲形而間有鮮血者，此屬熱痢，宜藿香正氣散，加黑豆三十粒，五苓散加木香半錢，粟米少許，下黃連丸，或黃連阿膠丸，茶梅丸。熱甚服上項藥未效，宜白頭翁湯。若赤痢發熱者，敗毒散加陳倉米一撮煎。

若血色黯如瘀，服冷藥所下愈多，去愈頻者，當作冷痢，宜理中湯或四君子湯，加肉豆蔻木香各半錢。

若感暑氣而成痢疾者，其人自汗發熱，面垢嘔逆，渴欲引飲，腸內攻刺，小便不通，瘀血頻併，宜香薷飲，加黃連一錢，佐以五苓散白湯調服，不愈則用蜜水調。

感暑成痢，疼甚而食不進者，六和湯藿香正氣散各半貼，名木香交加散。

白痢下如凍膠，或如鼻涕，此屬冷痢，先宜多飲除濕湯，加木香一錢，吞感應丸；繼進理中湯。亦有下如䱇色或如臘茶色者，亦宜用前白痢藥。

赤白雜者，宜胃苓飲加倉米一撮煎，吞駐車丸。

凡治痢須先逐去積滯；去已多三五日後，自可兜澀，不問赤白，俱宜水煮木香丸，或水煮木香飲，眞人養臟湯，或斷下丸。如白痢久而虛甚者，養臟湯加熟附。赤痢加黑豆一小撮，白痢加乾薑一錢。赤痢亦可加黃連一錢，新下者不必加，此在人活法。

禁口痢者有得病卽不能進食者，或因冷藥幷藥過多不食者，却不可拘於赤痢難用熱藥之說，當以溫中進食爲

明虞摶醫學正傳

㈠總論

內經曰：『溲而便膿血，和氣行而血止也。』愚按經文溲字下，必缺一澀字，溲卽尿也，溲澀而便膿血者，言病因也。蓋血因氣滯，而大小二便俱不利耳。氣行而血止者，言治法也。故河間闡明其說，所謂和氣則後重自除，而用木香檳榔枳殼等藥以和之，卽此意也。

河間曰：『行血則便膿自愈，和氣則後重自除。』又曰：『後重則宜下，腹痛則宜和，身重則除濕，脈弦則去風，膿血稠黏以重藥刼之，身冷自汗以熱藥溫之，風邪外束宜汗之，騖溏爲痢宜溫之。』又曰：『在表者發之，在裏者下之，在上者湧之，在下者竭之，身表熱者內疎之，小便澀者分利之。』又曰：『盛者和之，去者送之，過者止之。』兵法云：『避其來銳，擊其惰歸』，此之謂也。夫古方以瀉痢滚同論治，朱紫混淆，殊不知瀉屬脾而痢屬腎也。丹溪曰：『先水瀉而後膿血者，此脾傳腎，賊邪難愈。先膿血而後水瀉者，此腎傳脾，微邪易愈。』是皆先哲之格言，以爲後學之繩墨，醫者其可不詳究乎？

仲景治痢可下者，悉用承氣等湯加減下之。大黃之寒，其性善走，佐以厚朴之溫，善行滯氣，緩以甘草之甘，飲以湯液，灌滌腸胃，滋潤輕快，積行卽止。局方用砒丹巴硇類聚成丸，其氣兇暴，其體重滯，積氣已行，而毒氣未消，猶暴賊手持兵刃，使之徘徊瞻顧於堂奧之間，縱有愈病之功，而腸胃清純之氣，寗無損傷之患？可溫者，乃用薑附溫之。局方例用熱藥爲主，澀藥爲佐，用之於下利清白者猶可，其裏急後重，經所謂下迫者，皆屬火熱所爲，加以澀熱之劑，非殺而何？

痢有風邪縮於內者，其證下痢不止，寸脈沉而遲，手足厥逆，下部脈不至，咽喉不利，或涕唾膿血，爲難治，宜麻黃升麻湯或小續命湯以發之。法曰：『表邪縮於內，當散邪於四肢，布於脈絡，外無其邪，臟腑安矣』有食積者，加枳實五錢。如酒入而泄瀉，此熱也，加黃芩五錢。

先，宜治中湯加木香半錢，或縮砂一錢。

休息痢因兜住太早，積不盡除，或因痢愈而不善調理，以致時止時作，宜四君子湯加陳皮一錢，木香半錢，吞駐車丸。只緣兜住積滯，遂成休息，再投去積，却用兜劑。

勞痢，因痢久不愈，耗損積血，致腸胃虛空，變生他證，或五心發熱，如勞之狀，宜蕷蓮飲，赤多倍蓮肉，白多倍山藥，痢後調補，宜四君子湯，加陳皮一錢半，卽異功散。惡甜者生料平胃散，加人參茯苓各半錢。

諸病壞證，久下膿血，或如死猪肝色，或五色雜下，頻出無禁，有類於痢，俗名刮腸，此乃臟腑俱虛，脾氣欲絕，故腸胃下脫，若投痢藥則誤矣。六柱飲爲穩，或可冀其萬一。

痢後風，因痢後下虛，不善調攝，或多行，或房勞，或感外邪，致兩脚酸軟，若痛若痹，遂成風痢，獨活寄生湯吞虎骨四斤丸，或用大防風湯，或多以生樟卽骨碎補俗呼爲猢猻薑三分之一同研取汁酒解服，外以杜仲牛膝杉木節白芷南星萆薢煎湯熏洗。

樓英醫學綱目

㈠運氣爲病

運氣下白，皆屬火。經云：『少陽司天，客勝甚則下白溺血』是也。

運氣下赤白有三：其一屬火。經云：『少陽司天，火淫所勝，民病泄注赤白。』又云：『少陽在泉，火淫所勝，民病泄注赤白，少腹痛，注下赤白，治以甘清』是也。

其二屬風。經云：『厥陰之勝，腸鳴飧泄，少腹痛，注下赤白，治以甘清』是也。

其三屬風濕。經云：『太陽司天之政，四之氣，風濕交爭，民病注下赤白，』是也。

醫部彙考二百六十

滯下門二

明王綸明醫雜著

(一)痢疾

痢是濕熱及食積，治者別赤白青黃黑五色以屬五臟。白者濕熱，傷氣分；赤者濕熱，傷血分；赤白相雜，氣血俱傷；黃者食積。治法瀉腸胃之濕熱，開鬱結之氣，消化積滯，通因通用，其初只是下，下後未愈，隨證調之。痢稍久者不可下，胃虛故也。痢多屬熱，然亦有虛與寒者。虛者宜補，寒者宜溫，年老及虛弱人不宜下。方用黃芩炒黃連炒各五分，白芍藥炒二錢。已上三藥，乃痢疾之必用者。木香枳殼炒各五分，甘草炙三分，檳榔一錢，薑水煎服。若腹痛加當歸一錢五分，縮砂一錢，再加木香芍藥各五分。

註按前證皆因濕熱鬱結，後重不利，宜用此方。若飲食停滯，用二陳湯加山楂送香連丸。仲景先生云：脈沉而有力者，屬裏實也，宜下之。沉而無力者，屬裏虛也，宜補之。元氣虛滑者，宜溫之澀之。脈滑而數者，有宿食也，當下之。脈浮大，此爲虛而強下之故也。脈浮革者，因而腸鳴，當溫之。下痢腹堅者，當下之。下痢譫語有燥屎，當下之。下痢三部脈皆平，按之心下堅急，下之。下痢脈大浮弦，當自愈。下痢腹滿痛爲實，當下之。治者審焉。

芎當歸，若中氣下陷不能攝血而不愈者，用補中益氣湯。

若赤黑相雜，此濕勝也。及小便赤澀短少，加木通澤瀉茯苓各一錢，山梔仁炒五分，以分利之。

註按初患濕盛而小便赤澀者，宜用前藥。若病久而陽氣下陷，或老弱者，宜用升陽除濕防風湯。若脾土虧損，寒水來侮，先用六君子湯加薑桂溫而補之，後用補中益氣湯，加茯苓半夏升而補之。

若血痢加當歸川芎生地黃桃仁槐花炒各一錢，久不愈減芩連各七分，去檳榔枳殼，再加阿膠珠側柏葉白朮各一錢五分，乾薑炒黑陳皮各一錢。

註按前證亦有因脾氣虛弱者，有因脾氣下陷者，有因肝氣虛弱者，有因肝血虛熱者。

若痢已久而後重不去，此大腸墜下，去檳榔枳殼，用條芩加升麻一錢，以升提之。

註按前證亦有因大腸氣滯者，有因大腸氣陷者，有因大腸血虛者，有因脾腎虛寒者。若大腸氣滯墜下，宜用四君子送香連丸。若大腸氣虛陷下，宜用四君子加柴胡升麻送香連丸。若大腸血虛後重，宜用四物湯加參朮送香連丸。東垣云：『裏急者，腹中不寬快也。』亦有虛坐而大便不行者，皆血虛也，血虛則裏急後重。

若嘔吐食不得下，加軟石膏一錢五分，陳皮一錢，山梔仁炒五分，生薑六分，緩呷之，以瀉胃口之熱。

註按前證若脾胃素有實熱，或過食厚味辛辣而暴患之，宜用此方。若胃氣虛膈氣逆而作嘔吐者，用六君子加生薑。若胃氣虛寒，亦用前藥，加炮薑木香。

有一樣氣血虛而痢者，用四物湯加人參白朮陳皮黃芩黃連。

註按前證若脾氣虛而血弱，宜用四君子湯。若胃氣虛而血弱，用補中益氣湯。若久病氣血俱虛，宜用八珍湯。大凡此證，久而不愈，或變證百出，但守前法，久之自愈。

有一樣寒痢，用黃連木香芍藥酒炒當歸乾薑炒縮砂厚朴肉桂。

若後重加滑石炒五分，再加枳殼檳榔芍藥條芩各五分。

註按利而便膿血者，乃氣行而血止也。行血則便膿自愈，調氣則後重自除。若大腸積滯，壅實而後重，法當疎導。若大腸氣虛下陷而後重，法當升補。

若白痢，加白朮白茯苓滑石炒陳皮各一錢，初欲下之，再加大黃五錢。兼食積，加山楂枳實各一錢。

註按前證若腹痛後重怕按，或脈洪實，爲積滯閉結，宜用此方疎通之。若腹痛後重喜按，或脈微細，爲陽氣虛寒，宜用六君加乾薑溫補之。

若紅痢，加當歸川芎桃仁各一錢五分，初欲下之，再加大黃五錢。

註按前證若病日久，或誤服疎通之藥而不能愈者，當調補脾胃。大凡血證久而不愈，多因陽氣虛而不能生血，或因陽氣虛而不能攝血，故丹溪先生治此證久而不愈，用四君子湯以收其功。

若紅白相雜，加川芎當歸桃仁各一錢五分以理血，滑石陳皮蒼朮各一錢五分以理氣。有餘食積者，加山楂枳實以消導。

註按前證若氣滯食積，濕熱所致，宜用此方治之。若脾虛飲食停滯，宜用六君子送香連丸調補之。經云：『脾主血，肺主氣。』前證乃氣血俱受病也。若因脾肺血傷所致，宜用四物湯加白朮茯苓煎送香連丸。若因脾肺氣傷所致，宜用四君湯加當歸川芎煎送香連丸。

若白痢久，胃弱氣虛，或下後未愈，去檳榔枳殼，減芩連芍藥各七分，加白朮一錢五分，黃芪陳皮茯苓各一錢，縮砂乾薑炙各五分。

註按前證若數至圊而不能便，或少有白膿者，乃土不能生金，肺與大腸氣傷而下墜也。當用升麻益胃湯，舉其陽氣，則陰自降而二便自愈。若飲食不入，發熱作渴，其勢危甚，用十全大補湯，如不應，送二神丸。

，呷呷之。久食不納者，噤口胃火甚也。大虛大熱，香連丸加蓮肉各一半，爲末，米飲下；又人參四錢，薑炒黃連二錢，濃煎，終日細細呷之，如吐再服。但一呷下咽便開。有毒熏心肺者，敗毒散；加蓮肉陳米，或單蓮肉留心爲末。每二錢陳皮煎湯下，外用大田螺入麝少許搗碎敷臍中，以太乙膏貼之，引熱下行。間有過服利藥及脾胃虛者，參苓白朮散去山藥加菖蒲。

㈡裏急腹痛後重

火性急速傳下，或化或不化，食物瘀積欲出，而氣反滯住，所以欲便不便，腹痛窘迫，拘急，大腸重而下墜，甚則肛門作痛，宜木香檳榔通氣，大黃降火。苓連解毒，歸芍和血，枳殼陳皮行滯。經云『和血則便膿自愈，行氣則後重自除。』間有虛火者，參朮歸芎補之，寒凝者，乾薑肉桂溫之。又素有積聚，偶因一臟之氣未動，干犯腸胃成痢者，須察何臟相乘，以平治之。

㈢辨五色

偏熱純赤者暑證，輕者黃芩湯，重者導滯湯。日久，黃連阿膠湯。熱積紫黑色者，瘀血也。腹痛後重異常，桃仁承氣湯下之。或因誤溫以致血瘀者，犀角地黃湯加黃連大黃，或加味清六丸，日久，地榆散，單苦參丸，黃連阿膠丸。要知諸痢皆血之瘀，惟黑爲瘀甚耳。

寒痢白如鴨溏，腸鳴痛墜不甚，不換金正氣散，加烏梅陳米，或熟料五積散。肢冷便淸，古薑附湯，理中湯。日久，黃連補腸湯。

濕痢腹脹，身重，下如豆汁，或赤黑混濁，危證也。當歸和血散，升陽除濕防風湯，升陽益胃湯，除濕湯，猪苓湯，戊己丸。風痢惡風鼻塞，身痛，色青或純下青水，古蒼防湯，神朮散。靑色帶白者，風寒，五積散；帶紅胃風湯。青綠雜色屬風火濕；及五色俱下者，乃脾胃食積及四氣相併而作，古萸連丸救之。

註按東垣先生云：前證若脈沉細而身不動作，睛不了了，飲食不下，鼻準氣息者，用薑附湯。身重四肢不舉者，用朮附湯。暴下無聲，身冷自汗，小便自利，大便不禁，氣難布息，脈微嘔吐者，用漿水散。若得痢而誤服溫熱止澀之藥，則雖稍久，亦宜用前法以下之。下後方調之。若得痢便用前證法下之而未應，又用前調理法治之，久而不愈，此屬虛寒而滑脫，可以前補虛溫寒二條擇用，更加龍骨石脂罌粟殼烏梅肉等收澀之藥。

註按前證若脾氣虛寒下陷，宜用補中益氣湯加粟殼薑桂；如不應，急用附子。若氣血虛弱，宜用十全大補湯，加附子粟殼。若命門火衰，用八味丸以補土母。若腹痛作渴，飲湯手按腹痛稍止者，俱宜溫補脾胃。

李梴醫學入門

㈠病因

身熱口渴，溺澀，大便急痛，色赤者為熱。身涼不渴，溺清，大便順利，色白者，為寒。但痢因於暑熱者多，寒者少。然陰陽變化，赤而淡者亦寒，白而稠者亦熱，必色證兩參而後寒熱可辨；血因火動，濕多成瀉。火傷氣分則氣鬱，自大腸滯下為白；火傷血分則血瘀，從小腸滲下為赤。氣血俱傷則赤白相兼，其因有外感暑濕，內傷酒麵炙煿，消爍，或七情氣鬱而為火之實者，有外感寒濕，內傷生冷硬物，積滯，或房慾損傷精血而為火之虛者，皆令腸胃粘澀，久積成毒。經曰：『飲食不節，起居不時者，陰受之則入五臟，閉塞下為飧泄，腸澼。』言濕火滯於腸中，故名滯下。又云：『痢者利也，法當利下耳。』

初起發熱惡寒，頭疼身痛，帶表證也。熱者九味羌活湯，寒者不換金正氣散，煩渴多暑薷苓湯，六一散，梅蜜飲。虛者錢氏白朮散。嘔吐，有寒熱者屬半表，柴苓湯。頑痰在膈者，芩連二陳湯，加防

㈧治法

通因通用，下也。然汗吐亦謂之通。初病元氣實者可行。若五七日脾胃虛者，只宜和解，及分利小便，消導食積，蓋無積不成痢也。稍久以氣血藥中加升麻柴胡防風蒼朮以升提之。如甚，乃用粟殼肉豆蔻龍骨牡蠣訶子以澀之斂之。食少者，專調脾胃飲食，進而氣血自和，蓋痢以胃氣爲本也。其間有裏急甚而無表者，即宜通利。脾虛而不敢通者，或和解，或即升舉。有氣陷下痢如注者，即暫止澀。有滑脫痛甚者，痰火盛也，宜吐宜升。痰消火降而大腸自斂，須憑脈證斷之。

㈨愈後

痢病愈後，三白湯，六神丸，枳朮丸，太和羹選用。

痢後有手足腫者，有遍身歷節痛者，俱餘瘀留滯經絡，不可純用風藥。鶴膝風大防風湯五積交加散。脚細者蒼龜丸。

㈩辨似

似痢非痢，寒熱不調之證，或熱積於中，而以冷物冷藥冰之，或冷積於中，而以熱藥熱物壓之；故熱以冷搏而成瀉，或澀或溏，裏急後重者，戊己丸香連丸或理中湯加黃連木香。

李中梓醫宗必讀

㈠總論

愚按痢之爲證，多本脾腎。脾司倉廩，土爲萬物之母，腎主蟄藏，水爲萬物之元，二臟皆根本之地，投治少差，寃沉幽

已上外感痢疾，如一方長幼相似者，名曰疫痢，敗毒散加陳皮或薑茶煎以防之，更參運氣調治。

㈣審七情

氣痢如蟹沫，拘急甚，流氣飲子，古萸連丸，六磨湯。熱者解毒湯，加知母枳殼，或木香檳榔丸，寒者木香勻氣散，煮黃丸。小便閟者五苓散，久不止者氣痢丸。

積痢色黃，或如魚湯，腹脹痛，惡食保和丸，急痛神保丸，一切酒食積聚，或黃或赤，通元二八丹。傷酒甚，酒蒸黃連丸，傷水腸腹脹痛，溫六丸。體實者導水丸。

㈤虛勞

虛痢困倦，穀食難化，腹微痛或大痛，並無努責。

血虛淡紅，通元二八丹。日久四物湯，加升麻香附側柏葉。

房勞傷精血成毒者，腎氣丸。虛瘀挾痢者，香連猪肚丸。凡痢經下後，痛墜不減，虛坐努責，及久不愈者，皆陰血虛也，胃風湯去桂加熟地主之。

氣虛色白，如鼻涕凍膠，四君子湯，理中湯，俱加木香肉桂厚朴茯苓散風邪，分水道，開胃脘。日久者補中益氣湯。虛甚厥逆脈微者，四順散，黑錫丹。

滑痢不禁，甚則脫肛，血分四物湯，加參朮地榆樗白皮；氣分，眞人養臟湯，大斷下丸，靈砂蒼榆湯。

㈥休息

休息痢，經年月不瘥，有過服涼藥，以致氣血虛者，八物湯加陳皮阿膠芩連少許，或十全大補湯。脾胃虛者，補中益氣湯，參苓白朮散。腎虛者四神丸，赤石脂丸。誤服澀藥餘毒不散者，古芩朮湯，神效丸，六神丸。有積者通元二八丹。積消毒散，脾胃已和，氣血將復，乃用百中散以止之。若更澀早則纏綿，胃敗難救。

由而迪門戶何由而固眞元何由而復邪若畏熱不前僅以參朮補土多致不起大可傷矣。

㈡證治

舊積者，濕熱食痰也，法當下之。新積者，下後又生者也，或調或補，不可輕攻。若因虛而痢者，雖舊積亦不可下，但用異功散。虛回而痢自止，丹溪有先用參朮補完胃氣而後下者，亦一妙法也，虛者宜之。

其色焦黑者，熱極反兼勝己之化，芍藥湯。黑如漆之光者，瘀血也，桃仁承氣湯。

裏急而不得便者，火也，重者承氣湯，輕者芍藥湯。裏急頻見汚衣者，虛也，補中益氣湯，去當歸加肉果。

邪迫而後重者，至圊稍減，未幾復甚，芍藥湯。虛滑而後重者，圊後不減，以得解愈虛故也，眞人養臟湯。下後仍後重者，當甘草緩之，升麻舉之。

虛坐努責者，乃虛坐而不得大便，血虛故裏急，宜歸身地黃芍藥陳皮之屬。

噤口乃食不得入，到口卽吐，有邪在上膈，火氣沖逆者，黃連木香桔梗橘紅茯苓菖蒲。有胃虛嘔逆者，治中湯。有陽氣不足，宿食未消者，理中湯，加砂仁陳皮木香豆蔻。有肝氣嘔吐者，木香黃連吳茱萸青皮芍藥之類。有水飲停聚者，輕者五苓散，重者加甘遂。有積穢在下，惡氣熏蒸者，承氣湯石蓮爲末，陳米湯調下。石蓮，卽是蓮子之老者，市中皆木蓮，不可用。丹溪用人參黃連濃煎加薑汁，細細呷之，如吐再吃，但得一呷下咽便開。

屢止屢發，久不愈者，名曰休息，多因兜澀太早，積熱未清，香連丸加參朮甘草茯苓枳實。有調理失宜者，隨證治之。

有虛滑甚者，椿根白皮東引者，水浸一日，去黃皮，每兩配人參一兩，煨木香二錢，粳米三錢，煎湯飲之。或大斷下丸。

腹痛因肺金之氣鬱在大腸閒，宜桔梗開之，白芍甘草陳皮木香當歸爲主，惡寒加乾薑，惡熱加黃連。

肛門痛，乃熱留於下也，宜槐花木香。挾寒者，理中湯。蟯蟲痢，蟯蟲，其形極細，九蟲之一也，胃弱腸虛則蟯蟲乘之，或癢或從穀道中溢出，雄黃銳散內服桃仁槐子蕪荑。

冥，究其疵誤皆寒熱未明，虛實不辨也。晚近不足論，卽在前賢頗有偏僻，如局方與復庵例行辛熱，河間與丹溪專用苦寒，何其執而不圓，相去天壤耶？夫痢起夏秋，炎蒸熱鬱，本乎天也；因熱求涼，過吞生冷，由於人也。氣壯而傷於天者，鬱熱居多；氣弱而傷於人者，陰寒爲甚。濕土寄旺四時，或從於火，則陽土有餘，而濕熱爲病，經所謂敦阜是也。或從於水，則陰土不足，而寒濕爲病，經所謂卑監是也。言熱者遺寒，言寒者廢熱，豈非立言之過乎？至以赤爲熱，白爲寒，亦非確論，果爾則赤白相兼者，豈眞寒熱同病乎？必以見證與色脈辨之，而後寒熱不淆也。須知寒者必虛，熱者必實，更以虛實細詳之，而寒熱愈明耳。脹滿惡食，急痛懼按者，實也；煩渴引飲，喜冷畏熱者，熱也。脈強而實者，實也。脈數而滑者，熱也。外此則靡非虛寒矣。而相似之際，尤當審察：如以口渴爲實熱似矣，不知凡係瀉痢，必亡津液，液亡於下，則津涸於上，安得不渴？更當以喜冷喜熱分虛實也。以腹痛爲實熱似矣，不知痢出於臟，腸胃必傷，膿血迫膚，安得不痛？更當以痛之緩急，按之可否，臟之陰陽，腹之脹與不脹，脈之有力無力分虛實也。以小便之黃赤短少爲實熱是矣，不知水從痢去，溲必不長，液以陰亡，溺因色變，更當以便之熱與不熱，液之涸與不涸，色之澤與不澤，分虛實也。以裏急後重爲實熱是矣，不知氣陷則倉廩不藏，陰亡則門戶不閉，更當以病之新久，質之強弱，脈之盛衰，分虛實也。至治法須求何邪所傷，何臟受病，如因於濕熱者，去其濕熱；因於積滯者，去其積滯；因於氣血者，和之；新感而實者，可以通因通用；久病而虛者，可以塞因塞用。是皆常法，無待言矣。獨怪世之病痢者，十有九虛，而醫之治痢者，百無一補，氣本下陷，而再行其氣，後重不益甚乎？中本虛衰，而復攻其積，元氣不愈竭乎？濕熱傷血者，自宜調血，若過行推蕩，血不轉傷乎？津亡作渴者，自宜止泄，若再與滲利，津不轉耗乎？世之庸工，專守痛無補法，且曰：「直待痛止，方可補耳。」不知因虛而痛者，愈攻則愈虛愈痛矣。此皆本末未明，但據現在者爲有形之疾病，不思可慮者在無形之元氣也。請以宜補之證悉言之：脈來微弱者可補；形色虛薄者可補；疾後而痢者可補；因攻而劇者可補。然而尤有至要者，則在脾腎兩臟。如先瀉而後痢者，脾傳腎爲賊邪，難療；先痢而後瀉者，腎傳脾爲微邪，易

三焦膀胱之道[illegible]十二經脈稟氣，之海，苟有內外之邪，凡損傷於經臟者，或移其邪入胃，胃屬土濕之化，胃受邪則濕氣不化，怫鬱而成濕熱矣。或心肺移氣血之病，傳之於合，大腸獨受其病，則氣凝注而成白痢，小腸獨受其病，則血凝注而成赤痢，大小腸通受其病，則赤白相混而下。胃之濕熱淫於大小腸者，亦如之，其色兼黃。若色之黑者有二：如色之焦黑，此極熱兼水化之黑也；如黑之光若漆者，此瘀血也。或曰：『治痢從腸胃，世人所守之法也，今乃復求其初感之邪，與受之經，將何爲哉？』曰：『病在腸胃者，是其標也，所感之邪與初受之經者，是其本也。且內經於治標本，各有所宜施之先後，況所傳變之法，又與傷寒表裏無異，何可不求之乎？豈止此而已？至若腸胃自感而病，亦當以邪正分。或正氣先虛而受邪，或因邪而致虛，則以先者爲本，後者爲標。與夫積之新舊亦如之。舊積者，停食結痰所化之積也；新積者，舊積去後，而氣血復鬱所生者也。舊積當先下之；新積則不宜下，其故何哉？蓋腸胃之腐熟水穀，轉輸糟粕者，皆榮衞灑陳六腑之功。今腸胃有邪，則榮衞運行至此，其機爲之阻，不能施化，故衞氣鬱而不舒，榮血泣而不行，於是飲食結痰停於胃，糟粕留於腸，與鬱氣泣血之積相挾，成滯下病矣。如是者，必當下之，以通壅塞，利榮衞之行。至於升降仍不行，衞氣復鬱，榮血復泣，又成新積，故病如初。若是者，不必求邪以治，但理衞氣以開通腠理，和榮血以調順陰陽，陰陽調，腠理開，則升降之道行，其積不治而自消矣。然而舊積亦有不可下者，先因榮衞之虛，不能轉輸其食積，必當先補榮衞，資腸胃之眞氣充溢，然後下之，庶無失矣。予數見俗方惟守十數方治痢，不過攻之濇之而已矣。安知攻病之藥，皆是耗氣損血之劑，用之不已，甚至氣散血亡，五臟空虛，精憊神去而死。其閉濇之，又皆足以增其氣鬱血泣之病，轉生腹脹，下爲足腫，上爲喘呼，諸疾作焉，世人之法何足守乎！』

趙獻可醫貫

㈠痢病

㈢死證

下純血者，死。如屋漏水者，死。大孔如竹筒者，死。脣若塗硃者，死。發熱不休者，死。色如魚腦或如猪肝者，皆半死半生。脈細皮寒，氣少泄利前後，飲食不入，是謂五虛，死。惟用參附，十可救一。

㈣脈候

沉小微細者，吉。洪大滑數者，凶。仲景云：『脈沉弦者重，脈大者為未止，微弱者為欲自止，雖發熱不死。』

王肯堂證治準繩

㈠滯下

古以赤為熱，白為冷，至劉河間、李東垣始非之，劉謂：『諸痢皆由乎熱，而以赤屬之心火，黃屬之脾土，白屬之肺金，青屬之肝木，黑乃熱之極而反兼腎水之化，其諸瀉利皆兼於溫，濕主於痞，以致怫鬱氣不得宣通，濕熱甚於腸胃之中，因以成腸胃之燥，故裏急後重，小便赤澀。謂治諸痢，莫若以辛苦寒藥而治，或微加辛熱佐之，辛能開鬱，苦能燥濕，寒能勝熱，使氣宣平而已。行血則便血自愈，調氣則後重自除。』李從脾胃病者而論，則曰：『上逆於肺為白，下傳於陰為赤。』衛生寶鑑因謂：『太陰主瀉，傳於少陰為痢，由泄亡津液而火就燥，腎惡燥，居下焦血分，其受邪者，故便膿血。』然亦赤黃為熱，青白為寒。丹溪謂：『滯下因火熱下迫而致裏急後重。』用劉氏之治濕熱，李氏之保脾土，更復一一較量氣血虛實以施治。三家皆發前代之所未發，而舉其要也。予嘗因是而研究之，自其五色分五臟者言，則可見濕熱之中具有五邪之相挾；自其上逆下傳氣血者言，則可見五臟六腑十二經脈之氣血，諸邪皆得傷之而為痢之赤白；自其濕熱為病者言，則可見由來致成濕熱之故，非一端；自其分痢有虛實者言，則可見凡在痢病者中所有之證，如煩躁，咽乾，舌黑，噦噫，後重，腹痛，脹滿，腳痛，腫弱之類，悉有虛實之殊。是故予以痢證

少陰而爲腸澼裏急後重，膿血相錯，數至圊而不能即便者，專用補中益氣湯爲主，使升降之道行，其痢不治而自消矣。』余法東垣，凡有熱者，加薑炒黃連，有寒者加薑桂，寒兼小腹痛者，用建中湯，有風濕者，加防風羌活，肝氣乘脾者，倍柴胡加芍藥木香，滑泄者加粟殼訶子。如此溫補不愈，又當別治。經曰：『熱之不熱，是無火也。』無火者，益火之源，急補命門之火，以生脾土之母，此萬舉萬全之策也。

又有一等陰虛似痢者，即五泄中大瘕泄者是也。經曰：『裏急後重，數至圊而不能便，必莖中痛。』褚氏云：『陰已耗而復竭之，則大小便牽痛，愈痛則愈便，愈便則愈痛，其證紅白相雜，裏急後重，悉似痢疾，必小便短澀而痛，或不通而痛，或欲小便而大便先脫，或欲大便而小便自遺，兩便牽引而痛，此腎虛之危證，急以八味地黃加補骨脂肉豆蔻阿膠，兼理中湯加升麻桂附，相繼間服，庶可挽回。』世以痢藥致斃者，不可枚舉，余特詳見先天要論泄瀉條內。

有一等積滯已少，但虛坐努責，此爲下多亡血，倍用當歸爲主，生血藥爲佐，血生自安，此是血虛陰證。

後重有二，邪氣墜下者，圊後不減，虛努不收者，圊後即減，此可以辨虛實。

有一等噤口痢者，湯藥入口隨出，在下纏住急迫，多因熱毒熾盛，逆沖胃口，胃氣伏而不宣，急用黃連，以吳茱萸炒過，揀去茱萸，人參等分，加糯米一撮，濃煎一盞，細口一匙一匙潤下，但得一二匙咽下，便不復吐矣。如吐再服。

有一等寒氣逆上者，用溫補之藥調之，其病易治。

有一等休息痢者，經年屢月，愈而復發，此係寒積在大腸底，諸藥所不到，獨巴豆一味，碾炒蠟丸，如龍眼大，空腹服之，再不復發，此亦通因通用之法也。

有瘧後痢，痢後瘧者。夫既爲瘧後，發洩已盡，必無暑熱之毒，復爲痢疾，是元氣下陷，脾氣不能升舉，似痢非痢也。既爲痢後，下多則亡血，氣又隨痢散，陰陽兩虛，陽虛則惡寒，陰虛則惡熱，故寒熱交戰，似瘧非瘧也，俱作虛論，俱用補

丹溪謂：『仲景可下者，悉以承氣湯下之。大黃之寒其性善走，佐以厚朴之溫，善行滯氣，緩以甘草之甘，飲以湯液，蕩滌腸胃，滋潤輕快，積行即止。禁用砒丹巴硇等藥，恐其暴悍毒氣有傷腸胃清純之氣。』又謂：『局方例用熱藥爲主，澀藥爲佐，用之於下痢清白者猶可，其裏急後重，經所謂下重者，皆屬於火，又加之澀熱之藥，非殺而何？』按前論皆專主寒治之說，以爲痢發於秋，是暑月鬱熱所致，其理甚著，其議論亦和平，但不詳所以致鬱熱者，多因暑熱酷烈，過飲冰水，過食生冷，熱爲寒鬱，久而爲沉寒積冷者亦有之，不可泥定是熱，當辨證切脈，眞知其有熱積，方可大黃，若係寒積而用大黃，不惟不愈，反增痛極而危矣。大凡下熱痢用大黃，下寒痢用巴豆，有是病而服是藥，詳案古人之成法，不容毫髮差謬，內經通因通用，原有兩條，有酒蒸大黃，有蠟丸巴豆，分析甚明，不可不考也。又謂『溫熱之藥，用於下痢清白者猶可，則若純紅血痢者，必不可用溫熱矣。』然王海藏有云：『暑月血痢，不用黃連，陰在內也。』本草衍義云：『有一男子，暑月患血痢，醫以涼藥逆治，專用黃連木香阿膠。此病始感便治則可，病久腸虛，理不可服，踰旬幾至委頓，理當別治。』此一段論又見類證本草序中，海藏云：『楊師三朝三大醉，至醒發大渴，飲冷水三巨杯，次日又飲茶三碗，後病便鮮血四次，約一盆，先以吳茱萸丸，翌日又以平胃五苓各半散，三大服，血止，復白痢，又以感應丸四服，白痢乃止，其安如故。』或問曰：『何爲不用黃連之類以解毒，而所用者溫熱之劑乎？』予曰：『若用寒涼，其疾大變難療，寒毒內傷，復用寒涼，非其治也。況血爲寒所凝，浸入大腸間而便下，得溫乃行，所以用熱藥，其血自止。經曰：『治病必求其本』，此之謂也。胃既得溫，其血不凝而自行，各守其鄉矣。當舉此爲例，可見不可偏執用寒之說，倘有遇血痢者，不可偏見以爲熱也。』

凡腹痛後重，小便短少，口渴喜冷飲，大腸口燥結，是爲挾熱下痢，前法固宜。若腹痛口不渴，喜熱飲，小便清長，身不熱，腹喜熱手熨者，是爲挾寒下痢，須理中薑桂溫之。至於初起受病，原係熱痢，遷延日久，各證不減，或反加重，理當別治，竟作虛看，須用補中益氣，一升一補，倍加參芪溫補。如小腹重墜，切痛奔豚，此兼屬少陰證，急加吳茱萸肉桂破

挽之於外，蓋其邪如決水轉石，乘勢出盡，無可挽耳。更有急開支河一法，其邪熱之在裏者，奔迫於大腸，必鬱結於膀胱，膀胱熱結則氣不化，而小溲短赤，不用順導而用逆挽，仍非計也。清膀胱之勢，令氣化行而分消熱勢，則甚捷也。仲景謂：『下利氣者，當利其小便。』夫氣者膀胱之化也，反從大腸而出，當利其小便，非急開支河之謂乎？然而水出高源，肺不熱則小溲自行，肺與大腸爲表裏，大腸之熱，皆因肺熱所移，尤宜用辛涼之藥，先清肺之化源矣。金匱有下利肺痛者，紫參湯主之，氣利，訶黎勒散主之。後人疑二方非仲景之方，詎知腸胃有病，其所關全在於肺，本草謂：『紫參主心腹中積聚，療腸胃中熱，通九竅，利大小便。』仲景取之，固通因通用之意也？『訶黎勒有通有塞，通以下涎液，消宿食，破結氣，澀以固腸脫。』仲景取之，亦通塞互用之意也。又可見肺氣不通而痛，則急通其壅，大腸之氣墜而逼迫，則通塞互用而緩調其適矣。嗟乎！內經之法，無可下手者，求之金匱，金匱下利之法，無可下手者，求之自心寤寐之神，轉覺金匱之法，一如指掌，可惜少壯光陰虛擲，今老矣，不能進步矣，特揭鄙言，爲後人深入之一助。

再按治瘧之法，當從少陽而進退其間，進而就陽，則從少陽爲表法固矣。乃痢疾之表，亦當從於少陽，蓋水穀之氣，由胃入腸，疾趨而下，始焉少陽生發之氣不伸，繼焉少陽生發之氣轉陷，故泛而求之三陽，不若顯而求之少陽，俾蒼天清淨之氣足以升擧，水土物產之味自然變化精微，輸泄有度而無下痢奔迫之苦矣。況兩陽明經所藏之津液，既已下泄，尤不可更發其汗，在傷寒經禁明有陽明禁汗之條，而金匱復申下利發汗之禁，謂：『下利清穀，不可攻其表，汗出必脹滿。』蓋以下利已傷其津液，發汗再傷其津液，津液去則胃氣空，而下出之濁氣，隨汗勢上入胃中，遂成脹滿，求其下利且不可得，甯非大戒乎？所以當從少陽半表之法，緩緩逆挽其下陷之清氣，俾身中行春夏之令，不致於收降耳。究竟亦是和法，全非發汗之意。津液未傷者，汗出無妨，津液既傷，皮間微微得潤，其下陷之氣已擧矣，夫豈太陽外感風寒，可正發汗之比乎？又豈太陽陽明合病下利，可用葛根之比乎？噫！微矣微矣！

中益氣，加溫補自愈。

醫門法律　臣喻昌著

㈠痢疾論

痢疾一證，難言之矣。在靈素謂之腸澼，亦曰滯下，金匱以嘔吐噦下利列爲一門，蓋以三者皆足陽明胃手陽明大腸所生之病也。至其所論下利，則皆傷寒論中厥陰經之本證，與二陽明嘔吐噦同列之義，殊不相合。觀其論中厥與利每每並言，始先即云六腑氣絕於外者手足寒，五臟氣絕於內者下利不禁，是則厥而且利爲虛寒之極，所以反能食者則死，反發熱者不死。若痢證則能食者不死，發熱者多死，何其相反若是耶？此必金匱嘔吐噦之下，脫失下痢一證，乃取傷寒厥陰下利之文，補入其中，後人屢試不驗，投杼而起者多矣。夫冬月傷寒之下利，與夏秋傷暑濕熱之下利，而可藉口仲景，謾言治法哉？後人以其無師之智，各呈偏見，或得於目之所擊，手之所試，分播廣傳，終不可以爲法，乃遂謂瘧痢無正方也。醫事之偷，何遂至此？昌謹以黃岐仲景之法，擬議言之：在內經冬月傷寒，已稱病熱，至夏秋熱暑濕三氣交蒸，互結之熱，十倍於冬月矣。外感三氣之熱而成下痢，其必從外而出之，以故下痢必從汗，先解其外，後調其內，首用辛涼以解其表，次用苦寒以清其裏，一二劑愈矣。失於表者，外邪俱從裏出，不死不休，故雖百日之遠，仍用逆流挽舟之法，引其邪而出之於外，則死證可活，危證可安，治經千人，成效歷歷可紀。詳金匱有云：「下痢脈反弦，發熱身汗者自愈。」夫久痢之脈，深入陰分，沉濇微弱矣，忽然而轉弦脈，渾是少陽生發之氣，非用逆挽之法，何以得此？久利邪入於陰，身必不熱，間有陰虛之熱，則熱而不休，今因逆挽之勢，逼其暫時躁熱，頃之邪從表出，熱自無矣。久痢陽氣下陷，皮膚乾濇，斷然無汗，今以逆挽之法，衛外之陽，領邪氣同還於表，而身有[illegible]也。昌豈敢用無師之智哉？又有驟受暑濕之毒，水穀傾囊而出，一晝夜七八十行，大

大戟牽牛烏梅粟殼之類，卽使病去藥存，爲害且大，況病不能去，毒烈轉深，難以復救，可不愼耶？

景岳全書　臣張介賓著

㈠論證

痢疾之病，多病於夏秋之交，古法相傳，皆謂炎暑大行，相火司令，酷熱之毒，畜積爲痢，今人所宗，皆此一類。夫痢因於暑而言其爲熱，豈不宜然？然炎熱者天之常令也，當熱不熱，必反爲災。因熱貪涼者，人之常事也，過食生冷，所以致痢。多見人之愼疾者，雖經盛暑，不犯寒涼，則終無瀉痢之患，豈其獨不受熱乎？此其病在寒邪，不在暑熱，病在人事，不在天時，從可知矣。但胃強氣實者，雖日用水果之類，而陽氣能勝，故不致疾。其次之者，雖未卽病，而日用日積，迨夫大火流西，新涼得氣，則伏陰內動，乘機而起，故寒濕得以犯脾者，多在七八月之間，此陽消陰長之徵，最易見也。再其次者，多以脾胃本弱，則隨犯隨病，不必伏寒，亦不必待時，尤爲易見。夫以生冷下咽，瀉痢隨起，豈卽化而爲熱乎？奈何近代醫流，止見此時之天熱，不見此人之臟寒，但見痢證，開口便言熱毒，反以寒涼治生冷，是何異雪上加霜乎？俗見相同，死者不可勝言矣。或曰：『然亦有用寒藥而愈者，何也？』曰：『以胃彊陽盛之人，而得濕成熱者，亦有之。元氣壯實，而邪不勝正者，亦有之。此皆可以寒治而愈，亦可以通利而愈，而此輩極少；以胃弱陽虛而因寒傷臟者，此輩極多。若再用寒涼，或妄加蕩滌，則無有不死。凡今以痢疾而致死者，皆此類也。觀丹溪曰：『瀉痢一證，屬熱者多，屬寒者少。』戴原禮曰：『以酷熱之毒至秋陽氣始收，火氣下降，因作滯下之證，皆大謬之言也，不可信之。』因作俚詞以志其戒。俚詞曰：『夏日多炎，陰邪易入，暑熱是主，風寒是客。身不被風，瘧從何致？口不受寒，痢從何得？治必求本，軒岐金石。志此微言，可爲醫則。』

㈡論虛實

治痢用通因通用之法，亦有金鍼。蓋火濕熱之邪，奔迫而出，止宜苦寒藥，如大小承氣類。方書每雜以溫中厚腸胃之藥，是欲為火濕熱立幟也。

治噤口痢，多有用黃連者，此正治濕熱之藥，但苦而且降，不能開提，況非胃虛所宜，昌故不敢取用。有用田螺搗如泥，納臍中，引火熱下行最妙，但鬱熱宜一開一降，未可徒恃一法。有用丁香砂仁之屬，以火濟火，則殺人之事矣。

凡先瀉而後痢者，逆也，復通之而不已者，虛也。脈微遲宜溫補，脈弦數為逆，主死，產後痢亦宜溫補。

下血者，宜涼血活血，當歸黃芩桃仁之類。邪風下陷者，宜升提之。濕熱傷血者，宜行濕清熱。

血痢久不愈者，屬陽虛陰脫，用八珍湯加升舉之藥，甚有陣陣自下，手足厥冷，脈漸微縮，此為元氣欲絕，急灸氣海穴，用附子理中湯，稍遲之則死。

久痢血脈沉弱，諸藥不效，以十全大補湯，加薑棗，少入蜜煎服。

㈡律三條

凡治痢不分標本先後，概用苦寒者，醫之罪也。

以腸胃論，大腸為標，胃為本。以經脈論，手足陽明為標，少陽相火為本。故胃受濕熱，水穀從少陽之火化，變為惡濁，而傳入於大腸，不治少陽，但治陽明，無益也。少陽生發之氣，傳入土中，因而下陷，不先以辛涼舉之，徑以苦寒奪之，痢無止期矣。

凡治痢不審病情虛實，徒執常法，自恃顓門者，醫之罪也。

實者，邪氣之實也，虛者，正氣之虛也。七實三虛，攻邪為先，七虛三實，扶正為本。十分實邪，即為壯火，食氣無正可扶，急去其邪，以留其正，十分虛邪，即為奄奄一息，無實可攻，急補其正，聽邪自去。故醫而不知變通，徒守家傳，最

或用苦寒以清之利之者哉

(五)論五色

凡五色之辨，如下痢膿垢之屬，無非血氣所化，但白者其來淺，浮近之脂膏也，赤者其來深，由脂膏而切膚絡也。下純血者，多以血為熱迫，故隨溢隨下，此其最深者也。若紫紅紫白者則離位稍久，其下不速，而色因以變，或未及脈絡，此其稍淺者也。若紅白相兼者，此又其淺深皆及者也。大都純血鮮紅者多熱證，以火性急速，迫而下也。紫紅紫白者少熱證，以陰凝血敗，損而然也。純白者無熱證，以臟寒氣薄，滑而然也。然有以無紅而亦因熱者，此亦暴注之類，而非下痢之謂也。有以紫紅雖多，而不可言熱者，此以陰絡受傷，而非暴注之比也。若辨黃黑二色，則凡黃深而穢臭者，此有熱證，亦有寒證。若淺黃色淡，不甚臭，而或兼腥餿氣者，此卽不化之類，皆寒證也。黑而濃厚大臭者，此焦色也，多有火證，若青黑而腥薄者，此肝腎腐敗之色也，猶以為熱，其謬甚矣。雖五色之辨，大約如此，然痢之見血者，無非陰絡受傷，卽或寒或熱，但傷絡脈，則無不見血，故不可以見血者，必認為熱也。凡臨此證，當必以脈色形氣病因兼而察之。

(六)論腹痛

凡瀉痢腹痛，有實熱者，有虛寒者。實熱者，或因食積，或因火邪，但食積之痛，必多脹滿堅鞕，或痛而拒按，此必有所停滯，微者宜行其滯，甚者宜瀉而逐之。火邪之痛，必有內熱等證，方宜清之利之。然邪實於中者，必多氣逆，故凡治痛之法，無論是火是食，皆當以行氣為先，但宜察藥性之寒熱，擇而用之可也。虛寒之痛，尤所當辨。蓋凡瀉痢之痛，多由寒氣之在臟也。經曰：『痛者，寒氣多也，有寒故痛也。』又曰：『病痛者陰也。』故凡人有過食生冷，或外受寒氣，卽能腹痛，此可知也。寒在中者治宜溫脾，寒在下者治宜溫腎也。再若虛寒

凡治痢疾，最當察虛實，辨寒熱，此瀉痢中最大關係，若四者不明，則殺人甚易也。

實證之辨，必其形氣強壯，脈息滑實，或素縱口腹，或多脹滿堅痛，及年少新病，脾氣未損者，方可用治標之法。微者行之，利之，甚者瀉之。

虛證之辨，有形體薄弱者，有顏色靑白者，有脈雖緊數而無力無神者，有脈見眞弦而中虛似實者，有素稟陽衰者，有素多淡素者，有偶犯生冷者，有偶中雨水陰寒者，有偶因飲食不調者，有年衰脾弱者。以上諸證，凡其素無縱肆，而忽患瀉痢，此必以或瓜或果，或飲食稍涼，偶傷胃氣而然，果何積之有？又何熱之有？總惟脾弱之輩，多有此證，故治此者，只宜溫調脾胃，但使脾溫則寒去，卽所以逐邪也。且邪本不多，卽用溫補健脾，原無妨礙，不過數劑，自當全愈，切不可妄云補住邪氣，而先用攻積攻滯及淸火等藥，倘使脾氣再傷，則輕者反重，重者必危矣。

㊂論寒熱

凡痢疾寒熱之辨，若果是熱，則必畏熱喜冷，不欲衣被，渴甚飲水多，或小便熱澀而痛，或下痢純血鮮紅，脈息必滑實有力，形氣必躁急多煩，若熱證果眞，卽宜放手涼解，或兼分利，邪去，其病自愈。若無此實熱諸證，而瀉痢有不止者，必是虛寒，若非溫補脾腎，必不能愈，卽有愈者，亦必其元氣有根，待其來復而然，勿謂虛寒之證，有不必溫補而可以愈者。或治痢必宜寒涼，而寒涼亦可無害者，皆見有未眞也。

㊃論積垢

凡腹中積聚之辨，乃以飲食之滯，留畜於中，或結聚成塊，或脹滿鞕痛，不化不行，有所阻隔者，乃為之積，此皆粗粕成形之屬，所當逐也。今人不能辨察，但見痢如膿垢者，皆謂之積，不知此非粗粕之屬，而實附腸著臟之脂膏，皆精血之屬也。無論瘦人肥人，皆有此脂，但肥者脂厚，瘦者脂薄，未有無脂者也。若果無脂，則腸臟之間，豈容單薄，赤露非惟藩籬不固，而且臟必易傷，無是理也。今之凡患瀉痢者，止以五內之脂膏不固，故日剝而下，若其臟氣稍強，則

痛少痛與不痛，亦由氣之陷與不陷耳。故無論寒痢熱痢，大孔皆能爲痛，不得謂痛必由熱也。欲治此者，但治其痢，痢止則腫痛自散，亦如後重之法也。自丹溪云：「大孔痛因熱流於下，木香檳榔芩連加炒乾薑主之。」是但知火能爲腫爲痛，亦焉知元陽之下陷也？後人所宗，皆其法也。凡虛寒之輩，其不能堪此亦多矣。

㈨論口渴

凡瀉痢證必多口渴，今人但見口渴，即認爲火，不知有火者固能渴，無火者亦能渴，不可不辨也。如火盛於中，則熏脾爍胃，津液耗乾，故酷好冰水，多而不厭，愈涼愈快，隨飲隨消者，此因熱而渴，治宜涼也。如口熱作渴，雖欲飲水而飲不能多者，即非眞火，不宜涼也。凡口雖乾渴，喜涼而復不喜涼者，是寒聚於中，而無根之火浮戴於上，此最忌寒涼者也。然渴有眞渴，有似渴，眞渴者必好茶飲，但以喜熱喜涼，即可辨其寒熱。似渴者乾也，非渴也，口雖乾而不欲飲，則尤非熱證可知。然瀉痢之證，因其水泄於下，必津涸於上，故不免於渴。渴而欲飲，正以內水不足，欲得外水以相濟，豈必皆因於火乎？諸如此者，必當詳審其有火無火，若火有餘者，自當清火，水不足者，自當滋陰矣。然氣爲水母，其有氣虛不能生水者，不補其母，則水不能生而渴不止，土爲水主，其有脾虛不能約水者，不強其主，則水不能畜而渴不止也。使能不治其渴而治其所以渴，又何渴病之有？

㈩論小水

凡瀉痢之證，小水必多不利，或多黃赤，此其寒熱虛實，大有關係，不可不察也。若暴注之瀉，以其清濁不分，水穀幷歸於大腸，故水有不利者，惟其暫也。若痢疾之小水，則病本不一。今人但見黃赤不利，無不云其爲熱，誤者多矣。凡因於熱者，必其熱赤之甚，或多澀痛，或見鮮血，然必上下皆有熱證，方是眞熱，此宜清涼治之。若非眞熱，則或以中寒而逼陽於下者有之，或以瀉痢亡陰而水虧色變者有之，或以下焦陽氣不煖而水無以化者有之，或以妄用滲

刮痛之義，則人多不知。蓋元氣不足於內，則雖無外受寒邪，而中氣不煖，即寒證也。所以瀉痢不能止，飲食不能化，而病有不能愈，正以陽虛多寒也。且瀉痢不止，胃氣既傷，膏血切膚，安能不痛？此其爲痛，乃因剝及腸臟而然。是以痢因於痛，痛因於痢，故凡以寒侵腑臟，及脈絡受傷，血動氣滯者，皆能爲痛，但察其不實不堅，或喜揉按，或喜煖熨，或胸腹如饑而不欲食，或胃脘作嘔而多吞酸，但無實熱等證，則總屬虛寒，安得爲痛？必因積痛皆實證耶？凡治虛寒之痛者，速宜溫養臟氣，不得再加消伐，致令痛者愈痛，滑者愈滑，必至危矣。若謂諸痛不宜補，必待痛定然後可用，則元氣日去，終無定期。嘗見一醫云：『痢疾須過七日，方可用補，』而不知六日已死，執迷不悟，愚亦甚矣。但其痛之甚者，當於溫補藥中，稍加木香以順其氣，或多加當歸以和其血，俟痛稍減，則當去此二味。蓋恐木香之耗氣，當歸之滑腸也。若寒在下焦而作痛者，必加吳茱萸，其或痛不至甚，則但以溫補脾腎爲主，漸安則痛當自止，不必治其痛也。

(七)論裏急後重

凡裏急後重者，病在廣腸最下之處，而其病本，則不在廣腸而在脾腎。凡熱痢寒痢虛痢皆有之，不得盡以爲熱也。蓋中焦有熱，則熱邪下迫，中焦有寒，則寒邪下迫，脾腎氣虛，則氣陷下迫，欲治此者，但當察其所因，以治脾腎之本，則無有不愈。然病在廣腸，已非食積。蓋食積至此，瀉則無留，而所留者，惟下陷之氣，氣本無形，故雖若欲出，而實無所出，無所出而又似欲出，皆氣之使然耳。故河間之用芍藥湯，謂行血則便自愈，調氣則後重除，是固然矣。然調氣之法，如氣熱者涼之則調，氣寒者溫之則調，氣虛者補之則調，氣陷者舉之則調，必使氣和，乃爲調氣。行血之法亦然。若但以木香檳榔當歸大黃行血散氣之屬，謂之調和，不知廣腸最遠，藥不易達，而所行所散者，皆中焦之氣耳。且氣既下陷，而復以行之散之，則氣必更陷，其能愈乎？矧痢止而後重自止，未有痢不愈而後重能愈者也。故凡欲治此皆但當以治痢爲主。

用治痢之法，虛實寒熱得其要則萬無一失，失其要則爲害最多，如泄瀉門調治諸法俱宜酌用

生冷初傷，飲食失調，而胃氣未損，元氣未虧，爲痛脹暴瀉暴痢等證，而食滯有未淸者，宜抑扶煎，五德丸，或平胃散胃苓湯五苓散類，略祛寒滯，愈之極易。

脾腎虛弱之輩，但犯生冷極易作痢，無論大人小兒，凡係脾虛致痢，別無實熱等證者，先宜佐關煎，溫其脾，或稍深而病及肝腎者，卽宜胃關煎爲最妙，勿以新病畏而勿用也。或五德丸，四神丸之類，俱可。凡脾腎俱虛而危劇可畏者，以胃關煎爲最，溫胃飮次之。或相機間用亦可。或兼用四維散，九炁丹，復陽丹。

痢疾嘔惡，兀兀欲吐，或聞食氣，卽見惡心者，此胃氣虛寒不能容受而然，必宜溫補安胃，用五君子煎，或六味異功煎，溫胃飮，聖朮散之類主之。嘔甚者，宜六味回陽飮之屬主之。若陰中火虛氣不歸原而嘔者，宜胃關煎，理陰煎主之。若胃火上衝而致嘔吐者，則必有煩熱脹滿等證，乃可用淸涼降火等藥，宜大分淸飮，益元散之類主之。

濕熱邪盛，而煩熱喜冷，脈實腹滿，或下痢純紅鮮血者，宜淸流飮，黃芩芍藥湯，或用香連丸，或用河間芍藥湯。熱甚者，宜大分淸飮，或茵陳飮，此等藥若數劑不效，便當思顧脾腎矣。

痢有發熱者，似乎屬火，宜從涼治。然實熱之證，反未必發熱。惟痢傷精血，陰虛水虧者，則最多爲熱爲躁也。如或虛中有火，脈見有力者，宜加減一陰煎或保陰煎主之。若脈本無力，全屬虛火，則不可治火，單宜壯水補陰，如三陰煎及六味八味等丸。若陰盛格陽而爲外熱者，必宜胃關煎，及右歸飮之屬主之。

痢疾初作，氣稟尚強，或因縱肆口腹，食飮停滯，凡有實邪脹痛堅滿等證，而形氣脈氣俱實者，可先去其積，積去其痢自止，宜承氣湯或神祐丸或百順丸主之。或用赤金豆以微利之，此通因通用，痛隨利減之法也。但此等證候必須確審，然後用之。若以脾腎虛寒致痢，而妄用此藥，及寒涼剋伐等劑，再敗元陽者，多致不可解救，最當愼也。

噤口不食，乃痢疾最危之候，而自古未有明辨。類丹溪云：『噤口痢，胃口熱甚故也，用黃連人參煎汁，終日呷之，如

利而涕逼乾汁者亦有之。但察其三焦無火，則雖黃雖濇，總皆無陰無液之證，不得通以熱論，速當培補眞陰，乃爲良法。內經曰：『中氣不足，溲便爲之變』至哉斯言！何今人之不察也。不獨此也，每見有小水淸白而兼腹痛者仍用芩連之類，余則不知其何謂。

㈢論陰陽疑似

陰陽之道，卽養生治病之本，而人有不易知，以其有莫測之妙也。夫陰陽之用，欲其相濟，不欲其相賊。相濟者，相和也。陰中不可無陽，陽中不可無陰也。相賊者相害也，陽賊陰則爲焦枯，陰賊陽則爲寂滅也。凡諸爲病者無非陰陽相賊，而有失其和耳。蓋陰陽之性，陰常喜靜而惡動，陽常喜煖而畏寒，及其相賊，則陰畏陽之亢，所以陰遇陽邪非枯則槁，陽畏陰之毒，所以陽逢陰寇，不走卽飛，此陰陽相妬之機也。凡諸病劇而有假眞疑似者，卽其證也。而尤於傷寒痢疾爲最。若今之患痢最甚者，多見上下皆有熱證，而實非眞熱者，何以見之？如煩則似熱非熱，躁則似狂非狂，懊憹不甯，莫可名狀，此非眞陽證也。蓋以精血敗傷，火中無水，而陰失其靜，故煩躁若此。又如飛者飛於上，走者走於下，飛於上則爲口渴喉瘡，或面紅身熱；走於下則爲孔熱孔痛，或便黃便血，此非實熱證也。蓋以水火相刑，陽爲陰逐，而火離其位，故飛走若此。今之人但見此等證候，僉曰察病不離形證，形證之熱既已若此，而猶謂之寒，是但知外之有熱，而不知內之有寒，知上下之有熱，而不知中焦之有寒也。又豈知煩躁之爲陰虛，而飛走之爲陽虛乎？疑似之間，猶不可不辨也。且如肌表皆有熱證，本當惡熱，而反不舍衣被，或臍腹喜煖而宜熨宜按者，此外雖熱而內則有寒也。又如九竅皆有熱證，必喜冷飲，然有口欲寒而腹畏之，故凡寒冷下咽，則或增嘔惡，或加腹痛，或噎塞不行，而反生脹悶，或口舌雖有瘡痛，而反欲熱湯飲者，此則上下雖熱，而中焦之有寒也。此外有陽氣素弱，及脈色少神，如前論等證，若止知爲火，治以寒涼，其奈內本因寒，而再加以寒，則寒涼入胃，直犯中焦，是外熱不相及，而[illegible]之下，萬不可得也。故凡治此者，但能引火歸原，使丹田煖

有餘不去制剋脾土，則脾氣有生發之機，自然大腸有傳導之化。加之枳殼檳榔蘿蔔子俱逐穢去積之神藥，尤能於補中用攻。而滑石甘草木香，調和於遲速之間，更能不疾不徐，使瘀滯之盡下，而無內留之患也。其餘些小痢疾，不必用如此之多，減半治之，亦無不奏功。前方不必分紅白痛與不痛，皆神效。

痢疾之證多起於暑天之鬱熱，而又感以水濕雨露之氣以成之，紅白相間，如血如膿，甚者如屋漏水，如魚凍水，裏急後重，奔迫疼痛，欲下而不能，下而不快，日夜數十行，或日夜數百行，氣息奄奄，坐而待斃。若驟止其邪，則死生頃刻，不止其邪，則危絕如絲。欲補其氣，則邪氣轉加，欲淸其火，則下行更甚。此時惟有因勢利導之法可行。或疑人已氣虛血敗，更加利導必死。不知邪氣一刻不去，則正氣一刻不安。古人云：『痢疾無止法』，信不誣也。方用白芍當歸各三兩，蘿蔔子一兩，枳殼檳榔甘草車前子各三錢，水煎服，一劑即止，二劑全安，可用飲食矣。此方之奇全在用白芍當歸。蓋水瀉最忌當歸之滑，而痢疾最喜其滑也。芍藥味酸，入肝以平木，使木不敢再侵脾土，又有枳殼檳榔，滑逐其濕熱之邪，又加車前分利其水濕，而又不耗眞陰之水，所以功勝於茯苓也。尤奇在用蘿蔔子一味，世多不解。蓋蘿蔔子味辣而能逐邪去濕，且又能上下通達，消食利氣，使氣行於血分之中，助歸芍以生新血而祛蕩其敗瘀也。少加甘草以和中，則無過烈之患，此奏功之神奇，實有妙理耳。

血痢有腹痛不痛之分。痛者，乃大熱也，用歸尾白芍各一兩，黃連三錢，枳殼蘿蔔子廣木香各二錢，甘草一錢，水煎服。不痛者乃寒也，白芍當歸各三錢，蘿蔔子二錢，枳殼檳榔甘草各一錢，水煎服。又曰：『血痢者，乃肝經來剋脾土也，雖因脾土之濕，又加暑熱暗侵，瓜果內傷所致，然終因肝木太旺，無制凌脾土而然也。』方用白芍當歸滋肝而平木，肝木得養，不來下剋脾土，則土亦得養，而血痢自痊矣。夫血痢雖有痛不痛之分，其實皆火邪而挾濕氣也。論理當與泄門白朮車前之方，俱可通治，而分別痛不痛之分，乃愼之也。二方出入加減，各爲神效，不必畏首畏尾，一用之於痛，一用之於不痛也。蓋火邪帶濕氣居於腸胃之際，不得奔下，未有不急而後重者。用當歸白芍滑而利之，

吐再嘆，但得一呷下咽便好。人不知此，而用温藥甘味，是以火濟火，以滯益滯也。亦有誤服熱毒之藥犯胃者，當推明而祛其毒。』此丹溪之說也。不知噤口之辨，其義最微，豈皆胃口熱甚，而總以黃連可治乎？蓋噤口者，以食不得入，雖亦有實熱證，而惟脾胃虛寒者居多。若因食積胃中而噤口者，其胸腹必有脹滿，或見鞕痛，此當行滯去積，積滯去而食自入，如青陳檳朴之屬是也。有因火鬱胃中而噤口者，臟腑必多熾熱，或脈見洪數，此當瀉火去熱，邪熱去而食自入，如芩連梔蘗之屬是也。凡此者，皆以邪畜於中，乃噤口之實證也。然實證無幾，而近之病者，每察其胃口，則多無脹滿等證，或察其火邪，則亦非實熱，但見其有出無入，而胃氣日窮，精神日敗。蓋其既無脹滿，本非積也，又無眞熱，本非火也。無積無火而食不能入，其故何也？以臟氣不能容受也。不能容受，其故有二：一由脾氣之弱，故或爲嘔惡，或爲呑酸，或惡聞食氣而泛泛不甯，或饑不能食而枵腹待困，此以中焦不運，故食不能入，責在脾也。一由腎氣之弱，故命門不能煖則大腸不能固，小腸不能化，則胃氣不能行，此以下焦失守，而化源無主，責在腎也。欲健中焦，非人參白朮乾薑甘草之屬不可。欲實下焦，非熟地附子吳茱萸肉桂之屬不可。脾腎強而食自入，其理甚明，其應如響。余之活人於此者，不勝紀矣。如丹溪之用黃連，及以火濟火以滯益滯之說，乃悉以實火爲言，特一曲之見耳。局人意智，絕人生幾，此其關係非小，不得信以爲然。

久痢陽虛，或因攻擊寒涼太過，致竭脾腎元神，而滑脫不止者，本源已敗，雖峻用温補諸藥，亦必不能奏效矣。宜速灸百會氣海天樞神闕等穴，以回其陽，庶或有可望生者。

石室祕籙 臣陳士鐸著

(一)痢病治法

凡人夏秋感暑熱之氣，患痢便血，一日間至百十次不止者，至危急也。苟用涼藥以止血，利藥以攻邪，俱非善法。我

醫部彙考二百六十一

滯下門三

方一

㈠桃花湯 仲景 治傷寒下痢，便膿血不止。

赤石脂一斤，一半全用，一半篩末。 乾薑一兩， 粳米半升， 右水七升，煮米熟去滓，每服七合，納赤石脂末方寸匕，日三服愈。

㈡桃花丸 局方 治冷痢腹痛，下白凍如魚腦。

赤石脂煆， 乾薑炮各等分。 右為末，蒸餅和丸，量大小服，日三服。

㈢金寶神丹 楊氏家藏方 治一切虛冷久積，滑泄久痢，癖塊血刺心腹，下痢，及婦人崩中漏下。

青蒙石半斤， 消石二兩。 右為末，坩鍋內鋪頭蓋底，按實，炭火二十斤，煆過取出，入赤石脂末二兩，滴水丸芡子大，候乾，入坩鍋內，小火煆紅，收之，每服一丸至二三丸，空心溫水下，少許壓之，久病瀉痢加至五七丸。

㈣甘露丸 普濟方 治伏暑瀉痢，及腸風下血，或酒毒下血。

消石， 舶上硫黃各一兩。 白礬滑白者半兩。 飛麪四兩。 右為末，滴水丸梧子大，每新汲水下三五十丸，一服

則火邪利於直下不止，平肝木而救脾土也。

用熱米湯服一錢，止痢只忌生梨一味。

㈡艾薑丸永類方　治老小白痢。

陳北艾四兩，　乾薑炮三兩。　右爲末，醋煮米糊丸梧子大，每服七十丸，空心米飮下，甚有奇效。

㈢二靈散衞生家寶方　治赤白雜痢困重者。

益母草日乾，　陳䑋梅燒存性等分。　右爲末，每服三錢，白痢乾薑湯，赤痢甘草湯下。

㈣莨菪丸聖惠方　治久痢不止，變種種痢兼脫肛。

莨菪子一升，淘去浮者，煮令芽出，曬乾，炒黃黑色。　青州棗一升去皮核。　右用釅醋二升，同煮，搗膏，丸梧子大，每服二十丸，食前米飮下。

㈤獨聖丸　治久痢赤白。

川烏頭一箇，炭火燒烟盡，取出地上盞蓋良久。　右研末，酒化蠟丸如麻子大，每服三丸，赤痢黃連甘草黑豆煎湯，放冷呑下。白痢甘草黑豆煎湯冷呑。如瀉及肚痛，以水呑下，並空心服之，忌熱物。

㈥退陰散　治下痢欬逆，脈沉陰寒者。

川烏頭，　乾薑等分。　右切炒，放冷爲散，每服一錢，水一盞，鹽一撮，煎取半盞，溫服，得汗解。

㈦百歲丸寶鑑　治一切惡痢及休息痢。

漏藍子一箇大者，　阿膠炒珠，　木香，　黃連，　罌粟殼各半兩，俱炒焦存性。　乳香少許。　右爲末，糊丸梧子大，每一歲一丸，米飮下。

㈧靑六丸丹溪　治濕熱泄痢。

滑石六兩，　甘草一錢，　炒紅麴五錢。　右爲末，蒸餅和丸梧　大，每服五七十丸，白湯下，日三服。

見效，遠年者，不過三服。

㊄白頭翁湯仲景　治熱痢下重。

白頭翁二兩，　黃連，　黃蘗，　秦皮各三兩。　右水七升，煮二升，每服一升，不愈，更服。婦人產後痢虛極者，加甘草阿膠各二兩。

㊅四製黃連丸醫通　治五痔八痢。

黃連一斤，分作四分，一分用酒浸炒，一分用自然薑汁炒，一分用吳茱萸湯浸炒，一分用益智仁同炒，去益智。　白芍藥酒煮切焙，　使君子仁焙各四兩。　廣木香二兩。　右為末，蒸餅和丸菉豆大，每服三十丸，米飲食前下，日三服，忌猪肉冷水。

㊆薑連散杜壬方　治氣痢，後重裏急，或下泄。

宣連一兩，　乾薑半兩。　右各為末，每用連一錢，薑半錢，和勻，空心溫酒下，或米飲下神效。

㊇香連丸濟生方　治氣痢，後重裏急或下泄。

黃連，生薑，各四兩。　木香二兩。　右以薑鋪砂鍋底，次鋪黃連，上鋪木香，新汲水三盞，煮焙研，酢調倉米糊為丸。如常日服，五次。一方只黃連木香等分。

㊈變通丸百一選方　治赤白下痢，日夜無度，及腸風下血。

黃連去毛，　吳茱萸湯泡過各二兩，同炒香揀出。　右各為末，以粟米飯和丸梧子大，各另收，每服三十丸，赤痢甘草湯下黃連丸，白痢薑湯下茱萸丸，赤白痢各用十五丸米湯下。此乃浙西河山純老方，救人甚效。

㊉勝金丸普濟方　治久痢不止。

龍骨，龍膽，羚羊角，當歸，附子，乾薑，黃連各三十銖，赤石脂，礬石各一兩半，犀角，甘草，熟艾各十八銖。右十二味爲末蜜和丸如小豆先食服十五丸日三，加至二十丸。

㊅又方 治前證。

黃連五合，蜀椒一兩，牛角䚡，當歸，龍骨，乾薑，熟艾各三兩。附子，黃蘗，赤石脂，芎藭，阿膠，厚朴，甘草，橘皮，石榴皮，芍藥各二兩。大棗二十枚，升麻一兩半。右十九味，㕮咀，以水一斗三升，煮取四升，去滓內牛角䚡末，阿膠消，以綿絞去滓分七服日四夜三。千金翼無橘皮。

㊈又方 治血痢。

蒲黃三合，地黃，桑耳，甘草，芒硝，茯苓，人參，柏葉，阿膠炒，艾葉，生薑各二兩。禹餘糧，黃連各一兩。赤石脂五分。右十四味，㕮咀，以水一斗，煮取四升分五服，溫服，神效。

㉚又方 治下雜血。

乾藍，犀角，地榆各一兩。蜜二合。右四味，㕮咀，以水五升，煮取一升半，去滓，下蜜煎取五合，分三服。此治熱毒蠱妙。

㊂又方 治熱毒下黑血，五內絞切痛，日夜百行，氣絕欲死。

黃連一升，龍骨，白朮各二兩。阿膠，乾薑，當歸，赤石脂各三兩。附子一兩。右八味，㕮咀，以水一斗，煮取五升，分五服。余以貞觀三年七月十二日忽得此熱毒痢至十五日，命將欲絕處此方藥，入口卽定。

㊂白頭翁湯 治赤滯下血連月不瘥。

白頭翁，厚朴，阿膠，黃連，秦皮，附子，黃蘗，茯苓，芍藥各二兩。乾薑，當歸，甘草，赤石脂，

（一九）戊己丸局方　治脾胃受濕，下痢赤白，腹痛，米穀不化。

吳茱萸，　黃連，　白芍藥各一兩。　右同炒爲末蒸餅丸梧子大每服二三十丸，米飲下。

（二〇）二色丸筆峯雜興　治痢及水泄腸風。

吳茱萸，　黃連各二兩，同炒香。　右各自爲末以百草霜末二兩，同黃連作丸，以白芍藥末二兩，同茱萸作丸，各用飯丸梧子大各收每服五十丸，赤痢烏梅湯下連霜丸，白痢米飲下茱芍丸，赤白痢各半服之。

（二一）調氣飲仲景　治赤白痢小腹痛不可忍，下重或面青手足俱變者。

黃蠟三錢，　阿膠三錢。　右同鎔化，入黃連末五錢攪勻分三次熱服神效。

（二二）膠蠟湯千金方　治熱痢及婦人產後下血。

蠟二碁子大，　阿膠炒珠三錢，　當歸二錢半，　黃連三錢，　黃蘗一錢，　陳廩米半升。　右水三升，煑米至一升，去米入藥，煎至一鍾，溫服，神效。

（二三）黑牛散李延壽方　治赤白痢禁口痢及泄瀉。

黑牛兒，即蜣螂，一名鐵甲將軍。　右燒研每服五分或一錢，燒酒調服。小兒以黃酒服，立效。

（二四）黃連阿膠丸局方　治腸胃氣虛，冷熱不調，下痢赤白，裏急後重，腹痛，小便不利。

阿膠炒過水化成膏一兩，　黃連三兩，　茯苓二兩。　右爲末，搗丸梧子大，每服五十丸，粟米湯下，日三，

（二五）苦參橘皮丸千金方下同　治熱毒痢。

苦參，　橘皮，　獨活，　阿膠，　藍青，　黃連，　鬼臼一作鬼箭羽。　黃蘗，　甘草。　右九味等分爲末，以蜜烊膠和併，手丸之如梧子，候乾，飲服十丸，日三。後稍加，卒下注痢者，大良。

（二六）又方　治著熱毒下黃汁赤如爛血滯如魚腦，腹痛壯熱。

大黃，　桂心各三兩。　附子，　乾薑，　人參，各二兩。　右五味㕮咀，以水七升，煮取二升半，分三服。

㊃健脾圓　治虛勞羸瘦，身體重，脾胃冷，飲食不消，雷鳴腹脹，泄痢不止。

鍾乳粉三兩，　赤石脂，　麴，　大麥糵，　當歸，　黃連，　人參，　細辛，　龍骨，　乾薑，　白茯苓，　石斛，　桂心各三兩。　附子一兩，　蜀椒六兩。　右十五味為末，蜜丸梧子大，酒服十丸，日三，加至三十丸。弱者飲服。通治男女集驗無細辛龍骨。

㊃增損健脾圓　治丈夫虛勞五臟六腑，傷敗受冷，初作滯下，久則變五色，赤黑如爛腸極臭穢者。

鍾乳粉，　赤石脂三兩。　礜石，一作礬石。　五味子，　乾薑，　蓯蓉，　桂心，　石斛，　石榴皮，　澤瀉，　遠志，　寄生，　柏子仁，　人參，　天雄，　當歸，　牡蠣，　龍骨，　白頭翁，　甘草各二兩。　右二十味為末，蜜丸酒服二十丸，日三，加至四十丸。此二方止痢神驗。

㊃駐車圓　治大冷洞痢，腸滑下赤白如魚腦，日夜無節度，腹痛不可忍者。

黃連六兩，　乾薑二兩，　當歸，　阿膠各三兩。　右四味為末，以大酢八合烊膠和之，并手丸如大豆許，候乾，大人飲服三十丸，小兒百日以還三丸，期年者五丸，餘以意加減，日三服。

㊃大桃花湯　治冷白滯痢腹痛。

赤石脂，　乾薑，　當歸，　龍骨，　牡蠣各三兩。　附子二兩，　白朮一升，　人參一兩半，　甘草，　芍藥各一兩。　右十味，㕮咀，以水一斗二升，煮朮取九升，內諸藥，煮取三升，分三服。脹者加厚朴三兩，嘔者加橘皮三兩。

㊃又方　治前證。

龍骨六兩，　厚朴，　當歸各三兩。　赤石脂五兩。　右四味，㕮咀，以水七升，煮取二升半，分三服。熱加白頭翁二兩

龍骨，各三兩。　大棗三十枚，　粳米一升。　右十六味，㕮咀，以水一斗二升，先煮米令熟，出米內藥，煮取三升，分四服。

㉝又方　治下痢絞痛，腸滑不可瘥。

黃連六兩，　阿膠，　鼠尾草，　當歸，　乾薑各三兩。　右五味，㕮咀，若大冷白多，以清酒一斗，煮取三升，分三服。若熱及不痛者，去乾薑當歸，以水煮之。

㉞茯苓湯　治困下空竭欲死，滯下膿血，日數十行，羸毒垂死，老少並宜服。

茯苓，　黃蘗，　黃連，　龍骨，　人參，　乾薑，　桂，　黃芩，　芍藥，　當歸，　梔子炒，　甘草生，各半兩。　赤石脂一兩，　大棗十二枚。　右十四味，㕮咀，以水五升，煮取二升，分再服，不瘥，滿三劑。此方主風虛冷痢最佳。

㉟溫脾湯　治久下赤白，連年不止，及霍亂脾胃冷實不消。

人參，　甘草，　乾薑各二兩。　附子一枚大者，　大黃四兩。　右五味，㕮咀，以水八升，煮取二升半，分三服。臨熟下大黃，與後溫脾湯小異，須大轉瀉者，當用此方神效。

㊱黃連湯　治赤白痢。

黃連，　黃蘗，　乾薑，　石榴皮，　阿膠各三兩。　當歸，　甘草各一兩。　右七味，㕮咀，以水七升，煮取三升，分三服。

㊲女萎圓　一名雲實丸，治熱病時氣，下赤白痢，遂成䘌。

女萎，　藜蘆各三分。　烏頭，　桂心各四分。　黃連，　雲實各二分，　代赭一分。　右七味，爲末，蜜丸如梧子大，服二丸，大下痢宿勿食，清旦以冷水服之，勿飲食，至日中過後乃飲食，若得藥力，明旦更服如前，亦可長服，虛羸晝夜百行膿血亦瘥。

黛，晚蠶蛾，青礬，丁香，黃礬，牀中桃木，麝香，苦參，乾薑，黃蘗，角蒿，硃砂，印成鹽，敘月木，桂心，鐵衣，芒硝，蝦蟆，蠍蟲屎，荏子各等分。右二十九味，治下篩，以筒子內下部吹著，日一二度妙。

(五一)又方　治疳濕不能食，身重，心熱，脚冷，百節疼痛。

黃芩，　芍藥，　苦參，甘草，當歸，蜀椒，青黛，甘松一作泔淀，熏黃，　豉，各二兩。鹽一合，　東引桃根。葱白各一握。　麝香半分，　豬膽二枚。　右十五味，㕮咀，以水一斗八升，煑取四升，分爲二分，一度灌一分湯，如入體然後著麝香豬膽一枚，即灌，灌了作葱豉粥食之，後日更將一分如前灌之，七日忌生冷毒物等，但是油膩醬乳酢三十日忌之，大佳。

(五二)又祕方　治疳蝕人諸處，但是赤血痢久不瘥，立著即瘥。

人屎灰，一作人髮灰。　金銀土堝各五兩。　麝香一分，　銀末小豆許。　乾蝦蟆五月五日，收一枚燒灰研。　右五味。治下篩，傅瘡上即瘥。三七日，忌如前。痢者吹下部。

(五三)又方　治疳痢不止。

苦參，　甘草，　熏黃，各二兩。　豉一升五合，　葱白五莖，　蜀椒三十粒。　右六味，以苦參等三物各擣下篩，以水五升，煑葱白豉椒取三升，以三指撮苦參末等各一撮，內汁中，冷暖如人體，先飲少許豉汁，食一口飯，乃側臥，徐徐灌之，訖，多時臥不出爲佳，大急，乃出之於淨地，當有疳蝕蟲如白馬尾狀，頭黑，是其效也。其重者肛大難瘥，當取桃枝綿裹頭，用前件汁適寒溫烙之，須近脊，以上三十度烙之，乃瘥，神驗。

(五四)又方　崔氏云，晉代之地多生疳蝕人五臟，通見脊骨下膿血，手足煩疼，四肢無力，夜臥煩燥，不安

半，牡蠣三兩。

㊺附子湯　治暴下積，日不住，及久痢。

附子一枚，石榴皮一具，阿膠二兩，龍骨，甘草，芍藥，乾薑，黃連，各一兩。黃芩半兩，粳米三合。

右十味㕮咀，以水八升，煑取三升，分三服。

㊻馬蘭子圓　治積冷痢，下白膿。

馬蘭子一升熟熬，乾薑，甘草，各二兩半。神麴炒，麥蘖，阿膠，各五兩。黃連三兩，蜀椒五合，附子二兩。　右九味爲末，蜜丸如梧子大，每服二十丸，日二，以知爲度，或作散，酒調服方寸匕，亦佳。

㊼倉米湯　治小腹冷氣積聚，結成冷痢，日夜三四十行。

倉粳米半升，淨淘濾乾。　薤白一握，去青切細。羊脂一升熬，香豉三升，以水一斗，煎取五升，澄清。　右四味，先以羊脂煎薤白令黃，幷米內豉汁中，煎取四升，旦空腹溫服一升，如行十里許，更進一升，得快利止。若利不止，更服如前。利後進粳米粥豉，若復作，更服一劑永瘥。

㊽瘑痢方　治瘑濕下黑，醫不能治，垂死者。

熏黃，硃砂，青黛，石鹽，莨菪子，丁香，麝香，礬石，鐵衣，乾薑，破故靴底灰，梔子，細辛，乾蝦蟆五月五日。土瓜根，芥子，蜀椒，葶藶，菖蒲各等分。　右十九味，治下篩，以竹筒吹杏仁大著大孔中。所有患瘑瘡上，悉傳之。其丁香麝香別研，擣著藥中合之。一方有寒石泔淀救月木楸葉爲二十二味，若大者，用灌方如左：

㊾灌方

(六一)白朮黃芪湯 服前藥痢雖已除猶宜此藥和之

芍藥一兩 當歸五錢 大黃 黃芩各二錢半 黃連 木香 檳榔各一錢 右爲末每服三五錢水一盞煎至七分去滓温服。如未止再服，不後重則止。

(六二)地楡芍藥湯 治瀉痢膿血，乃至脫肛。

蒼朮一兩， 地楡二兩， 卷柏， 芍藥各三兩， 右㕮咀，每服一兩，水一大盞半，煎至一半温服。病退止藥。

(六三)益元散 治身熱腸澼，下痢赤白，孕婦不宜服，滑胎也。

桂府膩白滑石六兩， 甘草炙一兩。 右爲末每服三錢，蜜少許，温水調下，無蜜亦得。日三服。欲冷飲者，新汲水調下。

(六四)元青丸 治下痢勢惡，頻併窘痛，或久不愈，諸藥不能止，須可下之，以開除濕熱，痞悶積滯，而使氣液宣行者，宜以逐之，兼宣利積熱，酒食積，黃瘦中滿，水腫腹脹，兼療小兒驚疳積熱乳澼諸證，唯泄瀉者勿服。

黃連， 黃蘗， 大黃， 甘遂， 芫花醋拌炒， 大戟，各半兩。 牽牛四兩，取末二兩。 輕粉二錢， 青黛一兩， 右爲末，水丸小豆大，初服十丸，每服加十丸，空腹，日午。臨臥三服，以快利爲度。後常服十五二十丸，數日後得食。久病未痊除者再加取利，利後却常服，以意消息，病去爲度，後隨證止之。小兒丸如黍米或麻子大，退驚疳熱積不下者，須常服十丸。

(六五)阿膠梅連丸 治下痢，無問久新赤白青黑疼痛諸證。

金井阿膠淨草灰炒透明白，別研，粗者再炒研細。 烏梅肉去核炒， 黃蘗剉炒， 黃連， 當歸焙， 赤芍藥， 乾薑炮， 赤茯苓半兩各等分。 右爲末，入阿膠研勻，水丸桐子大，温米飲下十丸，食前，兼夜五六服，小兒丸如菉豆大，忌油膩脂肥諸物也。

而失血色，肩髀疼，面及手足有浮氣或下血，乃死。以此方治之。

雄黃，青葙各二兩。苦參三兩，礬石，雌黃，鐵衣，藜蘆，各一兩。麝香三分別研。右八味，治下篩以竹筒內大孔中酸棗許，吹內下部中日一，不過三度。小兒以大豆許。此方極救死。

㉟越桃散　治下血及血痢。

越桃，梔子也。槐花　青州棗，乾薑。右等分，燒存性為末，陳米飲調下二錢。

㊱香豉湯　治下焦熱毒痢，魚腦雜痢，赤血，臍下小腹絞痛不可忍，欲痢不出。

香豉，薤白，各一升。黃連，黃蘗，白朮，茜根各三兩。梔子，黃芩，地榆，各四兩。右九味㕮咀，以水九升煮取三升，分三服。

㊲黃芩芍藥湯 河間下同　治泄痢腹痛，或後重身熱，久而不愈，脈洪疾者，及下痢膿血稠黏。

黃芩，芍藥，各一兩。甘草五錢。右為粗末，每服半兩，水一盞半，煎至一盞，濾清溫服，無時。如痛則加桂少許。

㊳大黃湯　治泄痢久不愈，膿血稠黏，裏急後重，日夜無度，久不愈者。

大黃一兩。右細剉，好酒二大盞，同浸半日許，同煎至一盞半，去大黃，將酒分為二服，頓服之，痢止，止一服。如未止再服，以利為度，服芍藥湯以和之，痢止再服黃芩湯和之，以徹其毒也。

㊴芍藥湯　行血調氣。

芍藥一兩，當歸，黃連，黃芩，各五錢，檳榔，木香，甘草炙，各二錢，大黃三錢，官桂一錢半。右㕮咀，每服半兩，水二盞，煎至一盞，食後溫清服。如血痢則漸加大黃，如汗後臟毒加黃蘗半兩，依前服

㊵白朮黃芪湯　服前藥痢雖已除，猶宜此藥和之。

甘草一錢[illegible]

⑫涼血地黃湯　治腸澼血穀與血另作一派，如唧桶湧出。

黃蘗去皮剉炒，　知母剉炒各一錢。　槐子炒，　青皮不去皮穰，　熟地黃，　當歸，各五分。　右件㕮咀，都作一服，水一盞煎七分去柤溫服。

⑬白朮安胃散　治一切瀉痢，無問膿血相雜，裏急窘痛，日夜無度。

五味子，　烏梅肉炒乾各五錢。　車前子，　茯苓，　白朮各一兩。　米殼三兩去頂蒂穰，醋煮一宿，炒乾，　右為末，每服五錢，水一盞半煎至一盞，去查空心溫服。

⑭聖餅子　治瀉痢赤白，臍腹撮痛久不愈者。

黃丹二錢，　定粉，　舶上硫黃，　密陀僧各三錢。　輕粉少許。　右細剉為末，入白麪四錢匕，滴水和如指尖大捻作餅子，陰乾，食前溫漿水磨服之，大便黑色為效。

⑮當歸和血散　治腸澼下血，濕毒下血。

川芎四分，　青皮，　槐花，　荊芥穗，　熟地黃，　白朮各六分。　當歸身，　升麻，各一錢。　右件為細末，每服二三錢，清米飲湯調下，食前。

⑯訶黎勒丸　治休息痢，晝夜無度，腥臭不可近，臍腹撮痛，諸藥不效。

訶子肉五錢，　椿根白皮一兩，　母丁香三十箇。　右為細末，醋麪糊丸如梧桐子大，每服五十丸，陳米飲湯入醋少許，五更送下。三日三服，效。

⑰訶子皮散　治寒滑，痢下赤白。

米殼去蒂蕚蜜炒，　橘皮各五分。　乾薑炮六分，　訶子煨去核七分。　右為細末，都作一服，水二盞，煎至一盞，和

(六六)牛黃神金丸　治大人小兒嘔吐瀉痢，無問久新赤白諸色，或渴或不渴，小便澀或不澀，并小兒驚疳積熱痃癖堅腹滿鞕痛發作往來，亦能寬膈消食。

輕粉，　粉霜，　硇砂，各別研，　雄黃研，　朱砂，　信砒，　巴豆去皮，各一錢。　黃丹，　蠟，各三錢。　右先研粉霜，次旋入硇砂研細，下雄黃硃砂信砒再研，下丹粉研勻，別研巴豆爛爲油，與前藥研勻，火上炙蠟軟，入藥勻搓作劑，旋丸小豆大，新水下一丸。小兒黍米麻子大。或止吐瀉痢疾，調桂苓甘露飮，或益元散亦得。

(六七)芍藥蘗皮丸　治一切蝕惡痢，頻年窘痛，無問膿血，並宜服之。

芍藥，　黃蘗，各一兩。　當歸，　黃連，各半兩。　右爲末，水丸如小豆大，溫水下三四十九，無時，兼夜五六服，忌油膩脂肥發熱等物。

(六八)杏仁丸　治一切赤白瀉痢，腹痛裏急後重者。

杏仁，　巴豆，各四十九箇去皮。　右以藥同燒存性，研細如泥，用蠟鎔和，旋丸如桐子大，每服一二丸，煎大黃湯，間日一服。

(六九)痢方千金方　治久寒宿疾，胃腹中痛，短氣，時滯下痢。

當歸，　桂心，各三兩。　乾薑四兩，　附子一兩。　右四味㕮咀，以水八升，煑取二升，分三服，日三。范汪無附子，用甘草二兩，云虛冷激痛者，加黃芪芍藥各二兩。

(七〇)閘板丹醫鑑　治痢初起，以此丹推蕩其邪毒。

黃丹水飛，　黃蠟，各一兩。　乳香，　沒藥，各一錢。　杏仁八箇，去皮尖。　巴豆八箇，去油。　右五味爲末，將黃蠟鎔化後，將藥末同蠟拌勻，攪冷成塊，每服一丸，如黃豆大，空心服。紅痢，冷甘草湯下，白痢，冷乾薑湯下，水瀉，冷米湯下。

當歸去蘆酒洗，芍藥，附子炮去皮臍，白朮，乾薑炮，厚朴薑製炒，阿膠蛤粉炒各一兩。烏梅肉二兩。右爲細末酢糊爲丸如梧桐子大，每服五十圓，空心用米飲送下。

(八四)香茸圓　治下痢危困。

麝香半錢別研臨時入，鹿茸燎去皮毛酥炙一兩。右鹿茸爲細末，方入麝香，以燈心煮棗肉爲圓，如梧桐子大，每服五十圓，空心食前，用米飲送下，若每料添滴乳香半兩尤有效。

(八五)茜根圓　治一切毒痢及蠱注痢血下如雞肝，心煩腹痛。

茜根洗，升麻，犀角鎊，地榆洗，白芍藥，當歸去蘆洗，黃連去鬚，枳殼去瓤麩炒。右等分爲細末，酢煮米糊爲圓，如梧桐子大每服七十圓，空心食前米飲送下。

(八六)木香檳榔丸　治痢。

木香，檳榔，青皮，陳皮，廣白朮，枳殼，黃連，黃蘗，大黃各半兩。丑末，香附各二兩，右爲末，水丸梧桐子大，每五六十丸，溫水下，量虛實與之。紺珠多三稜黃芩當歸分兩不同。

(八七)調胃承氣湯　治積滯成痢。

芒硝半斤，甘草炙二兩，大黃四兩去皮酒洗。右剉，每服臨期斟酌多少，先煮二味熟，去查下硝，上火煮二三沸，頓服之。

(八八)和中丸　治前證。

白朮二兩四錢，厚朴二兩，陳皮一兩六錢，半夏炮一兩，檳榔，枳實各五錢。甘草四錢，木香二錢。右用生薑自然汁浸蒸餅爲丸，每三十丸食遠溫水下。

粗空心熱服。

（七六）益智和中湯　治腸澼下血，或血色紫黑，腹中痛，腹皮惡寒，右手關脈弦，按之無力，而喜熱物熨之，內寒明矣。

肉桂一分，　桂枝四分，　牡丹皮，　柴胡，　葛根，　益智仁，　半夏，各五分。　歸身，　炙甘草，　黃芪，　升麻，　各一錢。　白芍藥一錢五分，　乾薑少許。　右爲粗末，都作一服，水三盞，煎至一盞，去粗，食後溫服。

（七七）槐花散　一名當歸活血湯，治腸澼濕毒下血。

川芎四分，　槐花，　青皮，　荊芥穗，　熟地黃，　白朮，各六分。　當歸身，　升麻，各一錢。　右爲細末，每服三錢，米飲湯調下，食前。忌酒濕麪生冷硬物。

（七八）茯苓湯　治因傷冷飯水泄，日夜走十行，變作白痢，次日，其痢赤白，腹中疠痛，減食熱躁，四肢沉困無力。

澤瀉一錢，　黃芩生三分，　當歸身四分，　肉桂，　炙甘草，各五分。　豬苓，　茯苓，各六分。　蒼朮，　生薑，　升麻，　柴胡，各二錢。　芍藥一錢半。　右㕮咀，如麻豆大，分作二服，每服水二盞，煎至一盞，去粗，稍熱，食前服之。

（七九）黑圓子 濟生方下同　治脾胃怯弱，飲食過傷，留滯不化，遂成滯下，宜速進此藥推導，更須斟酌受病深淺，增損圓數，還當逐盡積滯方佳；却徐徐補養之。

烏梅七個，　百草霜三錢　杏仁去皮尖三七枚，　巴豆去殼幷油二枚，　半夏湯泡七次九枚。　縮砂仁三七枚。　右爲細末和勻，用薄糊爲圓，如黍米大，每服十五圓，加至二十圓，用熟水送，薑湯亦得。更看虛實增損圓數。或因食生冷魚膾得病，用治中湯送下亦可。恐此藥倉卒不能辦，止用局方感應圓，少加巴豆，爲圓服之，亦佳。

（八〇）烏梅圓　治熱留腸胃，下痢純血，臍腹疠痛，或先經下痢，未斷服熱藥，蘊毒伏熱，滲成血痢，皆治之。

滯下門四

方二

㊇導滯湯入門下同　治下痢膿血，裏急後重，腹痛作渴，日夜無度。

芍藥一錢，　當歸，　黃芩，　黃連，各五分。　木香，　檳榔　甘草，各二分。　大黃三分，　肉桂二分半。　右水煎服。

一方無肉桂甘草，有枳殼。大要以芍藥甘草和中，止腹痛。惡熱痛加黃芩，惡寒痛加薑桂。以木香檳榔，行氣，除後重氣分加枳殼滑石寬腸，血分加當歸桃仁和血。以秦艽皂子袪腸風，黃芩黃連清熱毒，白朮陳皮調胃，茯苓澤瀉滲濕，山梔枳實消積。嘔吐加石膏陳皮山梔薑汁，痢已後重不解去檳枳，換條芩，加升麻提之。虛者減芩連大黃，氣虛加白朮黃芪砂仁。血虛加芎歸阿膠側柏葉炒乾薑。此方行血和氣，深合經旨。

㊈香連丸　治一切痢疾。

黃連五兩，　粉草二兩。　右同用蜜水略拌濕，置鍋中，重湯蒸，良久取出曬乾，如此者九次。後入木香一兩爲末，糊丸梧子大，每五十丸，空心溫酒米飲任下。

㊉加味香連丸　治痢疾臨危，諸方不效。急將蓮肉煎湯送下，被蓋取睡，效奏神矣。

(八九)水煑木香膏　治脾胃受濕，臟腑滑泄，腹中疼痛，日夜無度，腸鳴水聲，不思飲食，每欲痢時，裏急後重，或下赤白，或便膿血，並皆治之。

粟米殼蜜水浸濕炒黃六兩，乳香研，肉豆蔻，砂仁，各一兩半。當歸，白芍藥，木香，丁香，訶子皮，藿香，黃連，厚朴薑汁製，甘草炙，靑皮，陳皮各一兩。乾薑炮，枳實麩炒各半兩。右十七味爲細末，蜜丸如彈子大，每服一丸，水一鍾，棗一枚，擘開，煎至七分，和柤稍熱食前服。

當歸，厚朴，黃連各等分，[illegible]
有阿膠。

⑲養臟湯丸 治五色痢神效。

粟殼蜜炒一兩，陳皮，枳殼，黃連，木香，烏梅，杏仁，厚朴，甘草，各五錢。右黑豆棗子煎服。紅痢，生地甘草節春茶煎。久不效加龍骨赤石脂人參芍藥各一兩爲末，蜜丸梧子大每三十丸烏梅甘草煎湯或粟米飲下。

⑳黃連補腸湯 治大腸虛冷，痢下青白，腸中雷鳴。

黃連四錢，茯苓，川芎各三錢。地榆五錢，伏龍肝二錢，酸石榴皮五片。右每八錢，水煎服。

㉑百中散 治一切痢，不問赤白，或日百行，神效。

粟殼去粗皮，用薑汁浸一宿，炒乾。右爲末，每二錢，米飲調服，一服便疎，再服即愈。忌生冷油膩魚鮓毒物三日。方有厚朴薑製等分。

㉒氣痢丸

訶子，橘皮，厚朴，各三兩。右爲末，蜜丸梧子大，每三十丸，米飲下。

㉓胃風湯（見方下同） 治大人小兒風冷乘虛，客於腸胃，水穀不化，泄瀉注下，腹脅虛滿，腸鳴腹痛，及腸胃濕毒下如豆汁，或下瘀血。

白朮，白芍藥，川芎，人參，茯苓去皮，當歸，各二錢。甘草炙，肉桂去皮，各五分。右作一服，水二鍾，粟米一撮，煎至一鍾，不拘時服。

㉔地榆散 治大人小兒，脾胃氣虛冷熱不調，下痢膿血，赤多白少，或純下鮮血，裏急後重，小便不利。

黃連四兩，用吳茱萸水炒過，阿芙蓉二錢，木香一兩。右爲末，陳米糊丸菉豆大，每服二三十丸。

(七三)四味香連丸　治痢疾初起，不問赤白。

黃連炒十兩，大黃酒煨四兩，木香二兩，檳榔一兩。右爲末，糊丸菉豆大，每七十丸，空心米飲下，每日二服。有積自行，無積自止。如下痢色黑，大黃；色紫，地榆；色紅，黃芩；色淡，生薑；色白，肉桂；色黃，山樝；水瀉，粟殼；痛甚，木香、山梔各煎湯送下，如神。

(七四)六神丸　治痢。

黃連，木香，枳殼，茯苓，麥芽，神麯各等分。右爲末，神麯打糊，爲丸梧子大，每五十丸，赤痢倍用黃連甘草煎湯下，白痢倍用木香乾薑煎湯下，赤白痢甘草乾薑煎湯下。

(七五)加味淸六丸　治痢久不愈，下如淸涕，有紫黑血絲，原因飽食疾走，或極力呼號，毆跌多受疼痛，大怒不泄，補塞太過，火酒火肉，皆令血瘀所致。

滑石六錢，乳香，沒藥，桃仁，木香，檳榔，大黃各一錢。右爲末，神麴糊丸菉豆大，每百丸米飲下，以利盡穢物爲度。

(七六)古薑墨丸　治赤白痢。

乾薑炒，京墨煅各等分。右爲末，醋煮麪糊，爲丸梧子大，每服三五十丸，米飲下。

(七七)感應丸　治男婦小兒停積宿食，冷物不能剋化，有傷脾胃，或泄瀉臭穢，或下痢膿血，肚熱，心腹疼痛。

百草霜，丁香，乾薑各一兩。巴霜七十二枚，杏仁四十九粒，肉豆蔻二十一枚，木香二兩。右爲末，用

七十丸空心熬稀米粥飲送下。

㉒纏金丹　治大人小兒一切瀉痢，無問冷熱赤白，連綿不瘥，愈而復發，腹中疼痛者，宜服之。

硇砂，乳香，各二錢半。巴豆去皮心膜出油，杏仁去皮尖各八錢半。硃砂一兩，木鼈五錢，白膠香一錢，黃丹二兩半，砒霜酢煮煆三錢半，研入磁罐，以赤石脂鹽泥固濟，火燒通赤，候冷取出。右爲細末，鎔黃蠟一兩，溲和丸如麻子仁大，每服一丸，小兒半丸。水瀉新汲水下；赤痢甘草湯下；白痢乾薑湯下；赤白痢甘草乾薑湯下；並放冷，臨臥服。孕婦勿服。忌熱物一二時辰。一方鎔蠟入油二十點，和劑令軟，用油紙裹旋丸。

㉓白朮調中丸　治久痢赤白膿血相雜，多日羸瘦，不思飲食。

白朮五錢，神麴炒四兩，人參，茯苓，猪苓，澤瀉各三錢。木香二錢，官桂錢半，甘草炙，乾薑炮，各一兩，右爲末，麵糊爲丸如梧桐子大，每服空心，用淡生薑湯下。

㉔治痢仙方　歌曰：八痢臨終事可危，仙方等分與均醫。三香止痛最爲緊，四白和中不可虧。甘枳更加罌粟殼，訶榆全藉石榴皮。半夏厚朴黃連橘，救苦天醫只片時。

丁香，沉香，木香，白朮，白芷，白茯苓，白芍藥，甘草，枳殼，罌粟殼，訶子，地榆，酸石榴皮，半夏，厚朴，黃連，陳皮。右各一錢分五服，白加生薑，赤加烏梅煎，食前服。治一切瀉痢，腹痛久不瘥。

㉕斷痢散

肉荳蔻，乾薑，丁香，各二錢半。訶子去核，甘草炙，陳皮，各一兩。御米殼去蔕蜜炒三兩。右㕮咀，每服二錢半，水一盞，乳香一粒，粟米百粒，同煎至七分，去滓溫服，食前霍亂吐瀉，令冷服。

㉖六神散　治瀉痢赤白腹痛不可忍，痢久不止者。

地楡炒，乾葛各四錢。乾薑炮一錢，當歸，茯苓去皮，赤芍藥各三錢。罌粟殼蜜炙六錢。甘草炙二錢。

右爲細末，每服二錢，用溫熟水調下，不拘時服。

㉕聖散子　治男子婦人，遠年近日，赤白下痢，

罌粟殼去蔕蒸，黃蘗，枳殼，御米即粟殼子。甘草炙，各二錢。當歸，乾薑炮，各一錢。右作一服，水二鍾，薤白二條擘碎，同煎至一鍾，空心服。

㉖水煮木香丸　治一切下痢，赤白膿血相雜，裏急後重。

木香不見火，訶子肉炮，當歸各六兩。青皮，甘草各二兩四錢。罌粟殼二兩八錢。右爲細末，煉蜜爲丸如彈子大，每服一丸，用水一鍾，煎至六分，空心服。

㉗黃連阿膠丸　治冷熱不調，下痢赤白，裏急後重，臍腹疼痛，口燥煩渴，小便不利。

黃連三兩，茯苓，阿膠各二兩。右黃連茯苓爲末，熬阿膠溲和爲丸，如梧子大，每服五七十丸，空心用米飲湯下。

㉘地楡散　治血痢。

地楡，赤芍藥，黃連去鬚，青皮去白各等分。右爲末，每服三錢，漿水煎服。

㉙蒼朮芍藥湯　治痢疾痛甚者。

蒼朮一兩，芍藥五錢，黃芩，官桂各二錢半。右作一服，水二鍾，煎至一鍾，食前服。

㉚露宿湯　治一切痢。

酸石榴皮，草菓各一錢半。椿根皮二錢半，青皮二錢，杏仁十四箇，甘草一錢。右作一服，用水二鍾，生

痛，臍下強急，或大便不調，米穀遲化，裏急後重，下痢膿血，或下五色，或便如魚腦，或如豆汁，或有鮮血，或如爛肉相似，日夜無度，久而不愈，嗜臥怠惰，虛羸肢體沉困，寒熱時作，此藥能固養脾胃，溫中，止腹痛，服之甚有所益。

訶子皮，　乾薑炮，　丁香，　肉豆蔻麪裹煨，　鰞鰂骨去皮，　赤石脂，　甘草炙黃各一兩。　御米殼五兩搗碎醋炒，　右爲細末，每服先用水一盞，入乳香少許，煎五七沸，調藥末二錢，食前熱服。

㉝苦蔞散　治五色痢疾久不愈者。

苦蔞一箇，黃色者，炭火煨存性，蓋地下一宿出火毒。　右研爲細末，作一服，用溫酒調服。胡大卿有一僕患痢二年，至杭州遇一道人傳此方而愈。

㉞止痢法

肉豆蔻一箇，　訶子二箇炮去核。　右爲末，每服一錢，空心用米飲調下。

㉟百歲丸　治一切惡利，雜下赤白及休息等痢。

漏蘭子一箇大者，　阿膠，　木香，　罌粟殼淨，　黃連各五錢。　乳香少許另研。　右除乳香外，將餘藥剉作小塊，炒令焦黑色，存半性，不令煙絕，研爲末，入乳香和勻，用麪糊和丸如梧桐子大，每一歲服一丸，十歲服十丸，依歲數服之，不拘時，米飲送下。

㊱玉粉散　治血痢，解臟腑積熱毒。

海粉。　右爲細末，每服二錢，蜜水調服。

㊲木香散　治隔年痢不止，并血痢。

御米殼蜜炙一兩，　青皮，　陳皮，　烏梅肉，　乾薑炮，各五錢。　甘草炙三錢。　右件㕮咀，每服四錢，水一盞半，乳香一粒，同煎至六分，去滓溫服，食前，日進三服。一方無乳香。赤痢冷服；白痢熱服；花痢溫服。一方無乾薑。

㉗如聖散　治一切痢疾，無問久新，或赤或白，或赤白相雜，日夜無度，悉能治之，頗效。

當歸，　地榆，　縮砂仁，　赤石脂，　陳皮，　乾薑，　石榴皮，　訶子肉，　罌粟殼，　甘草各等分。　右爲粗末，每服三錢，水一盞半，入陳霜梅一箇，煎至七分，去滓。赤痢冷服，白痢熱服，赤白痢溫服，高年娠婦小兒皆可服，忌生冷油膩物。

㉘痢藥乳香散

白梅，　棗子，　罌粟殼各一兩。　訶子俱燒灰半兩。　右爲粗末，每服一二錢，用水一小盞，入乳香一小豆許，同煎至七分，不拘時溫服。

㉙遇仙立效散　治諸般惡痢，或赤或白，或濃淡相雜，裏急後重，臍腹疼痛，或下五色，或如魚腦，日夜無度，或禁口不食，不問大人小兒，虛弱老人，產婦，並宜服之。

當歸洗，　甘草炙，　御米殼去蔕蓋炒黃，各二兩。　赤芍藥，　地榆，　酸石榴皮，各五錢。　右爲粗末，每服三錢，水一盞半，煎至七分，空心溫服。小兒量歲數加減，以瘥爲度，忌生冷油膩腥臊等物。一方入赤茯苓北棗等分。

㉚犀角丸　但是痢服之無不瘥。

犀角屑，　黃連，　苦參，　當歸，　黃蘗並取粉。　右各擣研爲末，各等分和勻，空腹，爛煮糯米飲調方寸匕服之。日再服，忌黏滑油膩生菜。

㉛聖棗子　治一切下痢，臍腹疼痛。

[illegible]一枚。右爲末，每服一錢，大乾棗一枚，去核，先入

細辛八銖，牽牛四銖，麻黃，官桂各三分，芎藭，白朮各二兩，藁本，獨活，桔梗，防風，白芍，白芷各五錢。丹皮，甘草各一分。右爲細末每服二錢非時熱湯調下和滓熱喫若喫兩三盞後寒熱不退。宜用後方。

㉕還眞散　治毒痢初得時，先發寒熱，服前方，寒熱已退，赤痢已消減，宜進此還眞散。若服前方，寒熱未退，赤痢未消減，更不宜進此藥。

訶子五箇，用麪裹火焙熟，不要生，亦不要焦，去麪不用，就熱咬破訶子，去核不用，只用皮焙乾。右搗羅爲細末，每服二錢匕，以米湯一盞半同藥煉取一盞，空心和滓喫。若吐出一兩口涎更佳，如此喫經數盞，大腑漸安，出後減少，修合第三方藥喫以牢固大腸，若喫前方藥，壯熱未退，血痢未減，不可進此藥。

㉖十寶湯　治冷痢如魚腦者，三服見效，甚疾。

黃芪四兩，熟地黃酒浸，白茯苓，當歸酒浸，人參，白朮炒，製半夏，白芍藥炒，五味子，官桂，各一兩。甘草五錢。右爲粗末，每服二錢，水一盞，生薑三片，烏梅一箇，煎至七分，食前溫服。

㉗外灸膏　治一切虛寒，下痢赤白，或時腹痛，腸滑不禁，心腹冷極，皆可用。

木香，附子炮，蛇牀子，吳茱萸，胡椒，川烏各等分。右爲細末，每藥末三錢，用麪二錢，用生薑自然汁，調作糊，貼臍中，上下以衣物蓋定，熨斗盛火熨之，痢止爲度。

㉘五神散　治大腸積冷，下痢不止，裏急後重，腹痛。

附子炮裂去皮臍，烏梅去核，各五錢。乾薑炮，訶黎勒煨去核，延胡索各一兩。右爲粗散，和白麪裹煨，慢火內燒令麪熟爲度，去麪焙乾爲細末，每服一錢，空心食前用米飲調下。

木香，　黃連炒，各五錢。　罌粟殼去蒂膜，蜜製炒，　甘草炙，各一兩。　右為末，入麝香少許，每服二錢，米湯調服。

㉘葛根湯　專治酒痢。

茯苓各二錢四分，　黃芩一錢二分，　甘草炙五分，　葛根，　枳殼，　半夏，　生地黃，　杏仁去皮尖。　右分作二貼，水二盞，黑豆百粒，生薑五片，白梅一箇，煎至一盞，去滓，食前溫服。

㉙木香散　治氣痢泄瀉，心腹疼痛。

肉豆蔻一枚，　木香，　沉香，　官桂，　沒藥，　胡椒，　當歸切焙，　乾薑炮，　附子，　炮裂去皮，　密陀僧　甘草炙各一分。　赤石脂，　龍骨，各五錢。　右為細末，每服一錢，食前，用米飲調下。

㉚歸連丸　治痢無問冷熱及五色痢，入口即定。

當歸，　黃蘗，　黃芩，　阿膠炒，　熟艾，各二兩。　黃連四兩。　右為末，以醇酢二升煮膠烊，下藥煮，令可為丸如豆大，每服七八十丸，日二夜一，用湯下。若產婦痢，加蒲黃一兩，煉蜜為丸。

㉛附子散　治冷熱痢腹痛，不能飲食。

木香五錢，　附子炮裂去皮臍，　黃連炒　龍骨，　地榆，各一兩。　當歸三分炒。　右為末，每服二錢，不拘時，以粥飲調下。

㉜加減當歸地榆散　治冷熱不調，氣毒惡毒，濕熱腸垢，毒痢休息，膏痢腥穢，乾嘔不食，肌熱，小便澀。

當歸焙一兩，　地榆，　黃連揀淨，　甘草炒，　芍藥，各五錢。　御米殼蜜炒二兩。　右㕮咀，每服三錢，水一盞半，煎至七分，去滓，食前溫服，日進二服。如復痢，加黃連當歸一倍。

㉝和中散　治冷熱痢腹痛裏急。

歌曰：三片生薑三箇棗，一箇烏梅三寸草，更加鸎粟與陳皮，赤白痢疾一齊掃。

(四七)安和飲子　治赤白痢，不問老幼並治之。

鸎粟殼，　木香各二錢半。　甘草炙，　地榆各一錢。　右爲細末，每服三錢，米飲湯調下。

(四八)玉抱肚　治一切虛寒，下痢赤白，或時腹痛，腸滑不禁，心腹冷極者，可用。

鍼砂四兩炒，　白礬五錢，　官桂一兩。　右爲末，和勻作一包，冷水調，攤皮紙上，貼臍上下，以帛勒之。如覺大熱，即以衣襯之。藥乾，再以水濕令潤，其熱如初，可用三四次。

(四九)軟紅丸　消虛積，治冷熱不調，下痢赤白，膿血相雜。

乳香別研一皂角子大，　硇砂別研一皂角子大，　蠍二枚去毒，　續隨子四十九枚去皮，　粉霜。　黃丹俱別研，黃蠟各五錢。　朱砂一錢別研　巴豆二十箇，去皮不去油，研成膏。　右末共和勻，用磁器內鎔蠟成汁，入麻油半茶脚許，後入藥和丸，如菉豆大，留前朱砂一半爲衣，每服二十丸，乳香湯下。小兒丸如黃米大，每服一丸，乳香湯下，食前服。

(五〇)豆蔻丸　治白滯痢，腹臟撮痛。

肉豆蔻麪裹煨熟，　草豆蔻麪裹煨熟，　縮砂仁，　枇杷葉去毛尖，　母丁香，各一兩。　地榆二兩，　木香，　沉香，京墨燒紅，爲末，各五錢。　右爲細末，和粟米飯爲丸，如櫻桃大，每服二丸，食前用米飲化下。

(五一)雲母散　治久痢經年不瘥。

雲母粉，　白茯苓，　附子炮裂去皮臍各三分。　赤石脂，　龍骨各半兩。　右爲細末，每服二錢，食前用溫酒或米飲調下，亦治血痢。

㊴黃芪散　治熱痢下赤黃膿血，腹疼心煩。

黃芪剉，龍骨，當歸各三分。黃連微炒一兩　黃蘗，黃芩，犀角屑，地榆，各五錢。生地二分。右為細末，每服二錢，不拘時，用粥飲調下。

㊵犀角散　治熱痢，下赤黃膿血，腹痛，心煩困悶。

犀角屑，黃連微炒，地榆，黃芪各一兩。當歸炒五錢，木香三分。右為散，每服二錢，以水一盞，煎至六分，去滓不拘時溫服。

㊶黃連丸　一名羚羊丸，治一切熱痢及休息痢，日夜頻併，兼治下血黑如雞肝色。

黃連二兩半，羚羊角鎊，黃蘗各一兩半。赤茯苓五錢。右為細末，煉蜜和丸如梧桐子大，每服二十丸，薑蜜湯下。

㊷生地黃湯　治熱痢不止。

生地黃半兩，地榆三分，甘草炙一分。右㕮咀，如麻豆大，用水二盞，煎至一盞，去滓，分作二服，空心日晚溫服。

㊸鬱金散　治一切熱毒痢，下血不止。

鬱金，槐花炒，各五錢。甘草炙一分。右為細末，每服一二錢，食前用豆豉湯調下。

㊹如聖湯　治下痢赤白甚重者。

人參，當歸洗，各三寸。滴乳香一塊如黑豆大。甘草二寸炙，大北棗，烏梅各七枚。白豆蔻，罌粟殼去瓤蜜炒，砂仁，大丁香，各二十一箇。生薑二塊，大者濕紙裹煨熟。右為末分三服，水一盞半，煎七分，去滓服。不用粟殼亦可。

訶黎勒肉煨，華茇各一兩。甘草一分炙微赤，桂心五錢，右爲末用猪肝和搗二三百杵，丸如梧桐子大，每服二十丸，不拘時以粥飲下。

⑯倉廩湯　治噤口痢，有熱，乃毒氣衝心，食卽吐。

人參，茯苓，甘草炙，前胡，川芎，羌活，獨活，桔梗，柴胡，枳殼，陳倉米各等分。右㕮咀，每服五錢，水一盞半生薑三片，煎至七分，去滓，不拘時溫服。

⑰參苓白朮散　治胃虛口噤。

人參，茯苓，白朮，白扁豆薑汁浸炒去皮，山藥，蓮肉，縮砂仁，薏苡仁炒，甘草炙，桔梗，各二兩。右爲細末，石菖蒲煎湯下，宜食生韭菜。

⑱通神丸　治膿血雜痢，後重疼痛，日久不瘥。

五靈脂去砂研，沒藥研，乳香研各一錢。巴豆霜研五分，右再同研勻，滴水爲丸如黃米大，每服七丸。食前煎生木瓜湯下。小兒服三丸，隨歲加減。

⑲三奇散　治痢後裏急後重。

枳殼，黃芪，防風。右等分爲末，每服二錢，蜜湯調下，米飲亦得。

⑳白朮聖散子　治一切瀉痢久不瘥，幷婦人產後痢。

當歸，肉豆蔻，砂仁，石榴皮，訶子肉，陳皮，乾薑炮，甘草，白朮，芍藥。右各等分，㕮咀，每服五錢。水二盞，入乳香一豆許，煎至一盞，去滓，食前溫服。

㉑下痢方正傳下同　治久痢已數日，不能起牀，不食，疲弱之甚者。

㉜金星鱔散　治久痢。

金星鱔酢炙，　白礬，　鉛丹各五兩。　右爲細末，每服二錢，食前用米飲調下。

㉝蕪荑丸　治久痢不瘥，有蟲，并下部脫肛。

蕪荑炒，　黃連去鬚，各二兩。　蚺蛇膽五錢。　右爲細末，煉蜜和丸如梧桐子大，每服三十丸，食前用杏仁湯下。

㉞香粟散　治久新痢疾。

罌粟殼蜜炒二兩，　木香，　地榆，　陳皮留白，　乾薑炮，　甘草炙各五錢。　右爲粗末，每服三錢，水一盞半，棗一枚，煎至一盞，去滓，食前溫服。

㉟五奇湯　治久患痢疾，不問赤白，並皆治之。

訶子二枚，一枚生用，一枚用麪裹煨香熟，去核麪。　肉豆蔻，　草豆蔻，各二枚，俱如上製。　木香棗大，甘草一寸，如指面大，炮令赤色。　右爲細末，每服二錢，不拘時，用米飲下。

㊱麥糵丸　治休息痢，不能飲食及羸瘦。

大麥糵炒，　附子炮裂去皮臍，　白茯苓，　官桂，　陳麴炒，　烏梅肉炒，　人參各一兩。　右爲細末，煉蜜爲丸，如梧桐子大，每服三十丸，煮棗肉飲下，不拘時服。一方七月七日麴糊丸。

㊲茯苓湯　治痢後遍身浮腫。

赤茯苓，　白朮炒，　澤漆葉微炒，各一兩。　防己，　桑根白皮炙黃，　黃芩，　射干，　澤瀉各三兩。　右㕮咀，每服五錢匕，先以水三盞，煮大豆一合，取二盞，去滓，內藥，煎取一盞，分二服，未瘥，頻服兩料。

㊳消痞丸　治痢後肚腹滿悶。

閉等證。

茯苓，　澤瀉，　木通各二錢，　猪苓，　枳殼，　梔子或倍之，　車前子各一錢。　水一鍾半，煎八分，食遠溫服。

(一一三)清流飲　治陰虛挾熱，瀉痢，或發熱，或喜冷，或下純紅鮮血，或小水痛赤等證。

生地黃，　芍藥，　白茯苓，　澤瀉各二錢。　枳殼，　甘草各一錢。　當歸一二錢，　黃芩，　黃連各錢半。　水一鍾半，煎服。

(一一四)六味回陽飲　治脾腎虛寒痢疾。

當歸三錢，　人參一二兩或數錢，　炙甘草一錢，　製附子，　炮乾薑各二三錢。　熟地五錢或一兩，　水二鍾，武火煎七八分，溫服。

(一一五)理陰煎　此理中湯之變方也。治脾腎中虛痢疾。

熟地三五錢或一二兩，　當歸二三錢或五七錢，　炙甘草，　乾薑炒黃各一二錢。　或加肉桂一二錢。水二鍾，煎七八分，熱服。

(一一六)溫胃飲　治中寒嘔吐，呑酸瀉痢，不思飲食。

人參一二三錢或一兩，　白朮炒二三錢或一兩，　扁豆二錢炒，　炙甘草，　陳皮各一錢，不用亦可。　乾薑炒焦一二三錢，　當歸一二錢，滑泄者不用。　水二鍾煎七分，食遠溫服。

(一一七)五君子煎　治脾胃虛寒，嘔吐瀉痢而兼濕者。

人參二三錢，　白朮土炒，　白茯苓各二錢。　甘草炙一錢，　乾薑炒黃一二錢，　水一鍾半，煎服。加陳皮一錢，名六味異功煎，治證同而兼微滯者。

御米殼醋炒二分，人參，黃芪，地榆，砂仁，澤瀉各半錢。白朮，芍藥，陳皮，各一錢。當歸七分，木香，炙甘草，升麻，白蔻各三分。右細切作一服，水一盞半，煎至一盞去柤溫服。

(一七六)經驗三根飲　治休息痢，年久不愈者，其效如神。

五倍木根，蒼耳草根，臭樗木根白皮各等分。右細切每七錢，生薑三片，大棗一枚，大黑豆三十六粒，糯米四十九粒，水二盞，煎至一盞，去柤溫服。

(一七七)右歸飲景岳全書下同　此益火之劑也。凡痢疾命門之陽衰陰勝者，宜此方加減主之。

熟地二三錢，或加至一二兩。杜仲薑製　枸杞，山藥炒各二錢，肉桂，甘草炙，各一二錢。製附子一二三錢，山茱萸一錢。右水二鍾，煎七分食遠溫服。

(一七八)加減一陰煎　治水虧火盛，宜用此方。

生地，芍藥，麥冬各二錢。熟地三五錢，炙甘草五七分。知母，地骨皮，各一錢。右水二鍾，煎服。

(一七九)赤金豆　治諸積不行，凡血凝氣滯，疼痛腫脹，蟲積結聚，癥瘕瀉利，宜此主之。

巴霜去皮膜略去油一錢半，生附子切略炒，皂角炒，各二錢。丁香，天竺黃，木香，各三錢。輕粉一錢。右爲末，醋浸蒸餅爲丸蘿蔔子大，朱砂二錢爲衣，欲漸去者，每服五七丸，欲驟行者，每服一二十丸，用滾水或煎藥，或薑醋茶蜜茴香史君子煎湯爲引送下。若利多不止，可飲冷水一二口即止。蓋此藥得熱則行，得冷則止也。

(一八〇)百順丸　治一切陽邪積滯，痢疾泄瀉。

川大黃錦紋者一斤，牙皂角炒微黃一兩六錢。右爲末，用湯浸蒸餅，搗丸菉豆大，每用五分或一錢，或二三錢，酌宜用引送下，或用蜜爲丸亦可。

80

兩，　煉白蜜為丸或山藥糊丸如梧桐子大，每服六七十丸或百丸，滾白湯下。

⑮聖朮煎　治飲食偶傷，或寒濕瀉痢，嘔吐，尤為聖藥。

白朮炒五六七八錢或一二兩，　乾薑炒黃，　肉桂各一二錢。　陳皮酌用或不用。　水一鍾半，煎七分，溫熱服。

（一七七）胃關煎　治脾腎虛寒，腹痛不止，冷痢等證。

熟地三五錢或一兩，山藥炒，扁豆炒，各二錢。炙甘草一二錢，焦乾薑，白朮炒，各一二三錢。吳茱萸製五七分。水二鍾，煎七分，食遠溫服。

（一七八）佐關煎　治生冷傷脾，瀉痢未久，腎氣未損者，宜用此湯以去寒濕，安脾胃，此胃關煎之佐者也。

厚朴炒，陳皮炒，各一錢。山藥炒，扁豆炒，猪苓，澤瀉，各二錢。肉桂，乾薑炒，各一二錢。炙甘草七分，水一鍾半，煎服。

（一七九）抑扶煎　治暴傷生冷，致成瀉痢。

厚朴，陳皮，烏藥，各一錢五分。炙甘草一錢，猪苓，澤瀉，各二錢。乾薑炮一二錢。吳萸五分。水一鍾半，煎七分，食遠溫服。

（一八〇）四維散　治脾腎虛寒滑脫之甚，或泄痢不能止，或氣虛下陷，二陰血脫不能禁者，無出此方之右。

製附子，乾薑炒黃，各二錢。炙甘草一二錢，烏梅肉五分或一錢，人參一兩，右為末，和勻，用水拌濕，蒸一飯頃取起，烘乾，再為末，服一二錢，溫湯調下。

（一八一）五德丸　治脾腎虛寒，或暴傷生冷，或受時氣寒濕，或酒濕傷脾，腹痛作泄，或飲食失宜，嘔惡痛泄痢疾等證。

北五味二兩，或以肉豆蔻麪裹煨代或用烏藥。　補骨脂酒炒，乾薑炒，各四兩。吳茱萸製，木香，各二兩。湯浸蒸餅丸梧桐子大，每服六七十丸，甚者百丸，滾白湯或人參湯或米湯俱可下。

（一八二）復陽丹　治陰寒嘔吐，泄瀉腹痛，痢疾等證。

醫部彙考二百六十三

滯下門五

單方

赤痢熱躁，粳米半升，水研取汁，入瓷瓶中，蠟紙封口，沉井底一夜，平旦服之有效。普濟方。

下痢禁口，糯穀一升，炒出白花去殼，用薑汁拌濕，再炒為末，每服一匙，湯下，三服即止。經驗良方。

赤痢不止，秫米一把，鯽魚鮓二臠，薤白一虎口，煮粥食之。普濟方。

泄痢赤白，罌粟子炒，罌粟殼炙，等分為末，煉蜜丸梧子大，每服三十丸，米飲下。百一選方。

熱痢便血，罌粟殼醋炙一兩，陳皮半兩，為末，每服三錢，烏梅湯下。普濟方。

下痢赤白，金剛根蠟茶等分為末，白梅肉搗丸芡子大，每服五七丸，小兒三丸，白痢甘草湯下，赤痢烏梅湯下。易簡方。

禁口痢疾，蕎麥麪每服二錢，砂糖水調下。

久痢，阿芙蓉小豆許，空心溫水化下，日一服，忌葱蒜漿水，若渴，飲蜜水解之。

赤白痢下，鴉片木香黃連白朮各一分，研末，飯丸小豆大，壯者一分，老幼半分，空心米飲下，忌酸物生冷油膩茶酒

血痢白痢，冬葵子為末，每服二錢，入臘茶一錢，沸湯調服，日三。

水穀痢疾，韭菜作羹粥，煠炒任食之，良。食醫心鏡下同。

赤白下痢，用葱白一握，細切，和米煮粥，日日食之。

血痢不止，地錦草曬研，每服二錢，空心米飲下。乾坤生意。

赤白痢下，薤白一握，同米煮粥，日食之。食醫心鏡。

赤痢不止，薤同黃蘗煮汁服之。陳藏器。

寒瘧冷痢，端午日以獨頭蒜十箇，黃丹二錢，搗丸梧子大，每服九丸，長流水下，甚妙。普濟方。

血痢不止，地膚子五兩，地榆黃芩各一兩，為末，每服方寸匕，溫水調下。

血痢腹痛日夜不止，以蕓薹搗汁一合，入蜜一合，溫服。聖惠方。

下痢禁口，蘿蔔搗汁一小盞，蜜一盞，水一盞，同煎。早一服，午一服，日晡米飲吞阿膠丸百粒。如無蘿蔔，以子擂汁亦可。一方加枯礬七分同煎。一方只用蘿蔔菜煎湯飲之。

又方，用蘿蔔片不拘新舊，染蜜噙之，嚥汁，味淡再換，覺思食，以肉煮粥與食，不可過多。

冷痢不止，生薑煨研為末，共乾薑末等分，以酢和麪作餛飩，先以水煮，又以清飲煮，過停冷，吞二七枚，以粥送下，日一度。食療本草。

敕賜治痢方，以生薑切細，和好茶一兩椀，任意呷之，便瘥。若是熱痢，留薑皮；冷痢去皮，大妙。

痢及瀉血，胡荽子一合，炒擣末，每服二錢。赤痢，沙糖水下；白痢，薑湯下；瀉血，白湯下，日二。普濟方。

下痢禁口，用山藥半生半炒，為末，每服二錢，米飲調下。易簡方。

久痢不止，茄根燒灰，石榴皮等分，為末，以沙糖水服之。簡便單方。

麪，無不止者。口渴略飲米湯。

又方。罌粟花未開時，外有兩片青葉包之，花開卽落，收取爲末，每米飲服一錢，神效。赤痢用紅花者，白痢用白花者。

赤痢臍痛，黑豆茱萸子二件，搓摩吞嚥之良。經驗方。

赤白下痢，七月立秋日面西以井華水吞赤小豆七枚，一秋不犯痢疾。

赤痢不止，以大麻子水研濾汁煑菉豆食之，極效。粥食亦可。必效方。

久痢五色，大熟苦蔞一箇，煆存性，出火毒爲末，作一服，溫酒服之，有效。

赤白下痢，山豆根末蜜丸梧子大，每服二十丸，空腹白湯下，三服自止。

久痢成痔，葛勒蔓末，以管吹入肛中，不過數次如神。

血痢不止，用豉大蒜等分，杵丸梧子大，每服三十丸，鹽湯下。王氏博濟方。

血痢如刺，以豉一升，水漬相淹，煎兩沸，絞汁頓服，不瘥再作。

赤白重下，豆豉熬少焦，搗服一合，日三。或炒焦以水浸汁服，亦驗。

又方。用豉心炒爲末，一升分四服，酒下，入口卽斷也。

休息久痢，白豆腐醋煎食之，卽愈。普濟方。

血痢不止，地榆曬研爲末，每服二錢，摻在羊血上炙熟食之，以撚子煎湯送下，或以地榆煑汁，熬如飴狀，一服三合。

亦用前湯化下。

營衞氣虛，風邪襲入腸胃之間，便痢赤白，臍腹㽲痛，裏急後重，煩渴脹滿，不進飲食，用乾蒸餅蜜拌炒二兩，御米殼蜜炒四兩，爲末，煉蜜丸芡子大，每服一丸，水一盞，煎化熱服。通用妙方。

[illegible]，[illegible]二兩，[illegible]二合，水煎服，日二次。聖濟總錄。

集簡方。

下痢脫肛，橡斗子燒存性研末，猪脂和傅。直指方。

赤白久痢，不拘大人小兒，用新槲皮一斤，去黑皮切，以水一斗，煎取五升，去滓煎膏和酒服。

久痢不止，槲白皮薑汁炙五度，一兩，乾薑炮半兩，爲末，每服二錢，米飲調下。聖濟總錄下同。

赤白痢，荔枝殼橡斗殼炒，石榴皮炒，甘草炙，各等分，每以半兩，水一盞半，煎七分，溫服，日二服。

久痢休息，熟附子半兩研末，雞子白二枚，搗和丸梧子大，傾入沸湯，煮數沸，漉出，作兩服，米飲下。

久冷下痢，或不痢，腰痛苦冷，用蜀椒三升，酢漬一宿，麴三升，同椒一升，拌作粥食，不過三升瘥。千金方。

赤白下痢，胡椒菉豆各一歲一粒，爲末，糊丸梧子大，紅用生薑，白用米湯下。集簡方。

下痢禁口，獨將軍草根有珠如豆者，取珠搗汁三匙，以白酒半杯和服。

赤痢臍痛，茱萸合黑豆湯吞之。千金方。

赤白痢下，五月五日采青蒿艾葉等分，同豆豉搗作餅，日乾，名蒿豉母，每用一餅，以水一盞半煎服。總錄。

赤白下痢，龍牙草五錢，陳茶一撮，水煎服，神效。醫方摘要。

熱毒下痢，赤白以好茶一斤，炙搗末，濃煎一二盞服。久患痢者，亦宜服之。孟詵。

又方。用蠟茶，赤痢以蜜水煎服，白痢以連皮自然薑汁同水煎服，一二服即愈。直指方。

又方。用蠟茶二錢，湯點七分，入麻油一蜆殼和服，須臾腹痛大下即止。經驗良方。

又方。蠟茶末，以白梅肉和丸，赤痢甘草湯下，白痢烏梅湯下，各百丸。

又方。建茶合酢煎，熱服，即止。

痢疾禁口，木鼈子六箇，去殼取淨仁，研泥，分作二分，用麪燒餅一箇，切作兩半，只用半餅作一竅，納藥在內，乘熱覆在病人臍上，一時再換半箇熱餅，痢止思食。經驗方。

血痢下血，木耳炒研五錢，酒服。亦可用井華水服，或以水煑鹽酢食之，以汁送下。普濟方

積年痞痢，取狼把草二斤，搗絞取汁一小升，納白麪半斤，雞子少許，和勻，空腹頓服。極重者不過三服。或收苗陰乾搗末，蜜水半盞，服一方寸匕。

赤痢腹痛，陳白梅同眞茶蜜水，各半煎飲之。直指方下同。

又方。用烏梅肉炒黃連各四兩爲末，煉蜜丸梧子大，每米飲服二十丸，日三服。

便痢膿血，烏梅一兩，去核燒過爲末，每服二錢，米飲下，立止。

久痢不止，腸垢已出，用烏梅肉二十箇，水一盞煎六分，食前分二服。

又方。烏梅肉白梅肉各七箇，搗爛入乳香末少許，杵丸梧子大，每服二三十丸，茶湯下，日三。

冷痞痢下，莨菪子爲末，臘猪脂和丸，綿裹棗許，導下部，因痢出，更納新者，不過三度，瘥。必效方。

赤白下痢，腹痛，腸滑後重，大黃煨半兩，莨菪子炒黑一抄，爲末，每服一錢，米飲下。普濟方。

痢血五色，或膿或水，冷熱不調，酸石榴五枚，連子搗汁二升，每服五合，神妙。千金方

赤白痢下，腹痛，食不消化者，用酸石榴皮炙黃爲末，棗肉或粟米飯和丸梧子大，每空腹米飲服三十丸，日三服，以止爲度。如寒滑加附子赤石脂各一倍。

又方。用榴皮燒存性爲末，每米飲服方寸匕，日三服，效乃止。

久痢，陳石榴皮酢者焙研細末，每服二錢，米飲下。患二三年或二三月，百方不效者，用之便止，不可輕忽。

熱痢不止，車前葉搗汁，入蜜一合，煎溫服。聖惠方

方服之而愈也。孫兆祕寶方。

裏急後重不蛀皂角子米糠炒過，枳殼炒等分爲末，飯丸梧子大，每米飲下三十丸。普濟方。

驟然冷痢白凍欲死不拘男婦用五月五日采麻葉陰乾爲末每服二錢冷水調下。勿喫熱物，令人悶倒，只喫冷物，小兒半錢。

下痢禁口，肥皂莢一枚，以鹽實其內，燒存性爲末，以少許入白米粥內食之，即效。乾坤生意。

血痢不止，沒石子一兩爲末，飯丸小豆大，每食前米飲下三十丸。普濟方。

赤白下痢，雞冠花煎酒服，赤用紅，白用白。集簡方。

又方。蒼耳草不拘多少洗淨，用水煮爛去滓入蜜，用武火熬成膏，每服一二匙，白湯下。醫方摘元。

凡痢下應先白後赤，若先赤後白爲腸蠱，牛膝二兩搗碎，以酒一升漬一宿，每飲一兩杯，日三服。肘后方。

下痢轉白，訶子二箇，一炮一生，爲末，沸湯調服。水痢加甘草末一錢。普濟方。

赤白下痢，訶子十二箇，六生六煨，去核焙爲末。赤痢生甘草湯下；白痢，炙甘草湯下，不過再服，濟急方。

熱痢腹痛，胡黃連末，飯丸梧子大，每米湯下三十丸。鉤元。

積滯泄痢，腹痛裏急，杏仁去皮尖，巴豆去皮心，各四十九箇，同燒存性，研泥鎔蠟，和丸菉豆大，每服二三丸，煎大黃湯下，間日一服。一加百草霜三錢。宣明方。

氣痢赤白，巴豆一兩，去皮心，熬研，以熟猪肝丸菉豆大，空心米飲下三四丸，量人用。經驗方。

赤白下痢，陰陽交帶，不問赤白，劉寄奴烏梅白薑等分，水煎服。赤加梅，白加薑。如宜方。

冷痢腹痛不能食者，肉豆蔻一兩，去皮，醋和麪裹煨，搗末，每服一錢，粥飲調下。聖惠方。

下痢禁口，沙糖半斤，烏梅一箇，水二椀，煎一椀，時時飲之。摘元方。

久痢禁口，石蓮肉炒爲末，每服二錢，陳倉米調下，便覺思食，甚妙，仍以日照東方壁土炒眞橘皮爲末，薑棗略煎佐之。加入香連丸尤妙。丹溪心法。

下痢赤白，端午日午時取完好荸薺洗淨拭乾，勿令損破，放瓶內，入好燒酒浸之，黃泥密封收貯，遇有患者，取二枚細嚼，空心用原酒送下。經驗方。

血痢瀉血，烏藥燒存性研，陳米飯丸梧子大，每米飲下三十丸。普濟方。

血痢不止，苦參炒焦爲末，水丸梧子大，每服十五丸，米飲下。仁存堂方。

休息痢疾，日夜無度，腥臭不可近，臍腹疼痛，用椿根白皮訶黎勒各半兩，母丁香三十箇爲末，酢糊丸梧子大，每服五十丸，米飲下。

又方，用椿根白皮，東南行者，長流水內漂三日，去黃皮焙爲末，每一兩加木香二錢，粳米飯爲丸，每服一錢二分，空腹米飲下。

水穀下痢，及每至立秋前後，卽患痢兼腰痛，取樗根一大握，擣篩，以好麪捻作餛飩，如皂子大，煮熟，每日空心服十枚，並無禁忌，神效。傳信方。

下利清血，腹中刺痛，椿根白皮洗刮曬研，酢糊丸梧子大，每空心米飲下三四十丸。一方加蒼朮枳殼減半。經驗方。

血痢不止，薄荷葉煎湯常服。普濟方。

諸痢久下，艾葉陳皮等分煎湯服之，亦可爲末，酒煮爛飯和丸，每鹽湯下二三十丸。聖濟總錄。

久痢休息，時止時作，鼠尾草花擣末，飲服一錢。聖惠方。

又方黃連二兩，熟艾如鴨子大一團，水三升，煮取一升，頓服立止。肘后方

赤白痢下，令人下部疼重，故名重下，日夜數十行，臍腹絞痛，以黃連一斤，酒五升，煮取一升半，分再服，當止絞痛也。肘后方。

毒痢禁口，水蛙一箇，并腸肚搗碎，瓦烘熱，入麝香五分，作餅貼臍上，氣通即能進食也。

赤白痢下，用甘草一尺，炙劈破，以淡漿水蘸水一升半，煎取八合，服之立效。

傷寒毒痢，傷寒八九日至十餘日，大煩渴作熱，三焦有蟨𧏾，下痢，或張口吐舌，自爛口舌生瘡，不識人，用此除毒熱，止痢。龍骨半斤，水一斗，煮四升，沉之井底，冷服五合，漸漸進之。外臺方。

下痢禁口，人參、蓮肉各三錢，以井華水二盞，煎一盞，細細呷之，或加薑汁炒黃連三錢。頁選方。

久禁脫肛，白龍骨粉撲之。姚和衆方。

赤白久痢，並無寒熱，只日久不止，用黃連四十九箇，鹽梅七箇，入新瓶內燒煙盡，熱研，每服二錢，鹽米湯下。護命方。

禁口痢疾，雞內金焙研，乳汁服之。

血痢不止，白紙三張，裹鹽一匙，燒赤研末，分三服，米飲下。聖惠方。

下痢腹痛，羊脂、阿膠、蠟各二兩，黍米二升，煮粥食之。千金方。

下痢裏急，穿山甲、蛤粉等分，同炒研末，每服一錢，空心溫酒下。普濟方。

久痢禁口，病勢欲絕，用金絲鯉魚一尾，重一二斤者，如常治淨，用鹽醬葱，必入胡椒末三四錢，煮熟，置病人前嗅之，欲喫隨意，連湯食一飽，病即除根，屢治有效。醫方摘要

赤白痢下，黃雀兒去腸肚皮毛，以巴豆仁一枚入肚內，瓶固濟，煅存性，研末，以好酒煮黃蠟百沸，取蠟和丸梧子大，

痢頻脫肛，黑色堅硬，用巴豆殼燒灰，芭蕉自然汁煮，入朴硝少許，洗軟，用眞麻油點火滴於上，以枯礬龍骨少許爲末，糝肛頭上，以芭蕉葉托入。

老少瘴痢，日夜百餘度者，取乾楮葉三兩，熬搗爲末，每服方寸匕，烏梅湯下，日再服。取羊肉裹末，納肛中，利出即止。南行方

赤痢久下，累治不瘥，黃連一兩，雞子白和爲餅，炙紫爲末，以漿水三升，慢火煎成膏，每服半合，溫米飲下。一方，只以雞子白和丸服。勝金方。

順氣止痢，枳殼炒二兩四錢，甘草六錢爲末，每沸湯服二錢。嬰童百問。

血痢不止，胡黃連烏梅肉竈下土等分爲末，臘茶清下。普濟方。

五色痢疾，猬皮燒灰，酒服二錢。壽域方。

疳痢欲死，新羊屎一升，水一升，漬一夜，絞汁頓服，日午乃食。極重者，不過三服。總錄。

下痢赤白，生雞子一箇，取白攤綿連紙上日乾，摺作四重，包肥烏梅十箇，安熨斗中，以白炭燒存性，取出椀覆，冷定研末，入水銀粉少許。大人分二服，小兒分三服，空心井水調下。如覺微利，不須再服。活人書。

赤白下痢，雞卵一枚，取黃去白，入胡粉滿殼，燒存性，以酒服一錢。葛氏方。

赤白暴痢，如鵝鴨肝，痛不可忍者，用黃連黃芩各一兩，水二升，煎一升，分三次熱服。經驗方。

休息痢疾，經年不愈，取大蟲骨炙黃焦，搗末，飲服方寸匕，日三，取效。張大仲方。

禁口痢疾，臘肉脯煨熟食之，妙。李樓奇方。

治痢，黃連茱萸炒過四兩，木香麪煨一兩，粟米飯丸。錢仲陽香連丸，治小兒冷熱痢，加煨熟訶子肉。又治小兒瀉痢，

赤白下痢五六年者，荊瀝每日服五合。外臺祕要

下痢禁口，紅木槿花去蔕陰乾爲末，先煎麪餅二箇，蘸末食之。濟急方。

氣痢不止，寒食一百五日，采木蓼暴乾，用時爲末，粥飲服一錢。聖惠方。

赤痢不止，文蛤炒研末，水浸烏梅肉和丸梧子大，每服七十丸，烏梅湯下。

血痢禁口，用活鯽魚，翅側穿孔，去腸留鱗，入白礬末二錢，以楮包紙裹，煨存性研末，每服二錢，米飲下，每日二服。直指方。

禁口痢疾，用大田螺二枚，搗爛，入麝香三分，作餅烘熱，貼臍間，半日熱氣下行，卽思食矣，甚效。丹溪。

血痢不止，乳腐一兩，漿水一鍾，煎服。普濟方。

赤白痢，白雄雞一隻，如常作臛及餛飩，空心食。心鏡下同。

下痢禁口，黃肥母雞一隻，如常爲臛作濕餛飩，空心食之。

赤白下痢，腰痛，用猪腎二枚，研爛入陳皮椒醬作餛飩，空心食之，神效。食醫心鏡。

五痔下痢，兔屎燒炒半兩，乾蝦蟆一枚，燒灰爲末，綿裹如蓮子大，納下部，日三易之。聖惠方。

下痢腹痛，狗肝一具，切入米一升，煮粥，合五味食。心鏡。

疳痢垂死，新牛屎一升，水一升，攪澄汁服，不過三服。必效方。

下痢赤白，藍姑草卽淡竹葉，菜煎湯日服之。活幼全書。

下痢腹痛脫肛，延胡索末三錢，溫酒調下，卽納入少頃，大便行而痛遂止。

熱毒下痢，忍冬藤濃煎飲。聖惠方。

每服一二十丸。紅痢，甘草湯下；白痢，乾薑湯下。普濟方。

酒痢下血，百藥煎五倍子陳槐花等分焙研末，酒糊丸梧子大，每服五十丸，米飲送下。本事方。

下痢脫肛，百藥煎一塊，陳白梅三箇，木瓜一握，以水一椀，煎半椀，日二服。聖濟總錄。

下痢休息，杏仁去皮麩炒研，以猪肝一具切片水洗血淨，置淨鍋中，一重肝，一重杏仁鋪盡，以童便二升同煎乾，放冷，任意食之。聖惠方。

久痢赤白，馬糞一丸，燒灰水服。肘后方。

熱痢吐食，因服熱藥而致者，用糞中蛆，流水洗淨，曬乾爲末，每服一錢，米飲下。

痢及瀉血，烏龜肉以沙糖水拌椒和炙，煑食之，多度即愈。普濟方。

蠱痢下血，男婦小兒腹大，下黑血茶脚色，或膿血如淀色，柏葉焙乾爲末，與黃連同煎汁服之。本草圖經。

一切積痢，硇砂硃砂各二錢半爲末，用黃豆半兩，巴豆仁三七粒，去膜，同入磁器內，重湯煑一伏時候，豆紫色爲度，去二七粒，只將豆七粒，同二砂研勻，鎔蠟和收，旋丸菉豆大，或三丸或五丸，淡薑湯送下。本事方。

赤痢血痢，山漆三錢研末，米泔水調服即愈。

赤白久痢，臘月狗頭骨一兩半燒灰，紫筍茶末一兩爲末，每服二錢，米飲下。聖惠方。

休息痢疾，五十以上一二年不瘥，變成疳，下如泔淀者，用生羊肝一具切絲，入三年酢中吞之，心悶則止，不悶更服。一日勿食物，或以薑薤同食亦可，不過二三具。外臺。

濕䘌下痢不止，乾嘔羸瘦，多睡面赤，以膽汁和薑汁釅酢同灌下部，捻令酢氣上至咽喉乃止，當下五色惡物及蟲而愈也。拾遺。

治痢，杜蒺藜炒礦爲末，酒調下，三兩服。子和。

痢後脫肛，赤石脂伏龍肝爲丸傅之。一方加白礬。錢氏小兒方。

酒積下痢，石灰五兩水和作團，黃泥包煆一日夜，去泥爲末，酢糊丸梧子大，每三十丸薑湯空心下。摘元方。

血痢十年，石灰三升熬黃，水一斗投之，澄清，一服一升，日三服。崔知悌方。

久下白痢虛寒，秋月小腹多冷者，取古磚燒熱，布裹坐之，令熱氣入腹，良。

赤白下痢，用乾薑好墨各五兩爲末，酢漿和丸梧子大，每服三四十丸，米飲下，日夜六七服，愈。肘後方。

一切痢下初起，百草霜三錢，金墨一錢，半夏七分，巴豆煮十四粒，研勻，黃蠟三錢，同香油化開，和成劑，量大小，每服三五丸或四五十丸，薑湯下，一服如神，名鐵刷丸。潛江方。

休息下痢，經一二年不瘥，羸瘦衰弱，砒霜成塊者爲末，黃丹各半兩，化蠟入砒，以柳條攪，焦則換，至七條，取起收之，旋丸梧子大，冷水送下，小兒黍米大。局方。

血痢不止，蛇含石二枚，火煆酢焠，研末，每服二錢，米飲下。普濟方。

久痢成疳者，胡粉和水及雞子白服，以糞黑爲度，爲其殺蟲而止痢也。

下痢肛痛不可忍者，熬鹽包坐熨之。肘後方下同。

赤白痢下，頻數腸痛，官粉一兩，雞子清和，炙焦爲末，冷泉服一錢。

赤白痢下，用黃丹炒紫，黃連炒，等分爲末，以糊丸麻子大，每服五十丸，生薑甘草湯下。摘元方。

赤白下痢，密陀僧三兩，燒黃色，研粉，每服一錢，酢茶下，日三服。聖惠方。

赤白久痢積年不愈，調雲母粉方寸匕服，二服立見神效。千金方。

治久冷痢下，純白者，由積臥冷處，經久病發，遂令脾胃俱冷，日夜五六十行，大小腹痛不可忍。凡白痢屬冷，赤痢屬熱，皆宜好麴末五升，微熬令香，溫清醇酒令熱，和麴末一升，空心頓服之，日三服。若至食時，搗蒜一升，令至熟，下薑椒末，調和，如常食之。法惟須稠，勿加鹽，以水和麴二升作餺餅，極爛煑之，乾漉，熱內蒜薹臼中相和，一頓食之，少與餘食，至饑時仍準前食麴末酒，比至瘥來，少食餘食，以此法治，不過兩日，無有不瘥。

久冷或痢不痢間，但腹腰患苦冷，用上等新蜀椒三升，用酢宿漬之，以麴三升，和椒一升，緊拌煑作粥，空腹頓服之，加葱豉鹽，任性調和，不瘥更作，以瘥爲限，不過三升椒卽愈。此方不但治冷，大治諸虛損冷，極有所益，久當自知耳。

赤白下痢，臘月猪膽一百枚，每枚入雄黑豆，充滿，麝香少許，每服一枚，赤以甘草，白以乾薑湯送下。奇效良方

積久二三十年，常下痢，赤松皮去上蒼皮，切一斗，爲散，麪粥和一升，服之，日三服，瘥。不過服一斗，永瘥。二十年痢，服之百日，瘥。

酒痢便血，腹痛，或如魚腦五色者，乾絲瓜一枚，連皮燒研，空心酒服二錢。一方煨食之。經驗良方

赤白下痢，用酢榴根東生者一握，炙乾，水二大盞，濃煎一盞，空心服之。

大熱毒，純血痢不可瘥者，黃連六兩，㕮咀，以水七升，煑取二升半，夜露著星月下，旦起，空腹頓服之，臥將息，卽止。不瘥，加黃芩二兩，更作服之。仍不瘥者，以疳痢法治之。

赤白滯下，清酒五合，成煎猪膏三合，緩火煎十沸，適寒溫，頓服之，取瘥止。

又方。酒四升，煑錢四十文，取二升，分二服。

又方。亂髮雞子大，燒末，水服，不過三服。

治疳蝕痢，大麻子、胡麻各一升半，二物並熬令黃，以三升瓦瓶泥表，止厚一寸，待泥乾，內大麻等令滿，以四五枚葦

復留主腸澼便膿血，泄痢後重，腹痛如痓狀。
小腸腧主泄痢膿血，五色重下，腫痛。
束骨主腸澼泄。
太白主腹脹食不化善嘔泄，有膿血。
太衝曲泉主溏泄痢注下血。
赤白泄痢，灸小腸腧五十壯。
醫學綱目曰：『滯下獨取足太陰一經。』經云：『脾足太陰之脈所生病者，瘕溏泄，』視盛虛熱寒陷下取之也。
裏急後重，合谷外關。

導引

保生祕要曰：痢病導引法，撮緊穀道，交雙足而立，幷目存神，垂兩拳而直，縮腹聳肩，用意上提，力吸連三無間，督氣上升，瀉痢止矣。
運功先用歸元聚氣，以推大腸曲行，瀉火收回，復頭念臍，取靜候瀉定，服氣補之。
又法，推開肺經下大腸九曲去，又升腎水，上洗肺經。
禁口痢，推開心頭至腎，想腎水升至頂門，滴下心頭洗之，以覆臍中，轉周天法。
傷暑痢疾，運水洗肺經，推下大腸九曲去，瀉止後顧臍念之卽愈。
歸元聚氣訣：土者，圭元也，以一心敦養於土，六根皆歸於元，心有所注，久久凝定，便覺眞種，常在方可用意運行。行

血痢腹痛，膩粉五錢，定粉三錢，同研水浸蒸餅心少許，和丸菉豆大，每服七丸或十丸，艾一枚，水一盞，煎湯下。祕寶方。

鍼灸

甲乙經曰：暴病頭痛，身熱痛肌肉動，耳聾惡風，目眥爛赤，項不可以顧，髀樞痛泄，腸澼，束骨主之。

腸澼泄切痛，四滿主之。

便膿血，寒中，食不化，腹中痛，腹哀主之。

溏瘕，腹中痛，臟痹，地機主之。

腸澼，中郄主之。

病注下血，取曲泉五里。腸中有寒，泄注腸澼，便血，會陽主之。

腸鳴澼泄，下窌主之。

千金方曰：治腸中雷鳴，相逐痢下，灸承滿五十壯，穴在俠巨闕兩旁各二寸半，巨闕在心下一寸。

泄注五痢，便膿血，重下腹痛，灸小腸腧百壯。

泄痢不嗜食，雖食不消，灸長谷五十壯，三報穴，在俠臍相去五寸。

泄痢赤白，灸足太陰五十壯三報穴。

久泄痢，百治不瘥，灸足陽明下一寸高骨上陷中，去大指岐三寸，隨年壯。

又法，屈下量正當兩胯脊上點，訖下量一寸點兩旁各一寸，復下量一寸當脊上合三處，一灸三十壯，灸百壯以上，

視之，兩手脈皆濇且不勻，神思倦甚，飲食全減，因與四物湯倍加白朮爲君，以陳皮佐之，與十數貼而安。

浦江鄭兄年近六十，奉養受用之人也，仲夏久患滯下，而又犯房勞，忽一晚正走廁間，兩手舒撒，兩眼開而無光，尿自出，汗如雨，喉如拽鋸，呼吸甚微，其脈大而無倫次無部位，可畏之甚，余適在彼，急令煎人參膏，且與灸氣海穴艾炷如小指大，至十八壯右手能動，又三壯脣微動，參膏亦成，遂與一盞，至半夜後盡三盞，眼能動，盡二斤方能言而索粥，盡五斤而利止，十斤而安。

丹溪心法曰：一老人年七十，面白，脈弦數，獨胃脈沉滑，因飲白酒作痢，下血淡膿水，腹痛，小便不利，裏急後重，參朮爲君，甘草滑石檳榔木香蒼朮爲佐，下保和丸二十五丸，第二日前證俱減，獨小便不利，以益元散與之安。

趙立道年近五十，質弱而多怒，七月炎暑，大饑索飯，其家不能急具，因大怒，兩日後得滯下病，口渴，自以冷水調生蜜飲之，甚快，滯下亦漸緩，如此五七日，召余視，脈稍大不數，遂令止蜜水，渴時，且令以人參白朮煎湯調益元散與之，滯下亦漸收，七八日後覺倦甚發呃，余知因下久而陰虛也，令其守前藥，然滯下尚未止，又以煉蜜飲之，如此者三日，呃猶未止，衆皆尤藥之未當，將以薑附飲之，余曰：『補藥無速效，附子非補陰者，服之必死。』衆曰：『冷水飲多，得無寒乎？』余曰：『炎暑如此，飲涼非寒，勿多疑，待以數日，藥力到，當自止。』又四日而呃止，滯下亦安。

陳擇仁年近七十，厚味之人也，有久嗽病，而作止不常，新秋患滯下，食大減，至五七日後呃作，召余視之，脈皆豁大，衆以爲難，余曰：『形瘦者尙可爲。』以人參白朮湯下大補丸以補血，七日而安。

余族叔形色俱實，痎瘧又患痢，自恃強健能食，絕無忌憚，一日召余，曰：『卻健而能食，但苦汗出耳，汝能止此汗否？』余曰：『痎瘧非汗不能愈，可慮者，強健與能食耳，此非痢也，胃熱善消，脾病不化，食與積勢已甚矣，此時宜節擇飲食以養胃氣，省出入以避風寒，候汗透而安。』叔曰：『世俗謂無飽死痢疾，我今能食，何謂可慮？』余曰：『痢而

之之法，提意出上斡旋造化，從左而右，先運臍輪收而放，放而復收，以還本位，不離這箇念自歸眞矣。

周天法，先立安土守中得訣純熟後，行周天流通一身，散徹四肢，滯氣其法從前運於臍輪由小而大，大而收小，依次而上至璇璣穴，向左臂打圈而下至曲池經內關，遡掌心及指尖，圈出背外關而上肘後肩井及大椎，而下運於尾閭由下復上過玉枕，逾崑崙泥丸面部上鵲橋而降重樓，達胃口過臍至玉柱，復氣海行入右腿歷膝關由鞋勞穴穿足背至指尖，轉湧泉踵後上運，過陰谷通尾閭，又圈至頂門，如前下鵲橋，依次送左腿似右法而落湧泉，又昇泥丸及璇璣穴右行，照左手轉過肩背，貫崑崙而下攝元海，如此將週身經脈宣暢徐徐迴轉，但意至而氣自相隨，是爲有作之週天法，亦可與造化叅。

醫案

東垣十書曰：癸卯冬，白樞判家一老漢，面塵脫色，神氣特弱，病脫肛日久，服藥未驗，復下赤白膿，痢作，裏急後重，白多赤少，不任其苦，以求治。予曰：『此非肉食膏粱，必多蔬食或飲食不節，天氣雖寒，衣蓋猶薄，不禁而腸頭脫下者寒也。眞氣不禁，形質不收，乃血滑脫也。此乃寒滑氣泄不固，故形質下脫也。』用訶子皮散澀去其脫而除其滑，微酸之味，固氣上收，以大熱之劑而除寒補陽，以補氣之藥升陽益氣而安。

局方發揮曰：予從叔年踰五十，夏間患滯下，病腹微痛，所下褐色，後重頻併，穀食大減，時有微熱，察其脈皆弦而濇，似數而稍長，却喜不甚浮大，兩手相等，視其神氣大減。予曰：『此非滯下，憂慮所致，心血虧，脾氣弱耳』。遂與參朮爲君，當歸身陳皮爲臣，川芎炒白芍藥茯苓爲佐使，時暄熱甚，加少黃連，與兩日而安。

梅長官年三十餘，奉養厚者。夏秋間患滯下，腹大痛，有人教服單煮乾薑，與一貼，痛定少頃又作，又與又定。由是服

少宗伯顧東江，停食患痢，腹痛下墜，或用疏導之劑，兩足腫脹，食少體倦，煩熱作渴，脈洪數，按之微細，余以六君加薑桂各二錢，吳茱萸五味各一錢，煎熟冷服，睡覺而諸證頓退，再劑全退。此內眞寒而外假熱，故治以熱劑而冷飮。

判官汪天錫年六十餘，患痢腹痛後重，熱渴引冷，飮食不進，用芍藥湯內加大黃一兩，四劑稍應，仍用前藥，但大黃減半，數劑而愈。此等元氣，百無一二。

一上舍患痢後重，自知醫，用芍藥湯，後重益甚，飮食少思，腹寒肢冷，余以爲脾胃虧損，用六君加木香炮薑二劑而愈。

太僕楊舉元先爲飮食停滯，小腹重墜，用六君子湯，加升麻柴胡漸愈，後飮食難化，大便不實，裏急後重，數至圊而不得，用升陽除濕防風湯而痊。後心腹作痛，飮食不甘，用和中丸倍加益智仁而尋愈。

一老婦食後因怒患痢，裏急後重，屬脾氣下陷，與大劑六君，加附子肉蔻煨木香各一錢，吳萸五分，骨脂五味各一錢五分，二劑諸證悉退，惟小腹脹悶，此肝氣滯於脾也，與調中益氣加附子木香五分，四劑而愈。後口內覺鹹，此腎虛水泛，與六味地黃二劑愈。

先母年八十，仲夏患痢，腹痛作嘔不食，熱渴引湯，手按腹痛稍止，脈鼓指而有力，眞氣虛而邪氣實也。急用人參五錢，白朮茯苓各三錢，陳皮升麻附子炙甘草各一錢，服之睡覺索食，脈證頓退，再劑而安。此取證不取脈也。凡暴病當從證不從脈，時石閣老太夫人，其年歲脈證皆同，彼專治其痢，遂致不起。

廷評曲汝爲食後入房，翊午腹痛，似痢非痢，次日下皆膿血，煩熱作渴，神思昏倦，用四神丸一服頓減，又用八味丸料，加五味吳萸骨脂肉蔻二劑全愈。

司馬王荊山患痢後重，服枳殼檳榔之類，後重益甚，食少腹痛，余以爲脾胃傷而虛寒也，用六君加木香炮薑而愈。

祠部李宜散患血痢，胷腹膨脹，大便欲去不去，肢體殊倦，此脾氣虛弱，不能攝血歸源，用補中益氣加茯苓半夏治

能食者，知胃氣未病也，故言不死，非謂恣食不節擇也。』不從所言，恣口大嚼過多，又啖水果，如此者月餘，後強求治，不可著手矣，淹淹又月而死。內經以驕不論於理，爲不治之病，信哉！

周姓者，形色俱實，患痢，善食而易饑，大嚼不擇者五月矣。余責之曰：『病中當調補自養，豈可恣味戕賊？』遂教其只用熟蘿蔔喫粥，且少與調治，半月而安。

養痾漫筆曰：孝宗嘗患痢，衆醫不效，德壽憂之。過宮，偶見小藥肆，遣中使詢之曰：『汝能治痢否？』對曰：『專科。』遂宣之至，請問得病之由，語以食湖蟹多，故致此疾。遂令診脈，曰：『此冷痢也。其法用新採藕節細研，以熱酒調服。』』如其法杵細，酒調數服即愈。德壽大喜，就以杵藥金杵臼賜之，至今呼爲金杵臼嚴防禦家。

醫學正傳曰：一人年將五十，夏秋間得痢疾月餘，服藥而少愈，穢積已盡，但不食，晝夜五六次入廁，兼脫肛不安，又半月，諸藥不效。予記祖傳一方，用池塘中鼈一箇，如法修事，多用生薑米作羹，入沙糖一小塊，不用鹽醬，熟煮喫一二椀，三日不登廁，大腸自此實，肛門亦收而不脫矣。夫此證蓋因脾土受虛，致肺與大腸俱失化源之所滋養，故是大腸不行收令也。此母能令子虛耳。鼈乃介蟲，屬金而有土性，溫能補脾，肺又畏寒，先得芩連等寒涼之味，已多，今用生薑之辛以補肺金，用沙糖之甘以補脾土，肺氣既實，其大腸亦隨而實，故得以行收令也，故其功效如是之驗焉。

醫學綱目曰：余長兄九月得滯下，每夜五十餘行，嘔逆，食不下，五六日後加呃逆，與丁香一粒噙之，立止。但少時又至，遂用黃連瀉心湯加竹茹飲之，呃雖少止，滯下未安，如此者十餘日，遂空心用御米殼些少澀其滑，日間用參朮陳皮之類補其虛，自服御米殼後，呃聲漸輕，滯下亦收而安。

薛己醫按曰：崔司空年踰六旬，患痢赤白，裏急後重，此濕熱壅滯，用芍藥湯，內加大黃二錢，一劑減半，又劑全愈。惟

能視事。

奇效良方曰：唐太宗苦於氣痢，詔問有能治其疾者，當重賞。有術士張寶藏進此方，時賞官三品。方用牛乳半升，蓽茇末二錢匕，同煎減半，空心服。

昔有人患痢，便下膿血，忽見水浸甜瓜，心酷喜之，連皮食數枚，膿血皆已。

陳慶長子年十許歲，患禁口痢，水漿不入數日，惟能進藥。一人用山藥末米飲調服，一服而痢稍疎，三服遂思粥飲，頓食半盞許，自是痢止而安。

醫貫曰：一孕婦瘧痢齊發，醫治兩月餘。瘧止而痢愈甚，又加腹痛，飲食少進，延余視之。余曰：『虛寒也。』以補中益氣加薑桂，一服痢止大半，再一服而反加瘧病大作。主人驚恐，余曰：『此吉兆也。向者瘧之止，乃陰盛之極，陽不敢與之爭，今服補陽之劑，陽氣有權，敢與陰戰，再能助陽之力，陰自退聽。』方中加附子五分，瘧痢齊愈。大服補劑，越三月產一子，產後甚健。

寓意草曰：朱孔陽年二十五歲，形體清瘦，素享安逸，夏月因構訟，奔走於日中，暑濕合內鬱之火而成痢疾，晝夜一二百次，不能起牀，以粗紙鋪於褥上，頻頻易置，但飲水而不能進食，其痛甚厲，肛門如火烙，揚手擲足，躁擾無奈。余診其脈弦緊勁急，不爲指撓，謂曰：『此證一團毒火，鬱結在腸胃之內，其勢如焚，救焚須在頃刻，若二三日外，腸胃朽腐矣。』於是以大黃四兩，黃連甘草各二兩，入大砂鍋內煎，隨滾隨服，服下人事稍甯片刻，少頃仍前躁擾，一晝夜服至二十餘椀，大黃俱已煎化，黃連甘草俱煎至無汁。次日病者再求前藥，余診畢，見脈勢稍柔，知病可愈，但用急法，不用急藥，遂改用生地黃麥門冬各四兩，另研生汁，而以天花粉牡丹皮赤芍藥甘草各一兩，煎成和汁，大椀嘸之，以其來勢暴烈，一身津液從之奔竭，待下痢止，然後生津養血，則枯槁一時難回。今脈勢既減，則火邪俱退，不

之漸愈。後因怒，前證復作，左關脈弦浮，按之微弱，此肝虛不能藏血，用六味丸治之而愈。

古今醫統曰：一人病痢，窘迫，正合承氣證。予曰『氣口脈虛，形雖實而面黃白，必平昔過飽傷胃。』遂以人參白朮陳皮芍藥十餘貼。三日後，胃氣稍完，與承氣湯二貼而安。若不先補，雖愈未免困憊。

一人面白脈弦數，獨胃脈沉滑，因飲白酒作痢，下淡水膿血，腹痛，小便不利，裏急後重，以人參白朮為君，甘草滑石木香檳榔蒼朮為佐，煎湯下保和丸二十丸。次日證減，獨小便不利，再服益元散數服愈。

一人患痢，腹微痛，所下褐色，後重併頻，食減，或微熱，脈弦澀似數而長，喜不浮大，神氣大減。予曰：『此憂患所致，心血虧，脾氣弱耳。』以參朮為君，當歸陳皮為臣，川芎芍藥茯苓黃連為佐使而愈。

醫宗必讀曰：屯院孫瀟湘夫人下痢四十日，口乾發熱，不食，腹中脹悶，完穀不化，尚有謂其邪熱不殺穀者，計服香連枳殼豆蔻厚朴等三十餘劑，絕穀五日，命在須臾。迎余診之，脈大而數，按之豁然，詢得腹痛而喜手按，小便清利，此火衰不能生土，內眞寒而外假熱也。急煎附子理中湯，冰冷與服，一劑而痛止，六劑而熱退食進，兼服八味丸二十餘日，霍然起矣。

淮安郡侯許同生令愛痢疾腹痛，脈微而軟，此氣虛不能運化精微，其窘迫後重者，乃下陷耳。用升陽散火湯一劑，繼用補中益氣湯十劑，卽愈。

文學顧偉男之內，痢疾一月，諸藥無功。余診之曰：『氣血兩虛，但當大補。』痢家藥品，一切停廢，以十全大補連投十劑，兼進補中益氣加薑桂二十餘劑而安。

兵尊張絅庵秋間患痢，凡香連枳朴等劑，用之兩月而病不衰。余診之，滑而有力，失下之故也。用香連歸芍陳皮枳殼加大黃三錢，下穢物頗多。脈尚有力，仍用前方，出積滯如魚腸者數椀。調理十餘日而痊。

無錫毛翁痢如魚腦，腸鳴切痛，聞食則嘔，所服皆苓連木香菖蒲藿香橘紅芍藥而已。後有進四君子湯者，疑而

而不痛耶」仍以前藥再進後勢已大減繼用四君子倍茯苓十餘劑全安

治痢而痢自止，豈可泥潤滯之藥而不急用乎？服此藥，果然下痢盡止，但遺些少氣沫耳。第三日，思食豆腐漿，第四日，略進陳倉米清汁，緩緩調至旬餘，方能消穀。亦見胃氣之存留一綫者，不可少此焦頭爛額之客耳。

陳汝明病痢，發熱如蒸，昏沉不食，重不可言。至第三日，危急將絕，方請余診，其脈數大空虛，尺脈倍加洪盛，謂曰：『此兩病而湊於一時之證也。內有濕熱與時令外熱相合，欲成痢證，尚不自覺，又犯房勞，而爲驟寒所乘，以故發熱身重，不食昏沉，皆屬少陰腎經外感，少陰受邪，原要下利清白，此因腸中濕熱已蒸成豬肝魚腦敗濁之形，故色雖變而下利則同也。再用痢疾門藥一劑，卽刻不救矣。』遂忙以麻黃附子細辛湯一劑與之，表散外邪，得汗後熱卽微減，再以附子理中湯連進二劑，熱退身輕能食，改用黃連理中湯丸服，至旬日全安。

葉茂卿幼男病痢，禁口發熱，十餘日嘔噦連聲不斷，診其關脈，上湧而無根，再診其足脈，亦上湧而無根，謂其父曰：『此非禁口痢之證，乃胃氣將絕之證也。禁口痢者，虛熱在胃，壅遏不宜，故覺其飽而不思食，治宜補虛清熱兩法，此因苦寒之藥所傷，不能容食，治惟有顓顓溫補一法而已。』於是以理中湯連投二劑，不一時，痢下十餘行，遍地俱汚。茂卿恐藥不對證，求更方，余曰：『吾意在先救胃氣之絕，原不治痢，卽治痢，人之大小腸盤疊腹中甚遠，雖神丹不能遽變其糞，今藉藥力催之速下，正爲美事，焉可疑之？』遂與前藥連服二日，人事大轉，思食不噦，痢勢亦減。四日後止便糟粕，以補中益氣調理旬日全安。此可見小兒之痢，縱啖傷胃者多，內有積熱者少，尤不宜輕用痢疾門中通套治法也。

浦君藝病痢疾，初起有表邪未散，而悞用參朮固表，使邪氣深入，又悞服黃連涼解大黃推蕩，治經月餘，胃氣不運，下利一晝夜百餘行。一夕，嘔出從前黃連藥汁三五椀，嘔至二三次後，胃與腸遂打爲一家，內中幽門闌門洞開無阻，不但粥飲直出，卽人叅濃膏纔吞入喉，已汩汩從腸奔下。危急之中，諸昆玉及內戚俱探余曰：『此證可無恐乎？

醫部彙考二百六十四

大小便門一

黃帝素問

㈠陰陽應象大論

清陽出上竅，濁陰出下竅，陰味出下竅，陽氣出上竅。

註人之清陽本乎天而出上竅，人之濁陰本乎地而出下竅。味有質，故下流於便瀉之竅，氣無形，故上出於呼吸之門。

㈡玉機眞臟論

冬脈不及，則令人心懸如病饑，胗中淸，脊中痛，少腹滿，小便變。

註腎爲生氣之原，不及則心腎水火之氣不能交濟，故令人心懸如病饑。腎之生陽不足，故胗中冷。腎虛而不能施化，故小便變而少腹滿也。

㈢標本病傳論

脾病，身痛體重一日而脹，二日少腹腰脊痛，脛痠，三日背䏶筋痛，小便閉，十日不已，死。冬人定，夏晏食。

㈤厥論

太陰之厥，則腹滿䐜脹，後不利。

註足太陰之脈入腹屬脾，故厥則腹滿䐜脹。食飲入胃，脾為轉輸，逆氣在脾，故後便不利。

少陰之厥，則口乾溺赤。

註足少陰經脈厥逆，則肺金不能通調於下，故溺赤。

厥陰之厥，則少腹腫痛，腹脹涇溲不利。

註足厥陰之脈內抵少腹，挾胃屬肝絡膽，故厥則少腹腫痛而腹脹，其下循陰股，入毛中，環陰器，抵少腹，是以涇溲不利。

厥陰厥逆，攣腰痛，虛滿前閉。

註腰者，肝之表也。虛滿者，食氣不能散精於肝也。前閉者，肝主疏泄也。

三陰俱逆，不得前後，使人手足寒，三日死。

註三陰俱逆，自陰與陽別矣。不得前後者，陰關於下也，諸陽之氣，皆生於陰，三陰俱逆，則生氣絕滅，是以手足寒而三日死。

㈥靈蘭祕典論

三焦者，決瀆之官，水道出焉。

註三焦下俞出於委陽，並太陽之正，入絡膀胱，約下焦，實則閉癃，虛則遺溺，三焦主氣，氣化則水行，故為決瀆之官也。

註病先發於脾，則身痛體重，一日而之胃則脹，二日而之腎，則少腹腰脊痛脛痠，三日而之膀胱，則背䏿筋痛，小便閉，十日不已死。冬之人定在亥，謂土敗而水勝也。夏之晏食在寅，木旺而土絕也。

腎病，少腹腰脊痛，胻痠，三日背䏿筋痛，小便閉，三日腹脹，三日兩脅支痛，三日不已死。冬大晨，夏晏晡。

註病先發於腎，則少腹腰脊痛，三日而之膂膀胱，則背䏿筋痛小便閉，三日而之胃則腹脹，三日而之肝則兩脅支痛。冬之大明在辰，土旺而水滅也。夏之晏晡在亥，水絕而不能生也。

胃病，脹滿，五日少腹腰脊痛，胻痠，三日背䏿筋痛，小便閉，五日身體重，六日不已死。冬夜半後，夏日昳。

註病先發於胃，故脹滿。五日而之腎，則少腹腰脊痛脛痠，三日而之䏿膀胱則背䏿筋痛小便閉五日而之脾，則身體重，再六日不已而死。冬夜半後者，土敗而水勝也。夏日昳者，乃陽明所主之時，土絕而不能生也。

膀胱病，小便閉，五日少腹脹，腰脊痛，胻痠，一日腹脹，一日身體痛，二日不已，死。冬雞鳴，夏下晡。

註病先發於膀胱，則小便閉，五日而之腎，則少腹脹腰脊痛一日而之胃，則腹脹一日而之脾，則身體痛，冬鷄鳴在丑，乃太陽少陽生氣之時氣絕而不能生。夏下晡乃陽明生氣之時，陽明之氣亦絕。

(四)奇病論

帝曰：『有癃者一日數十溲，此不足也。身熱如炭，頸膺如格，人迎躁盛，喘息氣逆，此有餘也。太陰脈微細如髮者，此不足也。其病安在？名爲何病？』岐伯曰：『病在太陰，其盛在胃，頗在肺，病名曰厥，死不治，此所謂得五有餘二不足也。』帝曰：『何謂五有餘二不足？』岐伯曰：『所謂五有餘者五病氣之有餘也。二不足者，亦病氣之不足也。今外得五有餘，內得二不足，此其身不表不裏，亦正死明矣。』

註陽明乃燥熱之經，從中見太陰之濕化，太陰不足，則胃氣熱而人迎躁盛，胃氣上逆，頗關在肺，而爲喘息氣逆，

㊁調經論

形有餘則腹脹,涇溲不利。

註 涇大便溲小便也。

㊂至眞要大論

太陰司天,濕淫所勝,大便難。

註 腎開竅於二陰,故大便難。

少陰司天,熱淫所勝,民病溺色變。

註 溺色變肺經之病,蓋火淫而金氣受傷也。

厥陰之勝,小便黃赤。

註 小便黃赤木淫而生火也。

少陽之復,渴飲水漿,色變黃赤。

註 渴飲水漿陽明胃金燥也。太陰濕土,主四之氣,色變黃赤者,火土相合也。

少陽在泉,客勝,甚則下白溺白。

註 甚則下白溺白者,病及於陽明太陰之主氣也。蓋金主氣,氣化則溺出。溺白者,氣不化而溺不淸也。下白者土,氣傷而大便色白也。

歲太陰在泉,少腹痛腫,不得小便。

註 少腹腫不得小便,乃膀胱經病,蓋土氣淫勝,而水臟水腑皆爲病也。

膀胱者，州都之官，津液藏焉，氣化則能出矣。

註 膀胱爲水腑，乃水液都會之處，故爲州都之官。水穀入胃，濟泌別汁，循下焦而滲入膀胱，故爲津液之所藏，氣化則水液運行而下出矣

㈦五臟別論

魄門亦爲五臟，使水穀不得久藏。

註 魄門，肛門也。上合於肺，故名魄門，五臟之濁，從此而出，故亦爲五臟之下竅。腸胃之腐穢，從此而瀉出，故曰，水穀不得久藏。

㈧氣厥論

黃帝問曰：『五臟六腑，寒熱相移者何？』岐伯曰：『胞移熱於膀胱，則癃溺血。』

註 膀胱者，胞之室也。衝任起於胞中，爲經血之海，胞移熱於膀胱，是經血之邪移於膀胱，故溺血。熱則水道燥涸。故癃閉也。

㈨五常政大論

涸流之紀，其病癃閟邪傷腎也。

註 癃閟，邪傷腎而腎氣不化也。

㈩宣明五氣論

五氣所病，膀胱不利爲癃，不約爲遺溺。

註 靈樞經曰：『三焦下腧出於委陽，並太陽之正，入絡膀胱，約下焦，實則閟癃，虛則遺溺，』遺溺則補之，閟癃則

脾脈滑甚爲癀癃。

註 脾爲陰濕之土，濕熱則爲疝癀，爲小便閉癃。

腎脈微急爲不得前後，滑盛爲癃癀。

註 腎爲生氣之原，開竅於二陰，氣虛不化，故不得前後。有熱則爲小便閉癃，爲睪丸腫癀。

㈡營衞生會篇

黃帝曰：『願聞下焦之所出？』岐伯答曰：『下焦者，別迴腸注於膀胱而滲入焉。故水穀者常幷居於胃中，成糟粕而俱下於大腸而成下焦，滲而俱下，濟泌別汁，循下焦而滲入膀胱焉。』

註 下焦之部，署在胃之下口，別走於迴腸，注於膀胱而滲入焉。故水穀者，常幷居於胃中，成糟粕而俱下於大腸，就下焦之氣濟泌別汁，循下焦之經而滲入膀胱，氣化則出矣。

㈢經脈篇

肺手太陰之脈，是主肺所生病者，氣盛有餘則肩背痛，風寒，汗出中風，小便數而欠。氣虛則肩背痛，寒少氣，不足以息，溺色變。

註 氣之盛虛者，謂太陰之氣也。溺色變者，氣虛而不化也。

胃足陽明之脈，有餘於胃則消穀善饑，溺色黃。

註 氣盛於內也。

肝足厥陰之脈，是主肝所生病者，胷滿嘔逆，飧泄狐疝，遺溺閉癃。

註 肝氣虛則飧泄遺溺，實則閉癃。

歲少陽在泉，火淫所勝，民病注瀉赤白，少腹痛，溺赤，甚則血便。少陰同候。
註 熱傷血分則注赤，熱傷氣分則注白。熱在下焦，故少腹痛而溺赤，甚則血出於小便也。少陰之火出自水，少陽之火生於地，故與少陰同候。
厥陰之勝，化而爲熱，小便黃赤。
註 木淫而生火也。
少陽之勝，耳聾溺赤。
註 熱淫於下，則爲溺赤。
少陰在泉客勝，則溲便變。
註 溲便變者，水火相交，火淫於下也。
太陰在泉客勝，則便溲不時。
註 此在泉之濕氣，客於太陰之經，下及於內也。
諸病水液澄澈淸冷，皆屬於寒，諸轉反戾，水液渾濁，皆屬於熱。
註 反戾，了戾也。

㈣刺熱篇

肝熱病者，小便先黃。
註 肝主疏泄，故小便黃赤。

㈢小便不利

濕痹篇曰：太陽病，關節疼痛而煩，脈沉而細者，此名濕痹。濕痹之候，小便不利，大便反快，但當利其小便。

血痹篇曰：男子脈虛沉弦，無寒熱，短氣裏急，小便不利，面色白，時目瞑，兼衄，少腹滿，此為勞使之然。

虛勞腰痛，少腹拘急，小便不利，八味腎氣丸主之。

消渴篇曰：小便不利者，有水氣，其人若渴，苦蔞瞿麥丸主之。

小便不利，蒲灰散主之。滑石白魚散、茯苓戎鹽湯並主之。

脈浮發熱，渴欲飲水，小便不利者，猪苓湯主之。

水氣篇曰：裏水者，一身面目黃腫，其脈沉，小便不利，故令病水。假如小便自利，此亡津液，故令渴也。越婢加朮湯主之。

趺陽脈當伏，今反數，本自有熱，消穀，小便數，今反不利，此欲作水。

寸口脈浮而遲，浮脈則熱，遲脈則潛，熱潛相搏，名曰沉，趺陽脈浮而數，浮脈即熱，數脈即止。熱止相搏，名曰伏。沉伏相搏名曰水。沉則絡脈虛，伏則小便難，虛難相搏，水走皮膚，即為水矣。

少陰脈緊而沉，緊則為痛，沉則為水，小便即難。脈得諸沉，當責有水，身體腫重，水病脈出者死。

夫水病人，目下有臥蠶，面目鮮澤，脈伏，其人消渴，病水腹大，小便不利，其脈沉絕者，有水，可下之。

問曰：『病下利後，渴飲水，小便不利，腹滿因腫者，何也？』答曰：『此法當病水，若小便自利及汗出者，當自愈。』

肺水者，其身腫，小便難，時時鴨溏。

脾水者，其腹大，四肢苦重，津液不生，但苦少氣，小便難。

㊃五癃津液別篇

天寒則腠理閉，氣濕不行，水下流於膀胱，則爲溺與氣。

註　天寒則腠理閉三焦之氣因濕而不行津水下流於膀胱，則爲溺與氣。氣化而出者爲溺，藏於膀胱者，化生太陽之氣也。

㊄五味篇

酸走筋，多食之令人癃。酸入於胃，其氣澀，以收上之兩焦，弗能出入也。不出則留於胃中，胃中和温則下注膀胱，膀胱之脆薄，以懦得酸則縮綣約而不通，水道不行，故癃。陰者，積筋之所終也，故酸入而走筋。

註　酸氣收澀，故弗能出於上之兩焦，不出則留於胃而溜於下焦，注於膀胱矣。膀胱爲脬之室，脬居於中，故膀胱之體質脆薄，以懦得酸則易於縮綣，縮則約而不通，水道不行，故爲癃閉。陰者前陰，積筋者宗筋也，宗筋者筋之主也。酸入於宗筋，故走筋也。

㊅九鍼篇

膀胱不約，爲遺溺，下焦溢爲水。

註　膀胱不約而爲遺溺，下焦如瀆，水道出焉，病則反溢而爲水病矣。

漢張機金匱要略

㊀大便難

腹滿篇曰：痛而閉者，厚朴三物湯主之。

實脈歌曰：[illegible]

洪脈歌曰：洪向尺中還若是，小便赤澀脚酸疼。

沉脈歌曰：沉在尺中腰脚重，小便稠數色如泔。

察色觀病生死候歌曰：體重溺出時不止肉絕六日便高搽。

唐孫思邈千金方

㊀閉塞

人有因時疾，瘥後得閉塞不通，遂致夭命，大不可輕之。所以備述，雖非死病，若不明藥餌者，拱手待斃，深可痛哉！單服諸方以虞倉卒耳。凡大便不通，皆用滑膩之物及冷水並通也。凡面黃者，卽知大便難。

宋朱肱活人書

㊀大便

問：『手足逆冷而大便祕，小便赤，或大便黑色，脈沉而滑。』曰：『此名陽證，似陰也。重陽必陰，重陰必陽，寒暑之變也。假令手足逆冷而大便祕，小便赤，或大便黑色，其脈沉而滑者，皆陽證也。輕者白虎湯，甚者承氣湯。傷寒失下，血氣不通，令四肢逆冷，此是伏熱深，故厥亦深，速用大承氣加分劑下之，汗出立差。』

熱厥與陰厥自不同。熱厥者，微厥卽發熱，若陰厥卽不發熱，四肢逆冷，惡寒，脈沉而細，大小便滑泄。

問：『有數日不大便，有大便難，有大便鞕，有燥屎，有大便溏。』曰：『傷寒數日不大便，大便鞕及有燥屎，皆知有熱，用大柴胡大承氣小承氣攻之。然仲景論大便不通，亦有數種不可攻者。』

腎水者，其腹大臍腫腰痛，不得溺，陰下濕如牛鼻上汗，其足逆冷，面反瘦。

師曰『寸口脈沉而遲，沉則爲水，遲則爲寒，寒水相搏。趺陽脈伏，水穀不化，脾氣衰則鶩溏，胃氣衰則身腫，少陽脈卑，少陰脈細，男子則小便不利，婦人則經水不通，經爲血，血不利則爲水，名曰血分。』

問曰：『病者苦水，面目身體四肢皆腫，小便不利，脈之，不言水，反言胷中痛，氣上衝，咽狀如炙肉，當微欬喘，審如師言，其脈何類？』師曰：『寸口脈沉而緊，沉爲水，緊爲寒，沉緊相搏，結在關元，始時當微，年盛不覺，陽衰之後，榮衞相干，陽損陰盛，結寒微動，腎氣上衝，喉咽塞噎，脅下急痛，醫以爲留飲而大下之，氣擊不去，其病不除，後重吐之，胃家虛煩，咽燥欲飲水，小便不利，水穀不化，面目手足浮腫，又與葶藶丸下水。當時如小差，食飲過度，腫復如前，胷脅苦痛，象若奔豘，其水揚溢，則浮欬喘逆，當先攻擊衞氣，令止，乃治欬，欬止其喘自差，先治新病，病當在後。』

黃疸篇曰：趺陽脈緊而數，數則爲熱，熱則消穀，緊則爲寒，食卽爲滿，尺脈浮爲傷腎，趺陽脈緊爲傷脾，風寒相搏，食穀卽眩，穀氣不消，胃中苦濁，濁氣下流，小便不通，陰被其寒，熱流膀胱，身體盡黃，名曰穀疸。

陽明病脈遲者，食難用飽，飽則發煩，頭眩，小便必難，此欲作穀疸，雖下之，腹滿如故，所以然者，脈遲之故也

夫病酒黃疸，必小便不利，其候心中熱，足下熱，是其證也

脈沉渴欲飲水，小便不利者，皆發黃。

黃疸腹滿，小便不利而赤，自汗出，此爲表和裏實，當下之，宜大黃硝石湯。

晉王叔和脈訣

㈠大小便病脈

難，仲景云：趺陽脈浮而濇，浮則胃氣強，濇則小便數，浮濇相搏，大便則鞕，其脾爲約，麻子仁丸主之。太陽病若汗若吐若下後，微煩，小便數，大便因鞕者，小承氣湯和之愈。』

又云：傷寒脈浮，自汗，小便數，若胃中不和，譫語者，少與調胃承氣湯。

問：『一身盡痛發熱，身黃，小便不利，大便反快者。』曰：『此名中濕也。風雨襲虛，山澤蒸氣，人多中濕，濕流關節，須身體煩痛，其脈沉緩，爲中濕。主一身盡痛發熱，身黃，小便自利者，朮附湯。若小便不利，大便反快，當利其小便，宜甘草附子湯、五苓散主之。』

㈢遺尿

問：『腹滿身重，難以轉側，口中不仁，面垢，譫語遺尿。』曰：『此三陽合病也，白虎湯主之。不可發汗，汗之則譫語；下之則額上生汗，手足逆冷，若自汗者，白虎加人參。』

金劉完素六書

㈠大小便祕濇

閟俗作祕，大便濇滯也，熱耗其液，則糞堅結，而大腸燥濇緊斂故也。謂之風熱結者，謂火甚制金，不能平木，則肝木自旺故也。故大便溏而閟者，燥熱在於腸胃之外，而濕熱在內故也。義同泄痢後重之義。

大腸小腸移熱，名虛瘕，津液耗散，不能滑利，菀結而大腸閟濇，檳榔圓主之。

小腹痛，不得大小便，邪氣入客，約而不行，故穀氣不得通也，枳殼丸主之。

小腹膀胱按之內痛，若沃以湯，濇於小便，上爲清涕，太陽直行，從巔入循於腦，氣下灌於鼻，時出清涕不止，胥著湯

仲景又有陽結陰結之論，不可不別也。其脈浮而數，能食不大便，此爲實，名曰陽結，宜用小柴胡湯，所謂和其榮衞以通津液，縱不了了，得屎而解也。其脈沉而遲，不能食，身體重，大便反鞕，名曰陰結，宜用金液丹，所謂陽盛則促，陰盛則結，促結同也。

又問大便溏者何也？古人云：歲火不及，寒乃大行，民病鶩溏。大率病人腸中有寒，即大便鴨溏，蓋溏者，胃中冷，水穀不別故也。華佗云：寒即溏，熱即垢。仲景說初鞕後溏有二證，小便不利，小便少，皆水穀不分耳。

㈡小便

問：『小便不利，小便難。』曰：『傷寒發汗後，小便多亡津液，胃中極乾，故小便不利。醫見小便不利，往往利之，誤矣。類纂云：胃中乾則無小便，慎不可利，故仲景云下之。後復發汗，小便不利者，亡津液耳。若傷寒引飮，下焦有熱，小便不通，脈浮者，五苓散，脈沉者，猪苓湯也。表不解，心下有水，發熱而欬，小腹滿，小便不利者，小青龍湯去麻黃加茯苓也。傷寒無汗，翕翕發熱，頭項強痛，小便不利者，桂枝湯去桂加茯苓白朮也。嘔而發熱，胷脅滿，心下怔忪，小便不利者，小柴胡湯去黃芩加茯苓。少陰病小便不利者，四逆湯加茯苓也。大抵中濕與發黃，以利小便爲先。陽明汗多，以利小便爲戒。』

又問：『小便難何也？』曰：『陰虛故也。陰虛者，陽必湊之，爲陽所湊也。故小便黃者，中有熱也，宜瞿麥滑石之類瀉之。太陽病發汗，遂漏不止，其人惡風，小便難，四肢微急，難以屈伸者，桂枝加附子湯主之。陽明中風，脈弦浮大，短氣腹滿，脅下及心痛，鼻乾，不得汗，嗜臥，身黃，小便難，潮熱而噦者，小柴胡加茯苓主之。』

問：『小便自利，小便數。』曰：『太陽證下焦有熱，小腹必滿，應小便不利，而小便反利者，下血證也，抵當湯主之。陽明證自汗出，應小便少，而小便自利者，津液內竭也，屎雖硬不可攻也，當用蜜煎導之。少陰證四逆而小便自利者，

㈠小便原委論

或問余曰：『靈樞經云「水穀者，常并居胃中，成糟粕而俱下於大腸而成下焦，滲而俱下，濟泌別汁，循下焦而滲入膀胱焉。」』王冰曰：『水液自回腸泌別汁滲入膀胱之中，胞氣化之而爲溺以泄出也。』楊介云：『水穀自小腸盛受於闌門以分別也。其水則滲灌入於膀胱上口而爲溲便。』詳已上三說，則小便卽泌別之水液滲入膀胱以出者也。素問則曰：『飲入於胃，遊溢精氣，上輸於脾，脾氣散精，上歸於肺，通調水道，下輸膀胱。』則小便又似水飲精微之氣，上升脾肺，運化而後成者也。彼此不同，將何所憑乎？』余曰：『憑夫理耳。且夫溲溺者，果何物耶？水而已矣。水之下流，其性則然也。故飲入於胃，其精氣雖上升，其飲之本固不能上升體也。旣不能上升，則豈可謂小便獨爲氣化所成者哉？惟其不能上升，必有待於能上升者爲之先導，故又曰：『膀胱者，津液藏焉，氣化則能出矣。』且水者氣之子，氣者水之母，氣行則水行，氣滯則水滯。或者又謂小便純由泌別，不由運化，蓋不明此理也。雖然，膀胱固曰津液之腑，至於受盛津液，則又有胞而居膀胱之中焉。故又曰：『胞移熱於膀胱。』靈樞曰：『膀胱之胞薄以懦。』類纂曰：『膀胱者，胞之室。』且夫胞之居於膀胱也，有上口而無下口。津液旣盛於胞，無由自出，必因乎氣化，而後能漸浸潤於胞外，積於胞下之空處，遂爲溺以出於前陰。素問所謂膀胱津液藏焉者，蓋舉膀胱以該胞也。若曰胞下無空處，則人溺急時至廁，安能卽出乎？夫惟積滿胞下空處而不可再容，故急急則至廁卽出矣。或言胞有下口而無上口，或言胞上下皆有口，或言胞有小竅而爲注泄之路，不亦妄歟！』

朱震亨心法

㈠燥結

主之。

食已如饑。胃熱能消穀，陽明脈絡，心火上行，心懵煩面黃，小便赤澀也。

元李杲十書

㈠結燥論

金匱眞言論云『北方黑色，入通於腎，開竅於二陰，藏精於腎。』又云：『腎主大便。大便難者，取足少陰。』夫腎主五液，津液潤則大便如常，若饑飽失節，勞役過度，損傷胃氣及食辛熱味厚之物，而助火邪伏於血中，耗散眞陰津液虧少，故大便結燥。然結燥之病不一，有熱燥有風燥有陽結有陰結，又有年老氣虛津液不足而結燥者。治法云：腎惡燥急食辛以潤之，結者散之。如少陰不得大便，以辛潤之；太陰不得大便，以苦泄之；陽結者散之，陰結者溫之。仲景云『小便利而大便鞕，不可攻下，以脾約丸潤之。食傷太陰，腹滿而食不化，腹響然不能大便者，以苦藥泄之，如血燥而不能大便者，以桃仁酒製大黃通之，風結燥而大便不行者以麻子仁加大黃利之；如氣澀而大便不通者，以郁李仁枳實皂角仁潤之。大抵治病必究其源，不可一槩用巴豆牽牛之類下之，損其津液，燥結愈甚，復下復結，極則以至導引於下而不通，遂成不救。噫！可不愼哉！』

㈡關則不得小便

陽極自天而降，是行陰道，乃西方之氣，膏粱之物，下泄是也。極則陰道不行，反閉於下，故不得小便，是天之氣不得下通也。逆而上行，反行陽道，故血脈凝滯而不通，則人迎之脈大四倍於氣口，此濁氣反行淸道也，故曰關。

㈢酒毒小便赤澀宜五苓散

內虛濕熱者，六味丸或八味丸加杜仲骨脂五味，老人宜八味丸減澤瀉爲妙。

因看盧家醫鏡，見此一藥味數分兩同，惟丹砂用伏火者，及治病有差，所治者小便數而不禁，怔仲多忘，魘夢不已，不同耳。見其不同，審而詳之，乃得此治法不差。且泛論之：經言腎主大便，肝主小便，淋溲難。經云：『小腸爲赤腸，是面赤色，及便溺色赤，皆出心與小腸，南方赤色顯於外也。』經言下焦如瀆者，正謂大小便也。大便爲陰，爲有形氣化乃下焦之下者也。謂腎主大便，不言大腸者，明子行父道，爲腎臟病。小便爲陽，爲無形氣化乃下焦之高者也。謂肝主小便。淋溲，亦是子行父道爲腑病。凡諸無形氣化者，皆腑病所主，諸有形氣化者，皆臟病所主，此二證俱在下焦則同。但有形無形，及在腑在臟有殊，俱是丹田衰敗。不言心火者，以其相火代行君之政令故也。細分之，則膀胱壬水勝丙火，小腸者不傳入陰，故爲泄血泄血利不禁，爲有形質病，且不傳陰則陰不病。何爲有形病此爲陰之體也，爲腑之用也。天地陰陽，互爲體用，以斯可見。是明五臟爲六腑所用，六腑爲五臟所用明矣。是有形皆爲傳陰，大小便不禁，是膀胱不禁爲遺溺，此不傳陰，是丹田胞絡受寒，爲壬所剋。大抵諸腑皆乘有形，有形病者皆在腑，責其所乘皆在臟也。用伏火丹砂者，去其寒性耳。治法同者，以其俱在下焦，補諸無形，同在胞絡耳。以其胞與腎相對，有渠相通故也。腎主大便，肝主小便，所治安得不殊。經曰：『腎肝同歸一治。』又曰：『少陽主骨，所生病，溲便難，』膀胱主筋，所生病，亦可知也。小便不禁，茯苓湯下。大便不禁，米飲下。

⑤小便不通

小便不通，有氣虛血虛有痰風閉實熱。氣虛用參芪升麻等先服後吐，或參芪藥中探吐之。血虛四物湯先服後吐，或芎歸湯中探吐亦可。痰多二陳湯先服後吐。已上皆用探吐。若痰氣閉塞，二陳湯加木通香附探吐之，以提其氣，氣升則水自降，蓋氣承載其水也。有實熱者當利之，砂糖湯調牽牛末二三分，或山梔之類。有熱有濕有氣結於下，

燥結血少，不能潤澤，理宜養陰。

凡人五味之秀者養臟腑，諸陽之濁者歸大腸，大腸所以司出而不納也。今停蓄蘊結，獨不疎導，何哉？抑有由矣。邪入裏則胃有燥糞，三焦伏熱則津液中乾，此大腸挾熱然也。虛人臟冷而血脈枯，老人臟寒而氣道澀，此大腸之挾冷然也。亦有腸胃受風，涸燥秘澀，此證以風氣畜而得之。若夫氣不下降而穀道難，噫逆泛滿，必有其證矣。

㈡脾約丸論

成無己曰：約者結約之約，又約束之約，胃強脾弱，約束津液不得四布，但輸膀胱，故小便數而大便鞕，故曰脾約。與此丸以下脾之結燥，潤腸結，化津液入胃，則大便利，小便少而愈矣。愚竊有疑者，既曰脾約，脾弱不能運也。脾弱則土虧矣。必脾氣之散，脾血之耗，原其所由，久病大下大汗之後，陰血枯槁，內火燔灼，熱傷元氣，又傷於脾而成此證。傷元氣者，肺金受火，氣無所攝，傷脾者，肺爲脾之子，肺耗則津竭，必竊母氣以自救，金耗則木寡於畏，土欲不傷不可得也。脾失轉輸之令，肺失傳導之官，宜大便秘而難下，小便數而無藏畜也。理宜滋養陰血，使孤陽之火不熾，而金行清化，木邪有制，脾土清健而運行，津液入胃則腸潤而通矣。今以大黃爲君，枳實厚朴爲臣，雖有芍藥之養血，麻仁杏仁之溫潤爲之佐使，用之熱甚而氣實者，無有不安。愚恐西北二方地氣高厚，人稟壯實者可用，若用之東南之人，內熱自甚，而血氣不實者，雖得暫通，將見脾愈弱而愈燥矣。後之用此方者，須知在西北以開結爲主，在東南以潤燥爲主，愼勿膠柱而鼓瑟可也。

㈢論通大便禁忌

予觀古方通大便皆用降氣品劑，蓋肺氣不降，則大便難傳送，用杏仁枳殼沉香訶子等是也。又老人虛人風人，津液少而秘者，宜以藥而滑之，用胡麻麻仁阿膠等是也。如妄以峻利藥逐之，則津液走，氣血耗，雖暫通而卽秘矣，必

甚者通之，專取於此，然有虛勞汗多而小便赤澀者，去是五內枯燥，液既去，不能生津，故澀而赤，不宜過用通小便之劑，竭其腎水，惟當溫養潤肺，十全大補湯養榮湯之類選用。汗者心液，心主血，養血則心得所養，汗止津生，不待通溺而自清矣。諸失精血及患癰毒人，忽有小便赤澀之證，此亦是枯竭不潤之故。

戴思恭證治要訣

(一)大便祕

有風祕冷祕氣祕熱祕，又有老人津液乾燥，是名虛證；婦人分產亡血，及發汗利小便病後，血氣未復，皆能作祕，俱宜麻仁丸。風祕之病，由風搏肺臟，傳於大腸，故傳化難。或其人素有風病者，亦多有祕，宜小續命湯，去附子，倍芍藥，入竹瀝兩蜆殼許。實者吞脾約麻仁丸，虛者吞養正丹。冷祕由冷氣橫於腸胃，凝陰固結，津液不通，胃道祕塞，其人腸內氣攻，喜熱惡寒，宜藿香正氣散，加枳殼官桂各半錢，吞半硫丸。熱藥多祕，惟硫黃煖而通，冷藥多泄，惟黃連肥腸而止泄。氣祕由氣不升降，穀氣不行，其人多噫，宜蘇子降氣湯，加枳殼，吞養正丹，或半硫丸來復丹，未效，佐以木香檳榔丸。欲其速通，則枳殼生用。熱祕面赤身熱，腸胃脹悶，時欲得冷，或口舌生瘡，此由大腸熱結，宜四順清涼飲，吞順腸丸，或木香檳榔丸。有氣作疼，大腸祕結，用通劑而便愈不通，又有祕氣強飲通之，雖通復閉，或迫之使通，因時下血者，此惟當順氣，氣順便自通，順氣之法，又當求溫煖之劑，曾有下巴豆等藥，不通，進丹附却通，不可不知。老人虛祕，反出汗利，小便過多，一切病後血氣未復而祕者，宜蘇子降氣湯，倍加歸，吞威靈仙丸，或肉黃飲蓯蓉順

宜清宜燥宜升。

腎主水，膀胱爲之腑，水潴於膀胱，而泄於小腸，實相通也。然小腸獨應於心者，何哉？蓋陰不可以無陽，水不可以無火，水火既濟，上下相交，此榮衛所以流行。而水竇開闔，所以不失其司耳。惟夫心腎不交，陰陽不調，故內外關格而水道澀，傳送失度而水道滑，熱則不通，冷則不禁。其熱盛者小便閉而絕無，其熱微者，小便難而僅有。腎與膀胱俱虛，客熱乘之，故不能制水。水挾熱而行澀，是以數起而溺有餘瀝。腎與膀胱俱冷，內氣不充，故胞中自滑，所出多而色白。是以遇夜陰盛愈多矣。小便澀滑，又當調適其氣。

明虞摶醫學正傳

㈠祕結論

內經曰：『北方黑色，入通於腎，開竅於二陰，藏精於腎。』夫腎主五液，故腎實則津液足而大便滋潤，腎虛則津液竭而大便燥結。原其所由，皆房勞過度，飲食失節，或恣飲酒漿，過食辛熱，飲食之火起於脾胃，淫慾之火起於命門，以致火盛水虧，津液不生，故傳道失常，漸成結燥之證。是故有風燥，有熱燥，有陽結，有陰結，有氣滯結，又有年高血少，津液枯涸，或因有所脫血，津液暴竭，種種不同，固難一例而推焉。經云：『腎惡燥，急食辛以潤之，以苦泄之。陽結者散之，陰結者溫之。』大法治燥者，潤之以大黃、當歸、桃仁、麻子仁、郁李仁之類，風燥者，加以防風、羌活、秦艽、皂莢之類，丸以煉蜜，取其潤燥以助傳導之勢，故結散而疎通矣。仍多服補血生津之劑，助其眞陰，固其根本，庶無再結之患。切勿以巴豆、牽牛等峻劑攻下，雖暫得通快，必致再結愈甚，反釀成病根，膠固卒難調治。或有血虛脈大如葱管，發熱而大便結燥者，不可發汗，汗之則重亡津液，閉結而死，此醫殺之耳。活人書有脾約證，謂胃強脾弱，約束

㈠不禁頻數

小便不禁或頻數，古方多以爲寒，而用溫澀之藥，殊不知屬熱者。蓋膀胱火邪妄動，水不得寧，故不能禁而頻數來也。故年老人多頻數者，是膀胱血少，陽火偏旺也。治法當補膀胱陰血，瀉火邪爲主，而佐以收澀之劑，如牡蠣山茱萸五味子之類，不可用溫藥也。病本屬熱，故宜瀉火，因水不足，故火動而致小便多，小便既多，水益虛矣，故宜補血瀉火，治其本也。收之澀之，治其標也。

樓英醫學綱目

㈠閉癃

閉癃，合而言之一病也，分而言之，有暴久之殊。蓋閉者，暴病爲溺閉，點滴不出，俗名小便不通是也。癃者久病爲溺癃，淋瀝點滴而出，一日數十次或百次，名淋病是也。

小便不通，腹下痛，狀如覆椀，痛悶難忍者，乃腸胃乾涸，膻中氣不下，故經所謂：『膀胱者，州都之官，津液藏焉，氣化則能出矣。』故膻中者臣使之官，三焦相火，腎爲氣海也。王註曰：『膀胱津液之腑，胞內居之處，少腹間毛內，若得氣海之氣施化，則溲便注下，氣海之氣不及，則隱祕不通，故不得便利也。』先用木香沉香各三錢，酒調下。或八正散，甚則宜上湧之，令氣通達，便自通利，經所謂『病在下，上取之。』王註曰：『熱攻於上，不利於下，氣盛於上，則辛溫散之，苦以利之。』

小腹痛脹如覆椀爲實，其法有二：氣壅塞於下者，用吐法以提之。血瘀於下者，用桃仁之類以破之。

㈡不利

腸丸尤宜。

宿食留滯結而不通，腹脹氣急，胸中痞滿，宜感應丸加巴豆。

凡諸秘服藥不通，或兼他證不受藥者，用蜜皂角導，冷秘生薑導亦佳。

㈡閉癃

古名曰，癃者罷也，不通爲癃，不約爲遺，小便滴瀝澀痛者，謂之淋，小便急滿不通者，謂之閉，宜五苓散燈心湯調服。

暑月多有此患，止宜本藥閉而不通，臍下脹爲癃閉，以燈心湯調五苓散，或洗慈湯調獨味琥珀末，仍令其以鹽填臍下，更滴之以水。

若服涼藥不效，審是冷秘，宜炒鹽熨其小腹，或洗慈湯熏洗。有腹急而小便不通，愈用通劑愈甚，宜以鹽實臍中，就鹽上灼艾十來壯。

㈢頻數遺尿

小便多者，乃下元虛冷，腎不攝水，以致滲泄，宜菟絲子丸，八味丸，元兔丹，生料鹿茸丸。

有人每日從早至午前定尿四次，一日之間又自無事，此腎虛所致，亦猶脾腎泄，早泄而晚愈。次日，又復然者也。

若小便常急，偏數雖多，而所出常少，放了復急不澀痛，却非淋證。亦有小便畢少頃忽再出些少者，多因自忍尿或忍尿行房事而然，宜生料五苓散減澤瀉之半，加阿膠一錢，吞八味丸。此丸須用五味子者。

睡著遺尿者，此亦下元冷，小便無禁而然，宜大菟絲子丸，猪胞炙碎煎湯下。

有盛喜致小便多，日夜無度，乃喜極傷心，心與小腸爲表裏，宜分清飲四七湯各半貼和煎，仍以辰砂妙香散，吞小菟絲子丸或元兔丹。

通用冷熱熨法，淹臍法，麻油導法

㈡小便不通

經曰：「膀胱不利爲癃，候其鼻頭色黃者，小便必難。腎主水，畜於膀胱，泄於小腸，實相通也。然腎應於心，心火盛則小腸熱結，熱微則小便難而僅有，熱甚則小便閉而絕無，宜清熱生津爲主，單朴硝散五苓散。臍下脹者加琥珀，或單琥珀爲末蜜丸，人參茯苓煎湯下。或搗生車前子自然汁，入蜜一匙調服。有利大便行後而小便不利者，八正散加木香。熱盛莖中澀痛者，導赤散加山梔大黃，或麻子仁丸冷熱熨法。

虛損久病自汗，五內枯燥及諸瘡失血過多，人參養榮湯。有精竭不痛莖痒，八味丸。有胃弱不能通調水道，下輸膀胱及氣虛，四君子湯加黃芪升麻。有脾枯亡血及勞傷血虛，四物湯。氣血俱虛，八物湯。

痰涎阻滯氣道不通者，導痰湯加升麻。

忿怒氣結閉遏不通者，二陳湯加木香香附木通，俱先服一盞，後煎查探吐以提其氣，氣升則水自降矣。實熱，砂糖調牽牛末一二錢探吐。

上熱者，導赤散加黃連燈心。下虛者，滋腎丸。上盛下虛者，清心蓮子飲。

㈢小便不禁

實熱乃膀胱火動，四苓散合三黃湯，加五味子山茱萸少許。血虛，四苓散合四物湯，加山梔升麻。

虛乃腎與膀胱氣虛，十全大補湯加益智仁，或縮泉丸大菟絲子丸二苓丸。遇夜陰盛愈多，內虛自汗者，祕元丹。內虛濕熱者，腎氣丸八味丸，減澤瀉附子，加五味子杜仲故紙，倍山茱萸。虛寒冷者，古桂湯大菟絲子丸加肉桂。

勞心不禁者，妙香散桑螵蛸散。勞役傷脾者，補中益氣湯。

經云：『腎合膀胱，膀胱者，津液之腑也。小腸屬腎，腎上連肺，故將兩臟。三焦者，中瀆之腑也，水液出焉。是屬膀胱，乃腎之腑也。』又云：『膀胱者，州都之官，津液藏焉，氣化則能出矣。』由是言之，膀胱藏水，三焦出水，治小便不利，故刺灸法但取三焦穴，不取膀胱也。小腸屬腎肺，故東垣用清肺飲子滋腎丸利小便是也。

李梴醫學入門

㈠大便燥結

燥有風燥，熱燥，火燥，氣血虛燥，詳燥門。結有能食脈實數者爲陽結，不能食脈弦微者爲陰結，亦有年高氣血虛結者。

燥屬少陰津液不足，辛以潤之。結屬太陰有燥糞，苦以瀉之。凡結後仍服潤血生津之劑，免其再結再通，愈傷元氣。

濕熱怫鬱，心腹脹滿，有蟲積者，檳榔丸。凡燥結有時者爲實，無時者爲虛，有藥石毒者，大小便閉，氣脹如鼓者，三和散台三黃湯。飲食毒者香連丸，胃火者白虎湯。

津少因發汗，利小便過多，及產後失血等證，血液枯者，五仁丸，腎氣丸，大補陰丸，或導滯通幽湯加檳榔條芩陳皮。

氣虛者參仁丸，補中益氣湯。挾七情者古蓯沉丸。

臟寒則氣滯，臟冷則血枯。有痃癖冷氣結滯者，古半硫丸，古薑附湯，五積散，冰冷與之。其病雖宜服陽藥，若大便不通者，當暫與潤劑以微通之，不令閉結。

七情氣閉後重窘迫者，三和散，六磨湯。脈浮晝便難者，陳皮杏仁等分蜜丸服。脈沉夜便難者，換桃仁。

痰滯不通者，二陳湯加枳殼檳榔。

類如脾濕不運，而精不上升，故肺不能生水，法當燥脾健胃，蒼朮白朮茯苓半夏之類。如腎水燥熱，膀胱不利，法當滋腎滌熱，黃蘗知母茯苓澤瀉通草之類。夫滋腎瀉膀胱，名為正治；清金潤燥，名為隔二之治；健胃燥脾，名為隔三之治。又或有水液只滲大腸，小腸因而燥竭，宜以淡滲之品茯苓猪苓通草澤瀉之類分利而已。或有氣滯不能通調水道，下輸膀胱者，順氣為急，枳殼木通橘紅之類。有實熱者，非與純陰之劑，則陽無以化，上焦熱者，梔子黃芩；中焦熱者，黃連芍藥；下焦熱者，黃蘗知母。有大虛者，非與溫補之劑，則水不能行，如金匱腎氣丸及補中益氣湯是也。丹溪嘗曰：『吾以吐法通小便，嘗如滴水之器，上竅閉則下竅無以自通，必上竅開而下竅之水出焉。氣虛者，補中益氣湯，先服後吐；血虛者，芎歸湯，先服後吐；痰多者，二陳湯，先服後吐；氣閉者，香附木通探吐。更有瘀血而小便閉者，牛膝桃仁為要藥。』別錄云：『小便不利，審是氣虛，獨參湯如神。』由是觀之，則受病之源，自非一途，若不從望聞問切察之明審之當，而浪投藥劑，幾何不以人命為戲耶！

㈢小便不禁

世俗之治小便不禁者，但知補澀而已，不知內經論肝腎膀胱之病，不指為何邪所干，則知七情六氣，皆能為病也。又言手太陰虛者，為子母相關之病，則知所生所不勝之五邪，皆足以為病也。總其大要而言，肺者主氣，以下降生水，則下輸膀胱者，津液藏焉，氣化則能出。水泉不止者，膀胱不藏也。此兩經者，實為總司，肺虛者為上虛，當補氣，補中益氣湯，不愈，當以黃蘗生地麥門冬清其熱。膀胱虛者為下虛，當澀脫，桑螵蛸雞肶胵之類；挾寒者，家韭子丸，固脬丸，白茯苓散，菟絲子散之類。滑脫者，牡蠣丸。挾熱者，白薇散，或雞腸散。更有睡則遺尿，皆責之虛，所以嬰兒脬氣未固，老人下元不足，多有此證。在嬰兒挾熱者十居七八，在老人挾寒者十居七八，此又不可不辨也。宜大菟絲子丸，猪脬炙研碎，煎湯送下；更須審寒熱而為之活法。

下虛內損，則膀胱不約，便溺自遺，或尿後餘瀝，皆火盛水不得甯，治宜補膀胱陰血，瀉火邪爲主，而佐以山茱萸牡蠣五味子之類，不可溫藥，古方補陰丸最妙。婦人產後傷胞，小兒胞冷，雞胜胵散主之。

李中梓醫宗必讀

㊀大便不通

玩內經之言，則知大便祕結，專責之少陰一經，證狀雖殊，總之津液枯乾，一言以蔽之也。分而言之，則有胃實胃虛熱祕冷祕風祕氣祕之分。胃實而祕者，善飲食，小便赤，麻仁丸十宣丸之類。胃虛而祕者，不能飲食，小便清利，厚朴湯；熱祕者，面赤身熱，六脈數實，腸胃脹悶，時欲得冷，或口舌生瘡，四順清涼飲潤腸丸木香檳榔丸；實者，承氣湯；冷祕者，面白或黑，六脈沉遲，小便清白，喜熱惡冷，藿香正氣散，加官桂枳殼，吞半硫丸。氣祕者，氣不升降，穀氣不行，其人多噫，蘇子降氣湯加枳殼，吞養正丹；未效，佐以木香檳榔丸。風祕者，風搏肺臟，傳於大腸，小續命湯，去附子，倍芍藥，加竹瀝，吞潤腸丸，或活血潤腸丸。更有老年津液乾枯，婦人產後亡血，及發汗利小便，病後血氣未復，皆能祕結，法當補養氣血，使津液生則自通，誤用硝黃利藥，多致不救，而巴豆牽牛，其害更速。八珍湯加蘇子橘紅杏仁蓯蓉，倍用當歸。若病證雖屬陰寒，而脈實微躁，宜溫煖藥中，略加苦寒，以去熱躁，躁止勿加。如陰躁欲坐井中者，兩尺按之必虛，或沉細而遲，但煎理中湯，待極冷方服。或服藥不應，不敢用峻猛之藥者，宜蜜煎導之，用鹽五分，皂角末五分，入蜜煎中，其功更捷。冷祕者，醬生薑導之，或於蜜煎中加草烏頭末。有熱者，猪膽汁導之。久虛者，如常飲食法，煮猪血臟湯，加酥食之。血仍潤血，臟仍潤臟，此妙法也。每見江湖方士，輕用硝黃者，十傷四五，用巴丑者，十傷七八，不可不謹也。或久而愈結，或變爲肺痿，吐膿血，或飲食不進而死。

㊁小便閉癃

[illegible]

而淋濇用六味丸若轉筋小便不通或喘急欲死不問男女孕婦急用八味丸緩則不救若老人陰痿思色精不出
而內敗，小便道澀痛如淋用加減八味丸料，加車前牛膝。若老人精已竭而復耗之，大小便道牽痛，愈痛愈欲便愈
便則愈痛；亦治以前藥不應，急加附子。若喘嗽吐痰，腿足冷腫，腰骨大痛面目浮腫，太陽作痛，亦治以前藥若痛愈
而小便仍濇，宜用加減八味以緩治之。

㈣傷寒小便不通

已汗復下，小便不利，心煩，小柴胡湯，太陽汗後，脈浮，小便不利，微熱而渴，五苓散。身黃，小便不利，腹微滿者，茵陳蒿湯。小便不利，大便乍難乍易，微熱有燥屎也，承氣湯。潮熱，大便泄，小便不利，柴苓湯。風濕，自汗，身重，小便不利，甘草附子湯。熱鬱不通，田螺搗朴硝，少加麝，貼臍上。寒鬱不通，炒鹽熨臍下。

㈤傷寒小便數

小便數，頻來而短少也。太陽汗吐後，小便數，譫語，調胃承氣湯。太陽自汗，四肢拘急，心煩，微惡寒，小便數，甘草乾薑湯芍藥甘草湯。

薛己醫案

㈠小便證治

經曰：『膀胱不約為遺溺，小便不禁，常常出而不覺也。人之溲溺，賴心腎二氣之所傳送，蓋心與小腸為表裏，腎與膀胱為表裏，若心腎氣虧，傳送失道，故有此證。治宜溫煖下元，清心寡慾。又有產育不順，致傷膀胱，若內虛寒者，祕元丹韭子丸之類。若內虛濕熱者，六味地黃丸，或加五味杜仲補骨脂，年老者八味丸。產育收生不謹，損破尿胞者，參朮補胞湯加豬羊胞煎之。竊謂肝主小便，若肝經血虛，用四物山梔。若小便澀滯，或莖中作痛，屬肝經濕熱，用龍膽瀉肝湯。若小便頻數，或勞而益甚，屬脾氣虛，用補中益氣湯加山藥五味。若小便無度，或淋瀝不禁，乃陰挺痿痹也，用六味地黃丸。若小便澀滯，或補而益甚，乃膀胱熱結也，用五淋散。其脾肺燥不能化生者，黃芩清肺飲。膀胱陰虛，陽無所生者，滋腎丸。膀胱陽虛，陰無所化者，六味丸。若陰痿思色，精不出，莖道澀痛如淋，或加減八味丸料加車

醫部彙考二百六十五

大小便門二

明趙獻可醫貫

㈠大便不通

腎虛後重者，數至圊而不能便，必莖中痛，或大便不能得，而小便先行而澀，或欲小便而大便反欲去而痛，獨褚氏精血論中云：『精已耗而復竭之，則大小便道牽痛，愈痛則愈便，愈便則愈痛。』須以補中益氣湯倍升麻送四神丸，又以八味地黃丸料，加五味吳茱萸補骨脂肉豆蔻，多服乃效。此等證候以利藥致損元氣，肢體腫脹而斃者，不可枚舉。『腎既主大小便而司開闔，故大小便失職者責之腎。』即此推之，然則大便不通者獨非腎乎？金匱真言論云：『北方黑氣，入通於腎，開竅於二陰。』故腎氣虛則大小便難，宜以地黃蓯蓉車前子茯苓之屬補其陰利水道，少佐辛藥，開腠理致津液而潤其燥。潔古云：『臟腑之祕，不可一概治療，有熱祕，有冷祕，有實祕，有虛祕，有風祕，有氣祕，老人與產後及發汗利小便過多，病後氣血未復者，皆能成祕，禁用硝黃巴豆牽牛等藥。』世人但知熱祕，不知冷祕。冷祕者，冷氣橫於腸胃，凝陰固結，津液不通，胃氣閉塞，其人腸內氣攻，喜熱惡冷，宜以八味地黃丸料大劑煎之，冷飲即愈。或局方半硫丸，碾生薑調乳香下之。或海藏已寒丸俱效。海藏云：『已寒丸雖熱，得芍藥茴香潤劑引

則是淸化之源絕矣，當於肺之分，助其秋令，水自生焉。如天令至秋白露降，須用淸金之藥，如生脈散之類爲當。又有肺虛者，蓋因飮食失節，傷其胃氣，陷於下焦，經所謂脾胃一虛，令人九竅不通，用補中益氣湯，以參芪甘溫之品，先調其胃氣，以升柴從九原之下而提之，則淸升而濁自降矣。淸肺者隔二之治也，補脾者隔三之治也。東垣虛則補母之妙用類如此，此皆滋後天之化源者。如不渴而小便不利，此屬下焦血分，下焦者，腎與膀胱也，乃陰中之陰，陰受熱閉塞其下流。經曰：『無陽則陰無以生，無陰則陽無以化。』若淡滲之藥，乃陽中之陰，非純陰之劑，陽何以化？須用滋腎丸，此氣味俱陰，乃陰中之陰也。東垣先生治一人目睛突出，腹脹如鼓，膝已上堅硬，皮膚欲裂，飮食不下，便祕危急者，精思半夜而得之，投之卽愈。此是陰虛陽無以化也。蓋至於眞陽眞陰虛者，東垣未之論，如有眞陰虛者，惟六味地黃丸以補腎水。滋腎丸又所當禁，黃蘗知母恐其苦寒泄水，又忌淡味滲泄之藥。有眞陽虛者，須八味丸。褚氏云：『陰已痿而思色，以降其精，則精不出而內敗，小便道澀如淋，精已耗而復竭之，則大小便道牽痛，愈痛則愈便，愈便則愈痛。』戴氏云：『有似淋非淋，便中有如鼻涕之狀，此乃精溺俱出，精塞溺道，故欲出不能而痛，宜大菟絲子丸、鹿茸丸。』戴氏亦得褚氏之法也。若至於轉筋，喘急欲死，不問男女孕婦產後，急用八味丸料煎飮，緩則不救。或疑桂附辛熱不敢輕用，豈知腎氣虛寒，水寒冰凍之義，得熱則流通，舍此更有何物能直達膀胱而使雪消春水來耶？

丹溪治一老人患小便不利，因服分利之藥太過，遂致祕塞，點滴不出。予以其胃氣下陷，用補中益氣湯，一服而通。因先多用利藥，損其腎氣，遂致通後遺尿，一夜不止，急補其腎，然後已。凡醫之治是證者，未有不用泄利之劑，誰能固其腎氣之虛哉？予特表之爲世戒。後若有善法，丹溪者已明知其肺虛矣，乃以補中益氣湯送腎氣丸，豈不上下相須，子母相益耶？靈樞言手太陰之別名曰列缺，其病虛則欠呿，小便遺數，肺爲上焦，通調水道，下輸膀胱，腎又上

而下之，陰得陽而化，故大小便自通。如遇春和之陽，冰自消矣，然不若八味丸更妙也。』東垣云：『腎主五液，津液盛則大便如常，若饑飽勞役，損傷胃氣，及辛熱厚味，而助火邪伏於血中，耗散眞陰，津液虧少，故大腸結燥。又有老年氣虛津液衰少而結者，腎惡燥，急食辛以潤之是也。』予嘗法體東垣之論，不用東垣之方，如潤腸丸潤燥湯通幽散之類俱不用，惟用六味地黃丸料煎服自愈，如熱祕而又兼氣虛者，以前湯內加參芪各五錢，立愈，此因氣虛不能推送，陰虛不能濡潤故耳。已上治法，予嘗親試而必驗，且又不犯大黃桃仁枳殼等破氣破血之禁，可以久服永無祕結，故表而出之。或問曰：『何爲不用四物湯？』曰：『四物湯特能補血耳，此是先天津液不足，故便難。經曰：『大腸主津，小腸主液。』又曰：『腎主五液。』津液皆腎水所化，與血何干，故不用四物湯。』或又問曰：『如乾結之甚，硝黃亦可暫用否？』曰：『承氣湯用硝黃，乃爲傷寒從表入裏，寒變爲熱，熱入三陰，恐腎乾枯，故用硝黃以逐去外邪，急救腎水。余獨禁用者，乃是論老人虛人及病後人腎水原不足，以致乾枯，若再用硝黃等藥以下之，是虛其虛，雖取一時之快，後必愈結，再下之後，日雖鐵石亦不能通矣。倘有患此者，當勸慰之，勿令性急自取危殆。況老人後門固者，壽考之徵，自是常事，若以六味八味常服，永保無虞。』

㈡小便不通幷不禁論

溲溺不通，匪細故也。小腹急痛，狀如覆椀，奔迫難禁，期朝不通，便令人嘔，名曰關格，又日不通而斃矣。今人一見此證，却用五苓散之外，束手待斃，若甌熨丹田，螻蛄田螺罨臍之法，抑末也。若津液偏滲於腸胃，大便泄瀉而小便不通者，宜五苓分利之。若水停心下不能下輸膀胱者，亦用五苓滲泄之。若六腑客熱轉於下焦而不通者，用益元散以清之。若氣迫閉塞，升降不通者，宜升麻以提之，或探吐之。譬如水注之氣，上竅開而下竅通也。經曰：『膀胱者，州都之官，津液藏焉，氣化則能出矣。』又曰：『三焦者，決瀆之官，水道出焉。』可見膀胱但能藏水，必待三焦之氣化方能出水[illegible]

火不交陰陽否隔，所以氣自氣而氣不化，水自水而水蓄不行，氣不化，水則水腑枯竭者有之；水蓄不行，則浸漬腐敗者有之。氣既不能化，而欲強爲通利，果能行乎？陰中已無陽，而再用苦寒之劑，能無甚乎？理本甚明也。至若氣實而閉者，不過肝強氣逆，移礙膀胱，或破其氣，或通其滯，或提其陷，而壅者自無不去。此治實者無難，而治虛者必得其化爲不易也。故凡臨此證，不可不詳辨其虛實。

㈡論治

火在下焦，而膀胱熱閉不通者，必有火證火脈，及溺管疼痛等證，宜大分清飲，抽薪飲，益元散，玉泉散，及綠豆飲之類以利之。若肝腎實火不清，或遺濁，或見血者，大都清去其火，水必自通，前法俱可通用。氣閉證，當分虛實寒熱而治之。凡氣實者，氣結於小腸膀胱之間，而壅閉不通，多屬肝強氣逆之證，惟暴怒鬱結者多有之，宜以破氣行血爲主，如香附枳殼烏藥沉香茴香之屬，兼四苓散而用之。若氣陷於下，藥力不能驟及者，當即以此藥多服，探吐以提其氣，使氣升則水自降也。有痰氣逆滯不通者，即以二陳湯六安煎之類探吐之。有熱閉氣逆者，即以大分清飲探吐之。有氣實血虛而閉者，用四物湯探吐之。凡氣實等證，無如吐之爲妙，嘗之滴水之器，閉其上竅，則下竅不通，開其上竅，則下竅必利，蓋有升則有降，此理勢之使然也。凡氣虛而小便閉者，必以素多斵喪，或年衰氣竭，方有此證，正以氣有不化，最爲危候。然凡病此者，必其有漸，但覺小便短少，或便時費力，便當留心速治，若待其劇，恐無及也。但治此者，亦當辨其臟氣之寒熱，若素無內熱之氣者，是必陽虛無疑，或病未至甚，須當用左歸右歸六味八味等湯丸，或壯水以分清，或益火以化氣，隨宜用之，自可漸杜其原。若病已至甚，則必用八味丸料，或加減金匱腎氣湯大劑煎服，庶可挽回。或疑桂附辛熱不敢輕用，豈知下元陽氣虧甚，得寒則凝，得熱則行，舍此二者，更有何物可以直達膀胱，而使水因氣化也？若氣虛下陷，升降不利者，宜補中益氣湯主之。或即用此湯

連肺，故將兩臟，是子母也。母虛子亦虛，自然之理。東垣云：『小便遺失，肺金虛也，宜安臥養氣，禁勞役，以黃芪人參之類大補之，不愈，當責之腎。』經曰：『膀胱不約爲遺溺。』仲景云：『下焦竭則遺溺失便。』又云：『下焦不歸則遺溲。』蓋下焦在膀胱上口，主分別清濁，溲便下焦不歸其部，不能約制溲便，故遺溺。大抵天暖衣厚則多汗，天冷衣薄則多溺，多溺者寒也。至於不禁，虛寒之甚，非八味丸不效，古方如菟絲子丸、鹿茸丸、二氣丹俱可選用。戴氏云：『睡著遺尿者，此亦下元冷，小便無禁而然，宜大菟絲子丸，猪胞炙碎煎湯下。』凡遺尿皆屬虛，劉河間謂熱甚客於腎部，干於足厥陰之經，廷孔鬱結甚，而氣血不能宣通，則痿痹神無所用，故津液滲入膀胱，而溲溺遺失，不能收禁也。即內經淫氣遺溺，痹聚在腎，此係熱證，不可不知。考之薛按，有因勞發熱作渴，小便自遺，或時閉澀，余作肝火血虛，陰挺不能約制，午前補中益氣湯加山藥、山茱萸，午後六味丸，月餘悉退。

大抵不禁之病，虛火多而實熱少，倘以虛證悞投瀉火，頃刻危殆，慎之。

景岳全書　臣張介賓著

㊀癃閉論證

小水不通，是爲癃閉，此最危最急證也。水道不通，則上侵脾胃而爲脹，外侵肌肉而爲腫，泛及中焦則爲嘔，再攻上焦則爲喘，數日不通則奔迫難堪，必致危殆。今人一見此證，但知利水，或用田螺罨臍之法，而不辨其所致之本，無怪其多不治也。

凡癃閉之證，其因有四，最當辨其虛實。有因火邪結聚小腸膀胱者，此以水泉乾涸，而氣門熱閉不通也。有因熱居肝腎者，則或以敗精，或以槁血，阻塞水道而不通也。若此者，本非無水之證，不過壅閉而然，病因有餘，可清可利，或

古方書論小便不禁有屬熱屬虛之辨不知不禁乃以小水太利者皆屬虛寒，何有熱證。若因熱而小水頻數，其證則淋瀝點滴，不能禁止，而小水必不利，且或多痛澀，方是熱證，自有淋濁門治法，非遺失也。倘以虛寒誤認爲熱，而妄投瀉火之藥，無不殆矣。

㊃論治

凡治小便不禁者，古方多用固澀，此固宜然。然固澀之劑，不過固其門戶，此亦治標之意，而非塞源之道也。蓋小水雖係於腎，而腎上連肺，若肺氣無權，則腎水終不能攝。故治水者必須治氣，治腎者必須治肺，宜以參芪歸朮桂附乾薑之屬爲之主，然後相機加以固澀之劑爲之佐，庶得治本之道，而源流如度，否則徒障狂瀾，終無益也。余制有鞏隄丸方，治無論心脾肺腎之屬，皆宜以此爲主治。

脾肺氣虛，不能約束水道，而病爲不禁者，此其咎在中上二焦，宜補中益氣湯，理中湯，溫胃飲，歸脾湯，或四味回陽飲之類，加固澀等劑主之。如不見效，當責之腎。若肝腎陽氣虧敗，則膀胱不藏，而水泉不止，此其咎在命門，宜右歸飲，大補元煎，六味回陽飲，甚者以四維散之類主之。或加固澀爲佐亦可。或用集要四神丸，或八味地黃丸去澤瀉亦可。

凡睡中遺溺者，此必下元虛寒，所以不固，宜大菟絲子丸，家韭子丸，五子丸，縮泉丸之類主之。其有小兒從幼不加檢束而縱肆常遺者，此慣而無憚，志意之病也，當責其神，非藥所及。或因縱以致不固者，亦當治之如前，宜用猪羊溲脬炙脆煎湯，送下前藥更妙。凡因恐懼輒遺者，此必氣不足，下連肝腎而然，宜大補元煎，歸脾湯，五君子煎之類主之。

古方壯陽固澀等劑，如茴香益智丸，二氣丹，固脬丸，祕元丹，牡蠣丸，濟生菟絲子丸，固眞散，皆可隨宜擇用。

探吐之最妙。若素稟陽臟，內熱不堪溫補，而小便閉絕者，此必眞陰敗絕，無陰則陽無以化，水虧證也，治宜補陰抑陽，以化陰煎之類主之。或偏於陽亢而水不制火者，東垣滋腎丸亦可。但此即火證之屬耳。大小便俱不通者，必先通其大便，則小便自通矣，宜八正散之類主之。

久服桂枝之屬，以致水虧陽亢，而小便不通者，宜解毒壯水，以化陰煎之類主之。甚者，以黃連解毒湯加分利滋陰等藥亦可。惟菉豆飲爲解毒之神劑。其有因久服陽藥作用過多，火本不盛，單由水虧者，非六味地黃湯大劑滋之不可也。

服分利既多，而小水愈不通者，此必下竭之證。察其水虧者，必須大補眞陰，火虛者，必須峻補陽氣，氣達水行，其便自調，不可見其假實，恣意疏通，此與榨乾汁沸枯油者何異，致令竭者愈竭，鮮不危矣。

膀胱無水等證，有因泄瀉，水歸大腸，而小水不通者，此當但治泄瀉，泄瀉止而水自利也。有因大汗多汗，氣從汗泄，而小水不利者，此當調治營衛，表氣收而小便自利也。有虛勞亡血，傷精，水隨液去，五內枯燥，而小水不利者，此當調補眞陰，血氣漸充，而小水漸利也。凡此數者，皆膀胱無水枯涸之證，不可再加分利，惟泄瀉證亦有可分利者，亦不過十之三耳。諸證皆非有水不通而爲癃閉，當於各門求治。

懷姙之婦，每有小便不通者，此以胎氣下陷，溺孔被壓而然，多以氣虛不能舉胎所致，宜八珍湯補中益氣湯之類主之。

若臨盆之際，胎壓膀胱，而小便不通者，宜以手指托起其胎，則小水自出。

㊂遺溺不禁論證

遺溺一證，有自遺者，於睡中而遺失也。有不禁者，以氣門不固，而頻數不能禁也。又有氣脫於上，則下焦不約而遺

行，不通小便而小便自通矣。

小便不通，乃膀胱之氣化不行，治膀胱之經而已矣。然而治法，全不在治膀胱也。方用人參蓮子茯苓車前子王不留行各三錢，白果二十箇，甘草一錢，肉桂三分，水煎服，一劑即如注。此方之奇妙，全在用人參，其次則用肉桂三分。蓋膀胱必得氣化而始出，氣化者何？心包絡之氣也。膀胱必得心包絡之氣下行，而水路始能出。尤妙用白果二十箇，人多不識此意，白果通任督之脈，又走膀胱，引參桂之氣，直奔於膀胱之中，而車前王不留行盡是洩走之物，各隨之趨出於陰器之口，此臟治之妙法也。

燥澀乾甚，小腸細小，不能出便，脹甚欲死者，亦不治之證也。而吾欲治之者何？蓋小腸之開闔，小腸不得而司，令腎操其權也。倘徒治小腸，則小腸益虛，失其傳道之官，而脹且益甚。我今不治小腸而專治腎，則腎氣開，小腸亦開也。方名治本消水湯：熟地二兩，山茱萸麥冬各一兩，車前子茯苓各五錢，北五味二錢，牛膝劉寄奴各三錢，水煎服，一劑少通，再劑腸寬，小便如注矣。方用熟地山茱萸以補腎，麥冬五味補肺氣，以使清肅之氣下行於膀胱，茯苓車前分消水勢；牛膝寄奴借其迅速之氣，導其下行而不使上壅，此腎氣通水亦順也。

方一

㈠麻仁丸 和劑 治腸胃熱燥，大便祕結，

厚朴去皮薑製炒，芍藥，枳實麩炒各半斤。大黃蒸一斤，麻仁五兩，杏仁去皮尖炒五兩半。右爲末，煉蜜和丸如梧子大，每服二十丸，臨臥用溫水下，大便通利則止。

㈡麻仁丸 寶鑑 順三焦，和五臟，潤腸胃，除風氣，治冷熱壅結，津液耗少，令人大便祕難，或閉塞不通，

石室祕籙

臣陳士鐸著

㈠大便燥結

乾燥火熾，大腸陰盡，遂至糞如羊屎，名爲腸結，不治之證也。然而陰盡則宜死，今不死而腸結，是陰猶未盡也。眞陰一日不盡，則一日不死，一線不絕，則一線可生。吾有奇方，專補其陰，使陰生而火息，陰旺則腸寬也。方用生陰開結湯；熟地二兩，元參，當歸各一兩，生地，牛膝，麥冬，山茱萸肉，蓯蓉酒洗淡各五錢，山藥三錢，水煎服。一連數劑，腸結可開，糞卽不如羊屎矣，可望再生。然必須日日一劑，三月終，改用六味地黃湯，或不用湯而用丸，調理歲餘，永無結腸之苦也。

大便閉結者，人以爲大腸燥甚，誰知是肺氣燥乎？肺燥則清肅之氣，不能下行於大腸，而腎經之水，僅足以自顧，又何能旁流以潤溪澗哉？方用熟地，元參各三兩，火麻子一錢，升麻二錢，牛乳一椀，水二鍾，煎六分，將牛乳同調一椀服之。一劑不解，二劑必大便矣。此方之妙，全在不潤大腸而補腎，尤妙不止補腎而且補肺，更妙不止補肺而且升肺。蓋大腸居於下流，最難獨治，必須從腎經以潤之，從肺經以清之，氣旣下行，沉於海底，非用升提之法，則水注閉塞而不通，啓其上孔，則下孔自然流動，此下病治上法，亦腑病臟治之法也。其餘治腑之法，可卽以此悟。

凡久病之後，或大便一月不通，不必性急，止補其眞陰，使精足以生血，血足以潤腸，大便自出。方用熟地，元參，當歸各一兩，川芎五錢，火麻仁一錢，蜜半甌，大黃一錢，桃仁十箇，紅花三分，水煎服。此方妙在用熟地，元參，當歸以生陰血，少加麻仁，大黃以潤腸下行，此末治法，雖閉結而不亟亟以通之也。

大便不通，亦多實證，此方治實證者，實有奇效。方用大黃五錢，當歸尾一兩，升麻五分，蜜半甌，水煎服。大黃泄利，用

(九)活血潤腸丸東垣　治大便風祕血祕，時常結燥。

歸梢一錢，　防風二錢，　羌活，　大黃煨各一兩。　麻子仁二兩半，　皂角仁炮存性去皮秤一兩。　桃仁二兩，研如泥。　右除桃仁麻仁另研如泥外，爲極細末，煉蜜爲丸，如梧桐子大，每服五十丸，白湯下。二三服後，須以蘇子麻子粥，每日早晚食之。大便日久再不結燥，餘藥以磁器盛之，紙密封，勿使見風。

(一〇)橘杏丸得效方　治氣祕，老人虛弱人皆可服。

橘紅取末，　杏仁湯浸去皮尖，另研各等分。　右和勻，煉蜜丸如梧桐子大，每服七十丸，空心米飲湯送下。

(一一)蘇麻粥　順氣滑大便。

紫蘇子，　麻子仁不拘多少。　右二味研爛，水濾取汁，煮粥食之。

(一二)小通氣散　治虛人憂怒傷肺，肺與大腸爲傳送，致令祕澀，服燥藥太過，大便祕亦可用。

蘇葉，　枳殼，　橘紅，　木通各等分。　右剉散，每服四錢，水一盞，煎溫服，立通。

(一三)大承氣湯仲景下同　治大實大滿，大便不通者。

大黃，　芒硝，　厚朴去粗皮，　枳實各半兩。　右剉，如麻豆大，分半，用水一盞半，生薑三片，煎至六分，內硝煎，去滓服。

(一四)小承氣湯

大黃半兩，　厚朴去粗皮，　枳實各三錢。　右剉如麻豆大，分作二服，水一盞，生薑三片，煎至半盞，絞汁服。未利再服。

(一五)大黃飲子河間　治身熱煩躁，大便不通。

若年高氣弱，及有風人大便祕澀，尤宜服之。

枳殼去瓤麩炒，白檳榔煨半生，山藥，山萸，菟絲酒浸研，防風，肉桂，車前子，各一兩半。木香，羌活各一兩。麻仁研，郁李仁去皮研，大黃半蒸半生各四兩。右爲細末，入研藥和勻，煉蜜丸如梧桐子大，每服十五丸至二十丸，溫湯下，臨臥時服。

㊂皁角丸得效方　專治有風人臟腑祕澀，大效。

猪牙皁角，枳殼去瓤，羌活，桑白皮，檳榔，杏仁研，麻仁研，防風，白芷，橘紅，各等分。右爲細末，蜜丸如梧桐子大，每服三五十丸，白湯送下。蜜湯亦可。一方只皁角枳殼二味等分。

㊃疎風散　治風毒祕結。

枳殼半兩，防風，羌活，獨活，檳榔，白芷，威靈仙，蒺藜炒赤去刺，大麻仁炒另研，杏仁湯泡去皮尖炒另研，甘草炙，各一兩。右剉散，每服二錢半，生薑五片，蜜一匙，水一盞半，煎服。

㊄枳殼丸　治腸胃氣壅風盛，大便祕實。

皁角去皮弦子炙，枳殼炒，生大黃，羌活，木香，橘紅，桑白皮，香白芷，各等分。右爲末，煉蜜丸如梧桐子大，每服七十丸，空心米飲下。又方，只用枳實皁角等分，飯飲丸亦妙。

㊅二仁丸　專治虛人老人風祕，不可服大黃者。

杏仁去皮尖麩炒黃色，枳殼去瓤麩炒赤，麻仁另研，訶子慢火炒搥去核，各等分。右爲末，煉蜜丸如梧桐子大，每服三十丸，溫湯下。

㊆半硫丸和劑下同　治年高冷祕虛祕，及痃癖冷氣。

枳殼麩炒，橘紅各二兩五錢，阿膠蛤粉炒珠，肉蓯蓉各一兩半，蘇子，荆芥各一兩，當歸，杏仁炒去皮尖，麻仁各三兩。熟地黃六兩，右爲末以熟地杏仁麻仁三味杵爲膏，入末同杵千餘下，仍加煉蜜爲丸如梧桐子大，每服五六十丸，空心白湯送下。

㉓木香和中丸 治同上

木香，沉香，白豆蔻，枳實炒，檳榔，蓬朮，青皮，陳皮，當歸酒洗，黃芩，木通，黃連，縮砂仁，猪牙皂角去皮弦并子蜜水潤炙乾，郁李仁湯泡去皮，三稜末各一兩。大黃四兩，香附，牽牛頭末各三兩。黃蘗二兩。 右末水丸，每服三錢，重白湯下，或薑湯下。

㉔神功丸 寶鑑 治三焦氣壅，心腹痞悶，大腑風熱，大便不通，腰腿疼痛，肩背重疼，頭昏面熱，口苦咽乾，心胷煩躁，睡臥不安，及治脚氣并素有風人，大便結燥。

火麻仁另搗如膏，人參各二兩。訶黎勒皮，大黃錦紋者麪裹煨各四兩。 右爲細末，入麻仁搗研勻，煉蜜爲丸如梧桐子大，每服二十丸，溫湯下。溫酒米飲皆可服。食後臨臥。如大便不通，可倍丸數，以利爲度。

㉕潤腸丸 東垣 治胃中伏火，大便祕濇，或乾燥不通，全不思食，乃風結血祕，須潤燥和血疎風，自然通矣。

羌活，歸梢，大黃煨各半兩。桃仁泡去皮尖，麻仁各一兩。 右爲末，除麻仁桃仁另研如泥外，爲細末煉蜜爲丸，如梧桐子大，每服三五十丸，空心白湯送下。

㉖三白散 治陰囊腫脹，大小便不通。

白牽牛二兩，桑皮，白朮，木通，陳皮各半兩。 右爲細末，每服二錢，薑湯調下，空心服。未覺再進。

升麻一錢，大黃煨二錢，杏仁炒，枳殼炒，梔子仁，生地各一錢半。人參，黃芩各七分。甘草炙五分。
右作一服，水二鍾，薑五片，豆豉二十一粒，烏梅一枚，煎一鍾，不拘時服。

⑯威靈仙丸得效方　治年高氣衰，津液枯燥大便祕結。

黃芪蜜炙，枳實，威靈仙各等分。右爲末蜜丸如梧子大每服五七十丸，不拘時薑湯白湯任下。忌茶。一方有防風無黃芪。

⑰蓯蓉潤腸丸濟生方　治發汗，利小便，亡津液，大腑祕，老人虛人皆可服。

肉蓯蓉酒浸焙二兩，沉香另研一兩。右爲末，麻子仁汁打糊丸如梧子大，每服七十丸，空心米飲送下。

⑱導滯通幽湯東垣　治幽門不通上衝吸門不開噎塞，氣不得上下，大便難。脾胃初受熱中。多有此證，治在幽門，以辛潤之。

當歸身，升麻梢，桃仁泥，甘草炙各一錢。紅花少許，熟地黃，生地黃各五分。水二盞，煎至一盞，調檳榔細末五分，稍熱服。一方加麻仁大黃各等分，紅花少許，名潤燥湯。

⑲益血丹海藏　治大便燥，久虛亡血。

當歸酒浸焙，熟地黃各等分。右爲細末，煉蜜爲丸如彈子大，細嚼酒下一丸。

⑳五仁丸得效方　治津液枯竭，大腸祕澀，傳導艱難。

桃仁，杏仁炒去皮，各一兩。柏子仁半兩，松子仁一錢二分半，郁李仁炒去皮一錢，陳皮四兩，另爲末。
右將五仁另研如膏，入陳皮末研勻，煉蜜丸如梧桐子大，每服五十丸，空心米飲下。

㉑黃芪湯　治年高老人大便祕澀。

㉟宣氣散十全 治癃閉急痛

甘草梢，木通各二錢。梔子二錢，葵子，滑石。各一錢。右末二錢，燈心湯調下。

㊱通關丸醫鑒 治小便不通。

黃蘗，知母並酒炒，滑石各二兩。木通一兩，肉桂一錢。右爲末。水丸梧子大，空心，每服百丸。

㊲猪苓湯回春 治熱結小便不通。

猪苓，木通，澤瀉，滑石，枳殼，黃蘗酒浸，牛膝，麥門冬，瞿麥，萹蓄，車前子各七分。甘草三分。

右剉作一貼，入燈心一錢，空心水煎服。

㊳透泉散醫鑒 治小便赤澀不通。

滑石一兩，芒硝，甘草各五錢。琥珀二錢半。右爲細末，每二錢，空心以燈心煎湯調下。

㊴二石散入門下同 治脬轉八九日，不得尿。

滑石，寒水石，葵子各一盞。水十盞，煎至五盞，空心分二服。

㊵蒲黃散 治脬轉不得尿。

蒲黃，滑石各等分，右爲末，每二錢雞子清調下。

㊶滑石散得效方下同 治脬轉不得尿。

寒水石二兩，滑石麪，亂髮灰，車前子，木通各一兩。葵子一合。右剉水一斗，煎取五升，每服一升，日三次卽通。

㊷葱白湯 治小便卒暴不通，小腹膨脹，氣上衝心，悶絕欲死。此因驚憂暴怒，氣乘膀胱，鬱閉而脬系

㉗萬全木通散醫學入門　治膀胱有熱，小便難而黃。

滑石麪二錢，木通，赤茯苓，車前子炒，瞿麥，各一錢。右爲末，水煎服，或取末三錢，水調服。

㉘茯苓琥珀散醫學綱目　治小便澀數，宜滲瀉分利之。

澤瀉一兩，滑石七錢，赤茯苓，白朮，琥珀，猪苓，肉桂，甘草炙，各三錢。右爲末，每三錢，以長流甘爛水一盞調下，以美膳壓之。

㉙平補丸直指方　治小便數而澀瀝，如欲滲漏，或遺尿不禁。

菟絲酒製，山萸酒浸焙，益智，當歸各五錢。乳香二錢，川楝肉，牛膝，胡盧巴炒，巴戟，杜仲薑汁炒，肉蓯蓉酒浸各三錢半。右爲末，糯米糊丸梧子大，棗湯或鹽湯下五十丸。

㉚八正散局方　治膀胱熱積，小便癃閉不通。

大黃，木通，瞿麥，萹蓄，滑石，車前子。梔子，甘草，各一錢。右剉作一貼，入燈心一錢，空心水煎服。

㉛清肺散東垣下同　治渴而小便閉。

猪苓，通草各一錢半。赤茯苓，澤瀉，燈心，車前子，各一錢。萹蓄，木通，瞿麥，各七分。琥珀五分。右剉作一貼，空心水煎服。

㉜導氣除燥湯　治小便不通。

赤茯苓一錢半，黃蘗一錢一分，滑石，知母，澤瀉，各一錢。右剉作一貼，入燈心一錢，空心水煎服。

㉝導赤丸直指方　治膀胱有熱，小便不通。

大黃一兩五錢炒，梔子一兩二錢，生地黃，木通各八錢。赤芍藥，赤茯苓，滑石，各四錢。右爲末，蜜丸

各五分　右剉作一貼薑三片棗二枚水煎空心服老人加炮附子

(五十)雞胜胵散　治遺尿失禁。

雞胜胵一具，燒存性。　猪脬一箇，炙焦。　右爲末，每一錢，酒調下。

(五一)大菟絲子丸得效方　治脬氣虛寒，小便不禁。

菟絲子酒製，肉蓯蓉酒浸各二兩。　牡蠣煅，　五味，　附子炮　鹿茸酒炙各一兩。　雞胜胵炙，　桑螵蛸酒炙各五錢。　右爲末，酒糊和丸梧子大，空心温酒或鹽湯下七十丸。

(五二)茸香丸直指方　治虛損遺尿不禁，或虛冷尿多。

雞內金炙七錢半，　鹿茸酥炙，　肉蓯蓉酒浸，　當歸酒洗各五錢。　龍骨煅，　牡蠣粉，　赤石脂，　巴戟，　禹餘糧煅酢淬研，　白薑，　益智仁，　乳香各二錢半。　右爲末，糯米糊和丸梧子大，空心鹽湯下七十丸。

(五三)既濟丸醫鑑下同　治脬氣不足，有陰火，小便不禁。

菟絲子酒製，　益智仁炒，　白茯苓　韭子炒，　肉蓯蓉酒洗　當歸，　熟地黃各五錢。　黃蘗，　知母並鹽水炒，　牡蠣粉，　山茰肉酒蒸各三錢。　五味子一錢。　右爲末，麪糊和丸梧子大，空心鹽湯下百丸。

(五四)煨腎丸河間　治男子腰膝疼，夜多小便者。

川楝子去核，　馬練花，　破故紙，　胡盧巴，　茴香炒各等分。　右除茴香外，四味酒浸同爲末，煮麪糊爲丸如桐子大，每服十丸至二十丸，温酒下，空心食前服。

(五五)蒲灰散仲景下同　治小便不利。

蒲灰七分，　滑石三分。　右二味，杵爲散，飲服方寸匕，日三服。

不正。

陳皮三兩，　葵子一兩，　葱白三莖。　右剉水五升，煎取一升，分三服。

㊸徐長卿湯聖惠方　治氣壅關格不通小便淋結臍下妨悶。

徐長卿炙，　瞿麥穗各半兩。　茅根三分，　木通，　冬葵子各一兩。　滑石二兩，　檳榔一分。　右爲末，每服五錢。水煎，入朴硝一錢，溫服日二服。

㊹倒換散河間　治無問久新，癃閉不通，小腹急痛，肛門腫疼。

大黃，小便不通減半，　荊芥穗，大便不通減半。　右件藥味，各別爲末，每服一二錢，溫水調下。臨時加減服。

㊺通關散類聚　治小便不通。

白礬，　生白鹽，各二錢半。　右研勻，以紙圈圍臍，納藥在內，滴冷水藥上，即通。

㊻縮泉丸入門　治脬氣不足，小便頻數，一日百餘次。

烏藥，　益智仁各等分。　右爲末，酒煑山藥糊，和丸梧子大，臨臥鹽湯下七十丸。

㊼五子丸得效方下同　治小便不禁，遇夜愈多，頭眩脚弱，老人虛人多有此證，大能耗人精液，令人卒死。

菟絲子酒製，　韭子略炒，　益智仁，　茴香炒，　蛇牀子炒各等分。　右爲末，酒糊和丸梧子大，糯米飲下五七十丸，

㊽家韭子丸　治腎陽衰敗，脬冷遺尿不禁。

(六四)又方　治大便不通

大戟一斤，大豆五升，商陸，牛膝。右四味㕮咀，以水五升，煮取二升，以大豆五升，煎令汁盡，至豆乾。初服三枚以通爲度。

(六五)芒硝丸　治脹滿不通。

芒硝，芍藥各一兩半。杏仁，大黃各二兩。黃芩一兩六銖。右五味爲末，蜜丸如梧子大，飲服十五丸，加至二十丸取通利爲度，日三。

(六六)又方

車前子五合，通草，朴硝各四兩。郁李仁，黃芩，瞿麥各三兩。右六味㕮咀，水八升，煮取二升半，分三服。一方用絹袋盛煮頓服二升。一方車前子六兩，一方二升。

(六七)又方　治遺尿小便澀。

牡蠣，鹿茸，各四兩。桑耳三兩。右三味㕮咀，以水七升，煮取二升，分二服，日二。

(六八)又方　治關格大便不通。

大黃八兩，芒硝，烏梅，桑皮，各五兩。芍藥，杏仁，各四兩。麻仁三兩。右七味㕮咀，以水七升，煮取三升，分三服。一本無烏梅，加枳實乾地黃各二兩。

(六九)暖腎丸丹溪。　治腎虛多溺，或小便不禁而濁。

胡盧巴炒，故紙炒，川楝用牡蠣炒去牡蠣，熟地，益智，鹿茸酒炙，代赭燒醋七次淬研。山茱萸，禹餘糧醋淬，赤石脂各七錢半。龍骨，海螵蛸，熟艾醋拌炙焦，丁香，沉香，乳香各五錢。右爲末糯米

(七六)滑石白魚散　治證同上。

滑石，　亂髮燒，　白魚各二分。　右三味，杵爲散飲，服半錢匕，日三服。

(七七)茯苓戎鹽湯　治證同上。

茯苓半斤，　白朮二兩，　戎鹽彈丸大一枚。　右三味，以水八升，煮取三升，去滓，分溫三服。

(七八)猪苓湯　治脈浮發熱，渴而小便不利。

猪苓去皮，　茯苓，　阿膠，　滑石，　澤瀉各一兩。　右五味，以水四升，先煮四味，取二升，去滓，內膠烊消，溫服七合，日三服。

(七九)葵子散河間　治小便不通。

葵子，　茯苓各等分。　右爲末，每服四錢，水一盞，煎三沸，食前服。

(八〇)二黃湯千金方下同　治下焦熱結，不得大便。

大黃三兩，　黃芩二兩，　梔子二十枚，　甘草一兩。　右四味，㕮咀，以水五升，煮取一升八合，分三服。若大閉加芒硝二兩。

(八一)五柔丸　治閉澀。

大黃一升，蒸三斗米下。　前胡二兩，　半夏，　蓯蓉，　芍藥，　茯苓，　當歸，　葶藶，　細辛各一兩。　右九味爲末，蜜和合擣萬杵，爲丸梧子大，食後服十五丸，後稍增之，日再。

(八二)大五柔丸　治臟氣不調，大便難通。

大黃，　芍藥，　枳實，　蓯蓉，　葶藶，　甘草，　黃芩，　牛膝，各二兩。　桃仁一百枚，　杏仁四十枚。　右十味爲末，

(七七)又方子和　治小便頻滑數不禁。

知母，黃蘗，各等分。右剉碎酒浸透炒微黃爲末，水丸梧桐子大，如服藥前一日休喫夜飯，來日空心立服米飲湯下一百丸。只用一服，效。後喫白米粥一頓。

(七八)通關丸東垣　一名滋腎丸，一名泄腎丸，治不渴而小便閉，熱在下焦血分也。

黃蘗去皮剉酒洗焙。知母剉酒洗焙乾，各一兩。肉桂五分。右爲細末，熟水爲丸，如梧桐子大，每服一百丸，空心白湯下。頓兩足，令藥易下行故也。如小便利，前陰中如刀刺痛，當有惡物下爲驗。

(七九)又方丹溪下同　治大腸虛祕而熱。

白芍一兩半，陳皮，生地，歸身一兩，條芩，甘草二錢。右爲末，粥丸，白湯下七八十丸。

(八〇)草蜜湯　治心腎有熱，小便不通。

生車前草，擣取自然汁半盞。右入蜜一匙，調下。

(八一)蒲黃湯　治心腎有熱，小便不通。

赤茯苓，木通，車前子，桑皮，荆芥，燈心，赤芍，甘草炙，生蒲黃，滑石各等分。右爲末，每服二錢，葱頭一根，紫蘇五葉，煎湯調服。

粥丸如梧子大，服五十丸，煎菖蒲湯，空心送下。

琥珀不拘多少。

⑩琥珀散濟生方下同　治小便不通。

右為細末，每服二錢，用萱草根煎湯調服。燈心湯調服亦可。

檳榔不拘多少。

⑪檳榔散　治腸胃有熱，大便祕澀。

右為細末；每服二錢，用蜜湯點服，錢拘時候。

⑫通幽湯東垣下同　治大便難，幽門不通，上衝吸門不開，噎塞不便，燥祕，氣不得下，治在幽門，以辛潤之。

炙甘草，紅花，各一分。生地，熟地黃，各五分。升麻，桃仁泥，當歸身，各一錢。右都作一服，水二大盞。煎至一盞，去柤調檳榔細末五分，稍熱食前服之。

⑬潤燥湯　治大便不通。

升麻，生地黃各二錢。熟地黃，當歸梢，生甘草，大黃煨，桃仁泥，麻仁，各一錢。紅花五分。右除桃仁麻仁另研如泥外，剉如麻豆大，都作一服，水二盞，入桃仁麻仁泥，煎至一盞，去柤，空心稍熱服。

⑭升陽瀉濕湯　一名升陽湯　治膈咽不通，逆氣裏急，大便不行。

蒼朮五分，青皮，槐子，各二分。生地，熟地，黃蘗，各三分。當歸身，生甘草梢，各四分。升麻七分，桃仁十箇另研，黃芪一錢。右㕮咀如麻豆大，都作一服，入桃仁泥水二大盞，煎至一盞去柤稍熱食前服。

⑮潤腸湯　治大腸結燥不通。

生地，生甘草，各一錢。大黃煨，升麻，桃仁，熟地，當歸梢，麻仁，各一錢。紅花三分。右㕮咀，水二盞，

醫部彙考二百六十六

大小便門三

方二

㊂王瓜散寶鑑下同　治小便如泔，乃腎虛也。

王瓜根，　桂心各一兩。　牡蠣粉鹽泥裹燒赤候冷去泥一兩，　白石脂，　菟絲子酒浸，各二兩。　共爲末，每服二錢，大麥粥飲下。

㊃黃連阿膠丸　治二便交錯。

阿膠　茯苓各二兩。　黃連三兩。　右爲末，阿膠丸梧桐子大，米飲下二十丸。

㊄調氣散　治前證氣不循故道，所以清濁混淆。

白豆蔻，　丁香，　檀香，　木香各一兩。　藿香，　甘草各四兩。　桃仁二兩。　右爲末，每服二錢，湯下，兼服五苓散。

㊅二香丸艮方下同　治積滯氣祕，心腹刺痛中滿。

南木香，　丁香，　青皮，　五靈脂香潤者另研。　草果仁，　橘紅，　蓬朮煨。　右爲細末，用巴豆半兩，研如泥，漸入藥末研勻，麪糊和丸如麻子大，每服三丸，加至五七丸，食前生薑湯下。

(64)茯苓琥珀湯　治膀胱不得施化小便數而久

茯苓，琥珀，猪苓，白朮，各半兩。澤瀉一兩，滑石七分，桂心，甘草炙，各三錢。右爲細末，每服五錢，煎長流甘爛水一盞調下，空心服。待少時，以美膳壓之。

(65)通關瞿麥湯　治膀胱積熱，小便不通。

瞿麥穗，芍藥，大黃炒，梔子仁，楡白皮，葵子，當歸焙，火麻仁，石韋去毛，木通，甘草炙，各一兩，右剉碎每服五錢匕，水一盞半，燈心少許，煎至一盞，去滓，不拘時溫服。

(66)又方　治小便不通，數日欲死者，神效。

葱白一握，桃枝，柳枝，木通，旱蓮子，漢椒，白礬枯，各一兩。燈心一束。右細剉，以水三斗，煎至一斗五升，用瓷瓶一箇，熱盛一半藥汁，熏外腎週迴，以被圍繞不得外風入，良久便通，如赤豆汁若冷即換之，其功甚大。一方無旱蓮子。

(67)獨蒜塗臍方　治小便不通。

大蒜獨顆者一枚，梔子仁三七枚，鹽花少許。右搗爛攤紙花子上，貼臍，良久即通，未通，塗陰囊上，立通。

(68)牛膝湯　治小便不通，莖中痛。

牛膝根葉一握生用，黃芩半兩，當歸焙一兩。右剉碎，每服五錢匕，水一盞半，煎七分，去滓溫服，日三。

(69)猪肚丸　治小便頻數。

猪肚一箇，以蓮子一升同煑一周，去皮心焙乾，舶上茴香，破故紙，川楝子，母丁香各一兩。右爲細末，煉蜜爲丸，如梧桐子大，每服五十丸，空心用溫酒送下。

(八六)潤腸湯　治大便祕澀，連日不通。

荊芥穗研，　麻子仁一兩半研，水濾去滓取濃汁。　芝麻微炒，研，水濾取濃汁。　桃仁麸炒黃研，各一兩。　右入鹽少許同煎，食前代茶飲之，以利為度。

(八七)檳榔丸　治大腸積熱，氣壅不通，心腹脹滿，大便祕結。

大黃蒸，　黃芩，　枳實麸炒，　麻仁炒去殼另研，　牽牛炒，　檳榔，　羌活，　杏仁湯浸去皮尖炒黃，　白芷，各一兩。　人參，　右為細末，煉蜜和丸如梧桐子大，每服五七十丸，空心用白湯送下。

(八八)牛黃散　治上焦熱，臟腑祕結。

大黃一兩，　白牽牛取頭末半兩。　右為細末，每服三錢，如厥冷用溫酒調服，手足煩者用蜜湯調服，不拘時候。

(八九)三仁丸　治大腸有熱，津液竭燥，裏急後重，大便祕結。

柏子仁，　松子仁，　大麻子仁，各一兩。　右研令勻，用黃蠟半兩鎔化，和丸如梧桐子大，每服二十丸，食前用米飲送下。未快，加丸數服之。一方以白蠟和丸，用黃丹湯下，治老人虛祕。

(九〇)小提盆散　治大便燥結，服轉藥久不通。

竈突墨一錢，　滄鹽三錢。　右研勻，每用一錢，竹筒吹入肛門，立通。

(九一)枳殼丸　治三焦約證，調順氣脈，消痞滯，利胸膈，治風氣，通利大小便。

黑牽牛取頭末半生半炒七錢半，　枳殼二兩，　陳皮一兩，　檳榔半兩，　木香二錢半。　右為細末，煉蜜和丸如梧桐子大，每服十五丸，不拘時生薑湯送下，日三服。

(九二)通心飲　治心經有熱，脣焦面赤，小便不通。

㉗牡蠣丸　治小便不禁。

牡蠣白者三兩，盛磁器盒子內，更用鹽泥四兩，蓋頭鋪底，以炭火約五斤，煅半日，炭盡爲度，研粉。赤石脂三兩，搗碎酢拌勻濕，於生鐵銚子內慢火炒令乾，研粉。　右同研勻，酒煮糊和丸如梧桐子大，每服十五丸，空心用鹽湯送下。

㉘雞腸散　治小便不禁，日夜無度。

黃雞腸雄者四具，切破淨洗，炙令黃色。　肉蓯蓉酒浸切焙，　赤石脂研，　白石脂研，　苦參，各五兩。　右爲細末，更研勻，每二錢，食前酒調服，日二夜一。

㉙固脬丸　治小便不禁。

菟絲子二兩製，　茴香一兩，　附子炮去皮臍，　桑螵蛸炙焦，各半兩。　戎鹽一分。　右爲細末，酒煮麪糊爲丸，如梧桐子大，每服三十丸，空心用米飲送下。

㉚又方　治小便不禁。

益智仁，　巴戟去心，二味，以青鹽酒煮。　桑螵蛸，　菟絲子酒蒸。　右各等分爲細末，酒煮糊爲丸，如梧桐子大，每服二十丸，食前用鹽酒或鹽湯送下。

㉛澤瀉散　治遺尿小便澀。

澤瀉，　丹皮，　牡蠣煅，　桑螵蛸微炒，　赤茯苓，　鹿茸去毛酥塗炙微黃，　阿膠炒珠，各一兩。　右爲細末，每服二錢，食前用酒調服。

㉜又方　治小便遺失。

◎雞膍胵丸　治小便數而多。

雞膍胵二兩微炙，　麥冬焙，　黃連　熟地黃，　龍骨，各一兩。　土瓜根半兩。　右爲細末，煉蜜和搗二三百杵，丸如梧桐子大，每服三十丸，食前用米飲送下。

◎水芝丸　治下焦眞氣虛弱，小便頻多，日夜無度。

蓮實去皮，不以多少，用好酒浸二宿，用猪肚一箇，將蓮實入在內，用水煮熟，取出切焙乾，不用猪肚。　右爲細末，酢煮糊和丸，如梧桐子大，每服三十丸，食前用溫酒送下。

◎雙白丸　治證同前。

白茯苓去皮，　鹿角霜各等分。　右爲細末，酒煮糊爲丸，如梧桐子大，每服三十丸，空心用鹽湯送下。

◎二氣丹　治內虛裏寒，膀胱積冷，陽氣漸微，小便不禁。

硫黃研二錢半，　大附子一枚，炮去皮臍半兩。　桂心二錢半，　乾薑炮二錢。　右各另爲末，拌勻，麪糊和丸如梧桐子大，以硃砂二錢爲衣，每服五十丸，空心用鹽湯送下。

◎茯苓丸　治心腎俱虛，神志不守，小便淋瀝不禁。

赤茯苓　白茯苓各等分。　右爲細末，以新汲水挼洗，澄去新沫，控乾，復研爲末，別取地黃汁，與好酒同於銀石器內熬成膏，搜和丸如彈子大，每服一丸，細嚼，空心用鹽酒送下。

◎桑螵蛸散　治小便頻數，如稠米泔色，此由勞傷心腎得之。服此藥不終劑而愈，大能安神定志。

桑螵蛸鹽水炙，　龍骨，　遠志，　石菖蒲鹽炙，　人參　茯神，　鼈甲酢炙，　當歸各等分。　右爲細末，每服二錢，臨卧時用人參煎湯調服。

每服五十丸，空心用川萆薢煎湯送下。

㉚左歸飲景岳全書下同　凡命門之陰衰陽勝者，宜此方加減主之。

熟地二三錢或一二兩，　山藥，　枸杞各二錢。　炙甘草一錢，　山萸一二錢畏酸者少用。　茯苓一錢半。　水二鍾，煎七分，食遠服。

㉛右歸飲　凡命門陽衰陰勝者，宜此方加減主之。

熟地二三錢或一二兩，　杜仲薑製，　山藥炒，　枸杞各二錢。　山茱萸一錢，　製附子一二三錢。　甘草炙，　肉桂各一二錢。　水二鍾煎七分，食遠溫服。

㉜六安煎　治痰滯氣逆癃閉等證。

陳皮一錢半，　半夏二三錢，　茯苓二錢，　甘草，　杏仁去皮尖各一錢，　白芥子五七分，老弱不用。　水一鍾半加生薑三五七片，煎七分，食遠服。

㉝抽薪飲　治癃閉凡火熾盛而不宜補者。

黃芩，　石斛，　木通，　梔子炒，　黃蘗各一二錢。　枳殼，　澤瀉各錢半。　細甘草三分。　水一鍾半，煎七分，食遠溫服。內熱甚者，冷服更佳。

㉞大分清飲　治積熱閉結，小水不利，淋閉等證。

茯苓，　澤瀉，　木通各二錢。　豬苓，　梔子，或倍之　枳殼，　車前子，各一錢。　水一鍾半，煎八分，食遠溫服。

㉟化陰煎　治水虧陰涸，陽火有餘，小便癃閉，淋濁疼痛等證。

生地，　熟地，　牛膝，　豬苓，　澤瀉，　生黃蘗，　生知母各二錢。　菉豆三錢，　龍膽草錢半。　車前子一錢。　水

阿膠炒，牡蠣煅，桑螵蛸酒炙，鹿茸酒炙等分。右爲細末，糯米糊和丸如梧子大，每服五十丸，空心鹽酒送下。一方治遺尿小便澀，無桑螵蛸有桑耳，水七升，煮取二升，分二服。一方以粥飲下。

㊂阿膠飲　治小便遺失不禁。

阿膠三兩炒，牡蠣燒粉，鹿茸切酥炙各四兩。右剉散，每服四錢，水一盞，煎七分，空心服。或爲細末，米飲調服二錢亦可。

㊃白薇散　治小便不禁。

白薇，白蘞，白芍藥各等分。右爲細末，每服二錢，食前以粥飲調下。

㊄白茯苓散　治小便不禁，日夜不止。

茯苓，龍骨，乾薑炮，附子炮去皮臍，續斷，桂心，甘草各一兩，熟地，桑螵蛸微炒各二兩。右剉每四錢，水一盞，煎至六分，去滓，食前溫服。

㊅鹿茸散　治小便不禁，陰痿腳弱，

鹿茸二兩去毛塗酥炙微黃，羊躑躅酒拌炒乾，韭子微炒，附子炮去皮臍，澤瀉，桂心各一兩，右爲細末，每二錢食前粥飲調服，漿水亦可。

㊆鹿茸散　治腎臟虛，腰臍冷疼，夜遺小便。

鹿茸去毛酥炙黃，鰞鰂魚骨去甲微炙各三兩，當歸，白芍，桑寄生，龍骨研，人參各一兩，桑螵蛸一兩半中劈破，慢火炙令黃。右爲細末，更入龍骨同研令勻，每服一錢，用溫酒調服，空心日晚臨臥各一服。

㊇菟絲子散　治小便多或不禁。

熟地　菟絲子酒煮　白朮炒各二兩　韭子炒

兩。　右爲末，山藥糊丸如桐子大，每服百餘丸，空心滚湯或溫酒下。　如兼氣虛，必加人參一二兩更妙。

單方

小便頻遺，用雄雞腸一具作臛，和酒服，或水煮汁日三服。心鏡。

小便不禁，雄雞翎燒研，酒服方寸匕。外臺祕要

小便過多，象牙燒灰飲服之。總錄

小便不通，磨刀交股水一盞服之，效。集簡方。

又方。蚯蚓糞朴硝各等分，水和傅臍下，卽通。普濟方。

又方。梁上塵二指撮，水服之。外臺祕要。

又方。黑鉛銼末一兩，生薑半兩，燈心一握，井水煎服，先以炒葱貼臍。聖惠方下同。

大小便閉，脹悶欲死，二三日則殺人。膩粉一錢，生麻油一合，相和，空心服。

大便壅結，膩粉半錢，沙糖一彈丸，研丸梧子大，每服五丸，臨臥溫水下。

小便不通，熏黃末豆許，納孔中，或蜜爲丸亦良。崔氏方

天行病，小腹滿，不得小便，雌黃末蜜丸，納尿孔中，入半寸。肘後方。

氣壅關格不通，小便淋結，臍下妨悶兼痛，滑石粉一兩，水調服。廣利方。

小便不通，滑石末一升，以車前汁和，塗臍之四畔，方四寸，乾卽易之，冬月水和。楊氏產乳。

膀胱熱悶，小便不快，井泉石　海金沙　車前子　滑石各一兩，爲末，每服二錢，蜜湯下。聖濟錄。

二鍾，加食鹽少許，用文武火煎八分，食前溫服或冷服。

㉖菉豆飲　凡諸火熱極癃閉者，用此最妙。

菉豆不拘多寡。右用寬湯煮糜爛，入鹽少許或蜜亦可，待冰冷或厚或稀或湯，任意飲食之，日或三四次，不拘。

㉗大補元煎　治男婦氣血大壞，精神失守，遺溲不覺危劇等證。

人參少則一二錢，多則一二兩。　山藥微炒黃　杜仲各二錢。　熟地少則二三錢，多則二三兩。　枸杞，　當歸各二三錢。泄瀉者去之。　炙甘草一二錢，　山茱萸一錢。畏酸呑酸去之。　水二鍾，煎七分，食遠溫服。

㉘四味囘陽飲　治元陽虛脫，溲便遺失，危在頃刻者。

人參一二兩，　製附子，　炮乾薑各二三錢。　炙甘草一二錢。　水二鍾，武火煎七八分，溫服，徐徐飲之。

㉙六味囘陽飲　治陰陽將脫等證。

人參一二兩或數錢，　熟地黃五錢或一兩，　製附子，　炮乾薑各二三錢。　炙甘草一錢。　當歸身三錢。泄瀉或血動者，以冬朮代之。　水二鍾，武火煎七八分，溫服。

㉚五君子煎　治脾胃虛寒，嘔吐泄瀉而兼濕者。

人參二三錢，　白朮黃土炒，　白茯苓各二錢。　炙甘草一錢，　乾薑炒黃一二錢，　水一鍾半煎服。

㉛溫胃飲　治中寒嘔吐呑酸泄瀉等證。

人參一二三錢或一兩　白朮炒一二錢或一兩　扁豆炒二錢，　陳皮一錢或不用，　炙甘草一錢，　乾薑炒焦一二三錢，　當歸一二錢。滑泄者不用。　水二鍾，煎七分，食遠溫服。

㉜四維散　治脾腎虛寒，滑脫之甚，或泄利不能止，或氣虛下陷不能禁者，無出此方之右。

小便不通，用麻根、蛤粉各半兩，爲末，每服二錢，空心新汲水下。

又方，用苧根洗研，攤絹上，貼少腹連陰際，須臾即通。摘元方。

小便不通，馬藺花炒，茴香炒，葶藶炒，爲末，每酒服二錢。十便良方。

小便不通，臍腹急痛，牛蒡葉汁、生地黃汁二合，和勻，入蜜二合，每服一合，入水半盞，煎三五沸，調滑石末一錢服。聖濟總錄

小便澀滯不通，及男婦轉脬，乾箬葉一兩，燒灰，滑石半兩，爲末，每米飲服三錢。普濟方。

小便不通，萱草根煎水頻飲。杏林摘要

又方，竹雞草一兩，車前草一兩，搗汁，入蜜少許，空心服之。集簡方

久病大便澀滯，服葵菜自然通利，乃滑以養竅也。

二便不通脹急者，生冬葵根二斤，搗汁三合，生薑四兩，取汁一合，和勻，分二服，連用即通。

大便不通十日至一月者，冬葵子三升，水四升，煮取十升，服，不瘥更作。肘後方。

又方，用葵子末、人乳汁等分，和服，立通。聖惠方。

關格脹滿，大小便不通，欲死者，用葵子二升，水四升，煮取一升，納猪脂一雞子，頓服。肘後方。

又方，用葵子爲末，猪脂和丸梧子大，每服五十丸，效止。千金方。

二便關格，脹悶欲死，二三日則殺人，蜀葵花一兩，搗爛，麝香半錢，水一大盞，煎服，根亦可用。

小便不禁，重鵲巢中草一箇，燒灰，每服二錢匕，以薔薇根皮二錢，煎湯服之，日二。聖惠方。

小便不禁，上熱下寒者，鹿角霜爲末，酒糊和丸梧桐子大，每服三四十丸，空心溫酒下。普濟方。

秋石主治小便遺數，漏精白濁。時珍。

小便不通，濕紙包白鹽燒過，吹少許入尿孔中，立通。普濟方。

二便不通，鹽和苦酒傅臍中，乾卽易，仍以鹽汁灌肛內，幷用紙裹鹽投水中飲之。家藏方。

又方。膩粉二錢，黃丹一錢爲末，每米飲服一錢。普濟方。

男女轉浮不得小便，寒水石二兩，滑石一兩，慈石一合爲末，水一斗，煑五升，時服，一日通利。永類方。

關格不通，大小便閉脹欲死，二三日則殺人。硭硝三兩，泡湯一升服，取吐卽通。百一方。

二便不通，白礬末塡滿臍中，以新汲水滴之，覺冷透腹內，卽自然通，臍平者以紙圍環之。經驗方。

大便不通，皂礬一錢，巴霜二箇，同研，入雞子內攪勻，封頭濕紙裹煨熟食之，酒下卽通。集元方。

小便不通，綿黃芪二錢，水二盞，煎一盞，溫服，小兒減半。總微論。

老人閟塞，綿黃芪陳皮去白各半兩爲末，每服三錢，用大麻子一合，研爛，以水濾漿，煎至乳起，入白蜜一匙，再煎沸，調藥空心服，甚者不過二服。此藥不冷不熱，常服無閟濇之患，其效如神。和劑局方

汗多便閟，老人虛人皆可用，肉蓯蓉酒浸焙二兩，研沉香末一兩爲末，麻子仁汁打糊，丸梧子大，每服七八丸，白湯下。濟生方。

小便艱難，或轉胞腹滿悶，不急療殺人，用秦艽一兩，水一盞，煎六分，分作二服。又方加冬葵子等分爲末，酒服一匕聖惠方下同。

老人大腸祕濇，防風枳殼麩炒各二兩，甘草半兩爲末，每食前白湯服二錢。

大便閟塞，服藥不通者，滄鹽三錢，屋簷爛草節七箇爲末，每用一錢，竹筒吹入肛內一寸，卽通，名提金散。聖濟錄下同。

又方，當歸白芷等分爲末，每服二錢，米湯下。

燥渴腸祕，九月十月熟苦蔞實取瓤，拌乾葛粉，銀石器中，慢火炒熟爲末，食後夜臥各以沸湯點服二錢。寇氏衍義

大小二便不通，黃瓜根搗汁，入少水解之，筒依前後患吹之，取通。肘後方

大便卒結，羊蹄根一兩，水一大盞，煎六分，温服。聖惠方。

小便不利，膀胱水氣流滯，浮萍日乾爲末，飲服方寸匕，日二服。聖惠方用治水氣洪腫，小便不利，白湯下。千金翼。

二便不通，酸草一大把，車前草一握，搗汁入砂糖一錢，調服一盞，不通再服。摘元方。

大便不通，冬麻子半斤，研碎，水濾取汁，入粳米二合煮稀粥，下椒薑鹽豉，空心食。食醫心鏡。

大便不通，陳大麥𥞩煎濃汁，頻服。簡便方

大小便閉，擣葱白和酢，封小腹上，仍灸七壯。外臺祕要。

大腸虛閉，用連鬚葱一根，薑一塊，鹽一捻，淡豉三七粒，擣作餅，烘掩臍中，紮定良久，氣通，不通再作。直指方。

小便不通，葱白連葉擣爛，入蜜，合外腎上，即通。永類鈐方

關格脹滿，大小便不通，獨頭蒜燒熟去皮，綿裹納下部，氣立通也。外臺祕要

二便關格脹悶欲絕，蔓菁子油一合，空腹服之，即通，通後汗出勿怪。聖惠方。

大便不通，生薑削長二寸，塗鹽納下部，立通。外臺祕要

小便不通，胡荽二兩，葵根一握，水二升，煎一升，入滑石末一兩，分三四服。聖濟總錄。

大小便閉，鼓脹氣促，八角茴香七箇，大麻仁半兩爲末，生葱白三七根，同研煎湯，調五苓散末服之，日一服。普濟方。

老人虛祕，柏子仁、松子仁、大麻仁等分，同研，鎔蜜蠟丸梧子大，以少黃丹湯食前調服二三十九，日二服，一方不用黃丹，每服五十丸，黃芪湯下。寇宗奭。

遺尿且澀，桑耳爲末，每酒下方寸匕，日三服。聖濟總錄。

小便不通，車前草一斤，水三升，煎取一升半，分三服。一方入冬瓜汁，一方入桑葉汁。百一方。

下部閉塞，蒴藋根一把，搗汁，水和絞去滓，強人每服一升。外臺祕要。

大便風祕，蒺藜子炒一兩，猪牙皂莢去皮酥炙五錢，爲末，每服一錢，鹽茶湯下。普濟方。

小便不通，臍下滿悶，海金沙一兩，臘南茶半兩，搗碎，每服三錢，生薑甘草煎湯下，日二服，末服亦可。圖經。

相火祕結，大黃末一兩，牽牛頭末半兩，每服三錢。有厥冷者酒服，無厥冷五心煩者蜜湯服。保命集。

二便不通，甘遂末以生麪糊調，傅臍中及丹田內，仍艾灸三壯，飲甘草湯以通爲度。

又方泰山赤皮甘遂末一兩，煉蜜和勻，分作四服，日一服，取利。聖惠方。

小便轉脬，甘遂末一錢，猪苓湯調下，立通。筆峯雜興。

小便不通，臍腹脹痛不可忍，諸藥不效者，不過再服，用續隨子去皮一兩，鉛丹半兩，同少蜜搗作團，瓶盛埋陰處，臘月至春末取出，研蜜丸梧子大，每服二三十丸，木通湯下，化服尤妙，病急亦可旋合。聖濟總錄。

消渴尿多，薔薇根一把，水煎，日服之。千金方。

小便滑數，金剛骨爲末，每服二錢，溫酒下，睡時。事親。

小便虛閉，兩尺脈沉微，用利小水藥不效者，乃虛寒也。附子一箇，炮去皮，臍鹽水浸良久，澤瀉一兩，每服四錢，水一盞半，燈心七莖，煎服，卽愈。普濟方。

大腸冷祕，附子一枚，炮去皮，取中心如棗大，爲末，二錢，蜜水空心服之。聖濟總錄。

二便不通，諸藥不效，紫花扁竹根生水邊者佳，研汁一盞服，卽通。普濟方。

大腸乾結，厚朴生研，猪臟煮搗和丸梧子大，每薑水下三十丸。十便良方。

二便關格，用皂莢燒研，粥飲下三錢，立通。千金方。

又方。用皂莢炙去皮子爲末，酒麪糊丸，每取五十丸酒下，名鐵脚丸。宣明方。

又方。用皂莢燒煙於桶內，坐上熏之，卽通。聖惠方。

風虛脚氣入大腸，或祕或利，皂角子一千二百箇，洗淨，以少酥熬香爲末，蜜丸梧子大，每空心以蒺藜子酸棗仁湯，吞至百丸，以通爲度。千金方。

小便熱短，樺皮濃煮汁飲。集簡方。

小便不通，櫻皮毛燒存性，以水酒服二錢，卽通利，累試甚驗。攝生方。

小便不通，萱草根煎水頻飲。摘要方。

二便不通，烏桕木根方長一寸，劈破，水煎半盞，服之立通，不用多喫，其功神聖，兼能取水。斗門方。

二便關格，二三日則殺人，烏桕東南根白皮乾爲末，熱水服二錢，先以芒硝二兩煎湯服，取吐甚效。肘後方。

又方。巴豆連油、黃連各半兩，擣作餅子，先滴葱鹽汁在臍內，安餅於上，灸二七壯，取利爲度。楊氏家藏。

大便不通，枳實皂莢等分爲末，飯丸，米飲下。得效方。

小便不通，巵子仁十四箇，獨頭蒜一箇，滄鹽少許，擣貼臍及囊，卽通。

小便轉胞，眞琥珀一兩爲末，用水四升，葱白十莖，煮汁三升，入琥珀末二錢，溫服。聖惠方。

小便不通，猪膽一枚，熱酒和服。

又方。用猪膽連汁，籠住陰頭一二時，汁入自通。

小便不通，萵苣菜擣傅臍上即通。海上方用萵苣子亦效。易簡方。

利大小便，莧實爲末半兩分二服，新汲水下。聖惠方。

卒不小便，杏仁二七枚，去皮尖炒黃研末，米飲服之。錄驗方。

大便不通，氣奔欲死者，烏梅十顆湯浸去核，丸棗大，納入下部，少時即通。食療本草。

大便不快，裏急後重，用桃仁三兩去皮，吳茱萸二兩，食鹽一兩，同炒熟，去鹽茱，每嚼桃仁五七粒。總錄。

大便艱難，桃花爲末，水服方寸匕，即通。無桃花，白皮亦得。千金方。

乾糞塞腸，脹痛不通，用毛桃花濕者一兩，和麵三兩，作餛飩煮熟，空心食之，日午，腹鳴如雷，當下惡物也。聖惠方。

二便不通，桃葉杵汁半升服。冬用榆皮。千金方

大便燥澀，大棗一枚去核，入輕粉半錢，縛定煨熟食之，仍以棗湯送下。直指方。

大腸閟塞，陳皮連白酒煮焙，研末每溫酒服二錢，米飲下。普濟方

腸胃有濕，大便祕塞，大檳榔三枚，麥門冬煎湯磨汁溫服。或以蜜湯調末二錢服，亦可。普濟方。

小便頻數，胡桃煨熟，臥時嚼之，溫酒下。

老人遺尿不知者，草烏頭一兩，童便浸七日，去皮同鹽炒爲末，酒糊丸菉豆大，每服二十丸，鹽湯下。普濟方。

小便失禁，用豆醬汁和竈突墨如豆大，內尿孔中。

大便不通，瓜蔕七枚，研末緜裹，塞入下部，即通。必效方

小便不通，竹雞草一兩，車前草一兩，搗汁入蜜少許，空心服之。集簡方。

胞轉不通，非小腸膀胱厥陰受病，乃強忍房事，或過忍小便所致，當治其氣則愈，非利藥可通也。沉香木香各二錢

老小尿牀，白紙一張，鋪蓆下，待遺於上，取紙曬乾，燒灰，酒服。

尿牀，取羊肚盛水令滿，線縛兩頭，煮熟，卽開，取中水頓服，立瘥。

小便頻數，下焦虛冷也。羊肺一具切作羹，入少羊肉和鹽豉食，不過三具。集驗方。

小便頻數，白果十四枚，七生七煨，食之，取效止。

小便轉，自取爪甲燒灰，水服。

小便不通脹急者，用苦瓠子三十枚，炒，螻蛄三箇，焙，爲末，每冷水服一錢。聖濟總錄。

小便不禁，酸石榴燒存性，無則用枝燒灰代之。每服二錢，用柏白皮切焙四錢，煎湯一盞，入榴灰，再煎至八分，空心溫服，晚再服。聖惠方

大便閉塞，椒豉湯五升，和猪膏三合灌之，佳。千金方下同。

夜臥尿牀，本人草薦燒灰，水服立瘥。

小便轉胞不出，納衣魚一枚於莖中。

又方。無灰濃酒半斤，鹽三錢匕，鍊如指大，深內穀道，佳。

又方。蜜和胡燕屎，內大孔中，卽通。

又方。鹽半合，蜜三合，煎如餳，出之著冷水中，丸如檳榔形，如指許大，深內下部中，立通。治大便難。

又方。單用豉淸醬淸羊酪土瓜根汁灌之，立通。

又方。以醬淸漬烏梅灌下部中。

又方。桑根白皮榆根白皮各一把，二味㕮咀，以水三升，煮取一升半，分三服。

小便不通，蚯蚓搗爛，水濾，取濃汁半椀服，立通。斗門方。

老人尿閉，白頸蚯蚓茴香等分，杵汁飲之，即愈。集驗方。

大便不通，瓜蔕七枚，研末，緜裹塞入下部，即通。必效方。

大小便祕，明月砂一匙，安臍中，冷水滴之，令透自通也。聖惠方。

小便不通，蝸牛搗貼臍下，以手摩之，加麝香少許，更妙。簡易方。

小便不通，數而微腫，用陳久筆頭一枚，燒灰水服。外臺祕要。

小便遺牀，麻鞋尖頭二七枚，燒灰，歲朝井華水服之，效。近效方。

小便不通，全蛇蛻一條，燒存性，研，溫酒服之。

小便不通，以水四升，洗甑帶取汁，煮葵子二升半，分三服。聖惠方。

大小便閉，甑帶煮汁，和蒲灰末方寸匕服，日三次。一本蒲灰作蒲黃。千金方。

止小便利，雞腸草一斤，於豆豉汁中煮，和米作羹及粥，頻食之。食醫心鏡。

二便不通，蜂房燒末，酒服二三錢，日二服，不拘大人小兒。子母祕錄。

通小便，用燕屎豆豉各一合，糊丸梧子大，每白湯下三丸，日三服。千金方。

小便不通，桑螵蛸炙黃三十枚，黃芩二兩，水煎，分二服。聖惠方

小便澀痛不通，用蠶蛻紙燒存性，入麝香少許，米飲，每服二錢。博濟方。

老人虛祕，阿膠炒二錢，葱白三根，水煎化，入蜜二匙，溫服。

泉木，取羊包以水蘸，蒲炭火炙熟，空腹食，不過三五度瘥

又方[illegible]

之藥汁至臍，二藥相反而胞自轉矣，小水來如瀉泉，此急救之良法也。

大便祕塞，蜣蜋炒去翅足爲末，熱酒服一錢。聖惠。

大小便祕欲死，土狗推車客各七枚，男用頭，女用身，瓦焙焦爲末，以向南樗皮煎汁飲，一服神效。普濟。

大便祕結，蜜兌法，蜜三合，入猪膽汁兩枚，在內煎如餳，出冷水中捍如指大，長三寸許，納下部，立通。濟生。

大小便閉，經月欲死者，用推車客七箇，男用頭，女用身，土狗七箇，男用身，女用頭，新瓦焙研末，用虎目樹南向皮煎汁調服。只一服卽通，名推車散。本事方。

二便不通，六七月尋牛糞中大蜣蜋十餘枚，線穿陰乾收之。臨時取一箇全者，放淨磚上，四面以炭火烘乾，當腰切斷。如大便不通，用上截，小便不通，用下截，各爲細末，取井華水服之。二便不通，全用。經驗方。

小便轉胞不通，用死蜣蜋三枚燒末，井華水一盞調服。千金方。

小便不通，用大螻蛄二枚，取小體，以水一升漬飲，須臾卽通。葛洪方。

又方。用土狗下截，焙研調服半錢，生研亦可。談埜翁方加車前草同搗汁服。壽域方。

又方。用土狗後截，和麝，搗納臍中，縛定卽通。唐氏經驗方。

又方。用土狗一箇，炙研，入冰片麝香少許，翎管吹入莖內。摘要。

又方。桃皮三升，水五升，煮取一升，頓服。

又方。常煮麻子取汁飲。

又方。常服蜜煎五合。

又方。常服車前子及葉，並良。

又方。擣葵汁生服。

又方。好膠三寸，葱白一把，二味以水四升，煮取一升半，頓服之，即下。

又方。葵子牛酥各一升，猪脂亦得，以水四升，煮葵子取一升，內脂煮一沸，待冷，分作二服。

又方。醬清三升，麻油二升，葱白三寸，合煮令黑，去滓待冷，頓服之。一方不用醬清。

二便不通，猪脂一斤，以水二升，煮三沸，飲汁立通。

大小便不通，葵子二升，硝石二兩，以水五升，煮取二升，分二服。

二便不利，葵子一升，榆皮切一升，以水五升，煮取二升，分三服。

又方。葵子末一升，青竹葉一把，水二升，煮五沸頓服。龍葵根與木通胡荽煎湯服，通利小便。蘇頌。

小便不通，諸藥不效，或轉胞至死危困，此法用之，小便自出而愈。用猪尿胞一箇，底頭出一小眼子，翎筒通過，放在眼兒內，根底以細線紮定翎筒子口，細杖子堵定，上用黃蠟封尿胞口，吹滿氣七分，紮定了，再用手捻定翎筒根頭，放了黃蠟，塞其翎筒，放在小便口裏頭，放開翎筒根頭，手捻其氣透於裏，小便即出，大有神效。寶鑑。

小便不通，炒鹽熱熨小腹，冷復易之。

又方。以蒲黃裹腎，令頭至地，三度即通。

醫部彙考二百六十七

大小便門四

鍼灸

素問曰：刺陰股下三寸內陷，令人遺溺。

靈樞曰：三焦者，足少陽太陰之所將太陽之別也，上踝五寸，別入貫腨腸，出於委陽，並太陽之正，入絡膀胱約下焦，實則閉癃，虛則遺溺，遺溺則補之，閉癃則瀉之。

厥氣走喉而不能言，手足清，大便不利，取足少陰。

厥而腹嚮嚮然，多寒氣，腹中穀穀，便溲難，取足太陰手太陰之別，名曰列缺，起於腕上分間，並太陰之經，直入掌中，散入於魚際，其病實則手銳掌熱，虛則欠㰦，小便遺數，取之去腕半寸，別走陽明也。足少陰之別，名曰大鍾，當踝後遶跟，別走太陽，其別者，并經上走於心包下，外貫腰脊，其病氣逆則煩悶，實則閉癃，虛則腰痛，取之所別也。

小腹痛腫，不得小便，邪在三焦，約取之太陽大絡，視其絡脈，與厥陰小絡結而血者，腫上及胃脘取三里，癃取之陰蹻及三毛上及血絡出血。

氣癃,小便黃,氣滿,虛則遺溺,石門主之。

癃,遺溺,鼠鼷痛,小便難而白,期門主之。

小便難,竅中熱,實則腹皮痛,虛則癢搔,會陰主之。

小腸有熱,溺赤黃,中脘主之。

溺黃,下廉主之。

小便黃赤,完骨主之。

小便黃,腸鳴相逐,上廉主之。

勞癉,小便赤難,前谷主之。

千金方曰:大便難,灸第七椎兩旁各一寸七壯,又灸承筋二穴各三壯,在腨中央陷內。

大便不通,灸俠玉泉相去各二寸,名曰腸遺,隨年壯。又灸大敦四壯,在足大指聚毛中。

大便閉塞,氣結心堅滿,灸石門百壯。

後閉不通,灸足大都,隨年壯。

老人小兒大便失禁,灸兩脚大指,去甲一寸三壯,又灸大指奇間各三壯。

大小便不利,欲作腹痛,灸滎衞四穴百壯。穴在背脊四面各一寸。

腹熱閉時大小便難,腰痛連胷,灸團岡百壯,穴在小腸腧下二寸橫三寸間灸之。

大小便不通,灸臍下一寸三壯,又灸橫文百壯。

大小便不利,灸八窌百壯,穴在腰目下三寸,俠脊相去四寸,兩邊各四穴,計八穴,故名八窌。

大小便不利，治其標，大小便利，治其本。

先大小便不利而後生他病者，治其本也。

中氣不足，溲便爲之變，腸爲之苦鳴，補足外踝不畱之。

甲乙經曰：三焦病者，腹脹氣滿，少腹尤甚，堅不得小便，窘急，溢則爲水，畱則爲脹，候在足太陽之外大絡，絡在太陽少陽之間，亦見於脈，取委中。

少腹滿大，上走胷至心，索索然，身時寒熱，小便不利，取足厥陰。

胞轉不得溺，少腹滿，關元主之。

小便難，水脹滿，出少，胞轉不得溺，曲骨主之。

少腹脹急，小便不利，厥氣上頭巔，漏谷主之。

溺難，痛白濁，卒疝，少腹腫，欬逆嘔吐，卒陰跳，腰痛不可以俛仰，面黑熱，腹中䐜滿，身熱厥痛，行間主之。

少腹中滿，熱閉不能溺，足五里主之。

少腹中滿，小便不利，湧泉主之。

筋急身熱，少腹堅腫，時滿，小便難，尻股寒，髀樞痛，引季脅，內控八窌，委中主之。

陰胞有寒，小便不利，承扶主之。

內閉不得溲，刺足少陰太陽與骶上，以長鍼。氣逆，取其太陰陽明。

三焦約，大小便不通，水道主之。

大便難，中渚及太白主之。

小便不通取陰谷關元八分，令病人[illegible]

小便閉數不通取陰谷一寸五分灸之，陰陵泉瀉之，又法取偏歷。

小便閉不通取陰陵泉陰谷三陰交氣海關元灸三十壯，刺二寸五分，不已，取太溪陰交。

小便數腹痛，取尿胞在玉泉下一寸，屈骨端。

小便多灸命門隨年壯，又取腎俞一分，沿皮向外六分，補六呼，瀉一吸。

小便滑數，灸中極腎腧陰陵泉。不已，取氣海陰谷三陰交。

導引

保生祕要曰：大便不通導引法，以舌頂上齶守鉉雍靜念，而液自生，俟滿口赤龍攪動，頻嗽頻吞，聽降直下丹田，又守靜咽數迴，大腸自潤，行後功效。

運功左手撫臍，用意推旋開五臟向後，落大腸九曲行去，或升腎水，洗潤大腸九曲而通瀉之。以手覆臍，又推開五臟向後，落大腸九曲去，或升腎水，洗浴大腸九曲而瀉之。

尾閭墜氣導引法，咬牙閉氣，聳肩，雙目圓睜，左右轉動，穀道緊撮，如此行之，氣自然升。

運功元氣下陷之證，氣出不臭是也。因閉氣行功，不能轉升故耳，當存歸元法，運週天七日，見效。有用功通尾閭及夾脊雙關之後，不能招攝而墜者，宜用靜功返照，自然升頂，不必執著。

小水遲滯導引法，搓小紙撚入鼻中，俟打噴嚏，小水自通，此治閉塞，若遲塞多搓掌心及湧泉穴，退火安靜，或行運法，效。

運功及小腸證，同治從歸元法，旋運而下，旋至病處，多運數十迴，復遶而上，撤而散之，週而復始，如法漸行，穀道去

小便不利，大便數泄，灸屈骨端五十壯。

小便不利，大便注泄，灸天樞百壯，穴在俠臍相去三寸，魂魄之舍不可鍼，大法在臍旁一寸，合臍相去可三寸也。

遺尿失禁出不自知，灸陰陵泉，隨年壯。

遺溺，灸遺道俠玉泉五寸，又灸陽陵泉，又灸足陽明，各隨年壯。

小便失禁，灸大敦七壯，又灸行間七壯。

尿牀垂兩手兩髀上盡指頭上有陷處灸七壯，又灸臍下橫文七壯。

東垣十書曰：大便閉，背脊椎兩旁相去各一寸，灸三壯，承筋灸三壯，腸繞挾玉泉相去二寸，隨年壯鍼灸。書無此穴。或云非正穴也。

又法：石門寸半，大都五分。

小便熱痛，目赤，尿如血，列缺沿皮一寸，太陵承漿各五分。

又法：曲骨灸二七壯，陰陽二陵泉各二寸五分。

遺溺失禁，陰陵泉陽陵泉二寸半，大敦七壯。

又方：曲骨陰陽二陵泉各二寸半。

醫學綱目曰：大便祕澀，照海五分補二呼，瀉六吸，立通，支溝半寸，瀉三吸。

又法：照海瀉之，立通，太白瀉之，灸亦可。

又法：照海半寸，灸二十壯，瀉之，章門灸二七壯，太白半寸，灸五壯，已上諸穴，看虛實補瀉之。虛結補則通，熱結瀉則

便淡滲之藥。急難措手，乃辭歸。從夜至旦，耿耿不寐，窮究其理，忽記素問有云：『無陽則陰無以生，無陰則陽無以化』。又云：『膀胱者州都之官，津液藏焉，氣化則能出矣。』此病小便癃閉，是無陰而陽氣不化者也。凡利小便之藥，皆淡味滲泄爲陽，止是氣藥，陽中之陰，非北方寒水陰中之陰所化者。此乃奉養太過，膏粱積熱，損北方之陰，腎水不足，故膀胱腎之室久而乾涸，小便不化，火又逆上而爲嘔噦，非隔上所生也。獨爲關，非格病也。潔古老人曰：『熱在下焦，塡塞不便。』是治關格之法。今病者內關外格之病悉具，死在旦夕，但治下焦可愈。隨處以稟北方寒水所化，大苦寒氣味俱陰者，黃蘗知母，桂爲引用，丸如桐子大，沸湯下二百丸。服藥少時，須臾前陰如刀刺火燒之痛，溺出如瀑泉湧出，臥具皆濕，牀下成流，顧盼之間，腫脹消散。予驚喜曰：『大哉聖人之言！豈可不遍覽而執一者也！其證小便閉塞而不渴，時見躁者是也。凡諸病居下焦，皆不渴也。二者之病，在氣在血，最易分別。』

丹溪心法曰：楊淯三哥大便祕濇，小便如常，咽塞不通，食下便有痰出，脈濇，左右手同，此血虛腸燥，爲脾約病，甚者人參散主之。

一婦人脾痛後，患大小便不通，此是痰隔中焦，氣滯於下焦，以二陳湯加木通，初喫後煎柤吞之。

呂仲年六十六歲，病傷寒得汗，熱退後，脈尚洪，此洪脈作虛脈論，與人參黃芪白朮炙甘草當歸芍藥陳皮數日，其脈仍大，未收斂。又小便不通，小腹下妨悶，頗爲所苦，但仰臥則點滴而出。予曰：『補藥服之未至。』前藥倍加黃芪人參大劑，與服兩日，小便方利。

一男子病小便不通，醫用通利藥而反劇，丹溪曰：『此積痰也。痰積在肺，肺爲上焦，膀胱爲下焦，上焦閉則下焦塞，譬如滴水之器，必上竅通而後下竅之水出焉。』乃以吐法大吐之，吐已病如失。然此可見癃淋又不獨主於經病也。

濁，提囘守靜。

溺管泄氣導引法，用指按坎穴，搓運二十四下，意從靈物頂上吸氣一口，轉河車週天一九數歸元，又提行三九而吐納，兼用運功效。

運功此證感於坐功之人，當凝想氣海半晌後，默運旋轉動中，又靜念念不忘，其氣自收。

歸元訣行之之法，提意出上，斡旋造化，從左而右，先運臍輪，收而放，放而復收，以還本位，不離這箇念自歸眞矣。

醫案

儒門事親曰：戴人過曹南省親，有姨表兄病大便燥澀，無他證，常不敢飽食，飽則大便極難，結實如鐵石，或三五日一如圊，目前星飛，鼻中血出，肛門連廣腸痛，痛極則發昏，服藥則病轉劇烈，巴豆芫花甘遂之類皆用之，過多則困，瀉止則復燥，如此數年，遂畏藥性暴急，不服，但卧病待盡。戴人過，診其兩手脈息，俱滑實有力，以大承氣湯下之，繼服神功丸麻仁丸等藥，使食菠薐葵菜及猪羊血作羹，百餘日充肥，親知見駭之。嗚呼！粗工不知燥分四種，燥於外則皮膚皺揭，燥於中則精血枯涸，燥於上則咽鼻焦乾，燥於下則便溺結閉，夫燥之爲病，是陽明化也，水液寒少，故如此，然可下之，當擇之藥。如巴豆可以下寒，甘遂芫花可以下濕，大黃朴硝可以下燥，內經曰：『辛以潤之，鹹以耎之，』周禮曰：『以滑養竅。』

頃有老人年八十歲，臟腑澀滯，數日不便，每臨後時，目前星飛，頭目昏眩，鼻塞腰痛，積漸始減，縱得食，便結燥如彈。一日，友人命食血臟葵羹油渫菠薐菜，遂頓食之，日日不乏，前後皆利，食進神清，年九十歲無疾而終。圖經云：『菠薐寒，利腸胃，芝蔴油炒而食之，利大便，葵寬腸利小溲，年老之人大小便不利，最爲急切，此亦偶得瀉法耳。』

爛水，使不助其腎氣，大作湯劑，令直達於下而急行也。兩服減半，旬日良愈。

醫學正傳曰：本邑趙德秀才之母，年五十餘，身材瘦小，得大便燥結不通，飲食少進，小腹作痛，召予診治，六脈皆沉伏而結澀。予作血虛治，用四物湯加桃仁、麻仁、煨大黃等藥，數服不通，反加滿悶。與東垣枳實導滯丸及備急大黃丸等藥，下咽片時即吐出，蓋胃氣虛而不能久隔性速之藥耳。遂以備急大黃丸外以黃蠟包之，又以細鍼穿一竅，令服三丸，蓋以蠟匱者，制其不犯胃氣，故得出幽門，達大小腸取效也。明日下燥屎一升許。繼以四物湯加減作湯，使吞潤腸丸。如此調理月餘，得大便如常，飲食進而平安。

予族孫因出痘，大便閉結，自病至痘瘡愈後，不如廁者凡二十五日，肛門連大腸不勝其痛，叫號聲達四鄰。外醫及予二三人議用皂角末及煎蜜導法，服以大小承氣湯及枳實導滯丸、備急丸，皆不效。計無所出，予曰：『此痘瘡餘毒，鬱熱結滯於大小腸之間而然。』以香油一大盞令飲，自朝至暮亦不效。予畫一計，令侍婢口含香油，以小筒一箇套入肛門，以油吹入肛內，過半時許，病者自云其油入腸內，如蚯蚓漸漸上行，再過片時許，下黑糞一二升，止，困眠而安。

修德翁年七十，秋間患小便不通，二十餘日，百方不效。後得一方，取地膚草搗自然汁服之，遂通。至微之物，而有迴生起死之功，故錄以爲濟利之一助云。

醫學綱目曰：鄰家有一男子，小便日數十次，如稠米泔色，心神恍惚，瘦瘁食減，令服桑螵蛸散，未終一劑而安。此藥能安神魂，定心志，治健忘、小便數，補心氣。用桑螵蛸、遠志、菖蒲、龍骨、人參、茯苓、當歸、鼈甲酢炙各一兩，爲末，以人參湯調下二錢。

醫宗必讀曰：少宰蔣恬庵服五加皮酒，遂患大便祕結，四日，腹中脹悶，服大黃一錢，通後復結，余曰：「腎氣衰少，津

馬希聖年五十餘，性嗜酒，常痛飲，糟粕出前竅，便溺出後竅，六脈皆沉濇，與四物湯加海金沙，木香檳榔木通桃仁，服而愈。此人酒多而肆氣，酒升而不降，陽極虛，酒濕積久生熱，煎熬血乾，陰亦大虛。陰陽偏虛，皆可補接，此人中年後陰陽俱虛時，暫可活者，以其形實，酒中穀氣尚在。三月後，其人必死，後果然。

一人年四十，口乾溺數，春末得之，夏求治，脈俱濇，右略數而不弦，重取似大而稍有力，左稍沉，略弱而不強，然濇却多於右，喜二尺皆不甚起，當作飲食厚味生熱，此謂之痰熱，禁其厚味，降火以清金，抑肝而補脾，三補丸二十一粒，元明粉五粒，阿膠五粒，薑湯吞下，一日六次。又以四物湯加參朮陳皮生甘草五味麥門冬煎服，一日三次，與丸藥間服之，一二日，自覺清快，小便減三之二，口不乾，止渴未消，頭運眼花，久坐則腰疼，遂以摩腰丹治腰痛，仍以四物減川芎加參芪白朮牛膝五味炒蘗麥門冬，煎調六一散，反覺便多，遂去六一散，仍服丸藥。

一婦轉胞，小便閉，脈似澁，重取則弦，左稍和，此得之憂患，澁爲血少氣多，弦爲有飲，血少則胞不舉，氣多有飲，中焦不清而溢，則胞知所避而就下，故墜，以四物湯加參朮半夏陳皮甘草生薑，空心飲，隨以指探吐之，俟氣定，又與至八貼而安。此恐偶中，後又治數人，皆效。

一老人患小便不利，因服分利之藥太過，遂致閉塞，點滴不出。予以其胃氣下陷，用補中益氣湯，一服而通。因先多用利藥，損其腎氣，遂致通後遺尿，一夜不止，急補其腎，然後已。

衛生寶鑑曰：中書右丞合刺合孫病小便數而欠，日夜約去二十餘行，臍腹脹滿，腰脚沉重，不得安臥，至元癸未季春下旬，予奉聖旨治之，遂往診視，脈得沉緩，時時帶數，嘗記小便不利者有三，不可一概而論。若津液偏滲於腸胃，大便泄瀉而小便澁少，一也，宜分利而已；若熱搏下焦，津液則熱澁而不行，二也，必滲泄則愈；若脾胃氣澁，不能通利水道，下輸膀胱而化者，三也，可順氣令施化而出也。今右丞平居膏粱，濕熱內畜，不得施化，膀胱竅澁，是以起數

都憲孟有涯氣短痰運，服辛香之劑，痰甚遺尿，兩尺浮大，按之如無，余以爲腎家不能納氣歸源，香燥致甚耳，用八味丸料三劑而愈。

一老儒有風熱，飲食如常，大便十七日不通，肚腹不脹，兩尺脈洪大而虛，此陰火內爍津液，用六味丸二十餘劑，至三十二日始欲去，用猪膽潤而通利。

一婦人年七十有三，痰喘內熱，大便不通，兩月不寐，脈洪大，重按細微，此屬肝肺腎虧損，朝用六味丸，夕用逍遙散，各三十餘劑，計所進飲食百餘椀，腹始痞悶，乃以猪膽汁導而通之，用十全大補調理而安。若間前藥，飲食不進，諸證復作。

一男子年五十餘，因怒少食，大便不利，服潤腸丸，大便閉結，胷脅作痛，欲兼服脾約丸，肝脾腎脈浮而濇，余曰：「此足三陰精血虧損之證也。」東垣先生云：「若人胃強脾弱，約束津液不得四布，但輸膀胱，小便數而大便難者，用脾約丸。若人陰血枯槁，內火燔爍，肺金受邪，土受木傷，脾肺失傳，大便閉而小便數者，用潤腸丸。」今滋其化源，則大便自調矣。如法果驗。

一儒者，懷抱鬱結，復因場屋不遂，發熱作渴，胷膈不利，飲食少思，服淸熱化痰行氣等劑，前證益甚，肢體倦怠，心脾二脈濇滯，此鬱結傷脾之變證也。遂用加味歸脾湯，飲食漸進，諸證漸退，但大便尙濇，兩顴赤色，此肝腎虛火，內傷陰血，用八珍湯加蓯蓉麥冬五味，至三十餘劑，大便自潤。

一男子所患同前，不信余言，服大黃等藥，泄瀉便血，遍身黑黯，復求治。余視之曰：「此陰陽二絡俱傷也。陽絡傷則血外溢，陰絡傷則血內溢，」辭不治，後果然。

職方陳莪齋年踰六旬，先因大便不通，服內疏等劑，後飲食少思，胷腹作脹，兩脅作痛，形體倦怠，兩尺浮大，左關短

液不充，誤行疎利，是助其燥。』以六味丸料煎成，加人乳一鍾，白蜜五錢，三劑卽通，十日而康復。

文學顧以貞素有風疾，大便祕結，經年不愈，始來求治，余曰：『此名風祕，治風須治血，乃大法也。』用十全大補湯，加秦艽麻仁杏仁防風煨皂角仁，半月而效，三月以後，永不復患，以手書謝曰：『不肖道力僻處窮鄉，日與庸人爲伍。一旦攖非常之疾，困苦經年，靡劑不嘗，反深沉痼，遂就治神良，乍聆指教，肺腑快然。及飲佳方，百日以來，沉疴頓釋，今日幸生歸矣。凡仰事俯育，儔非意外之慶，則儔非台翁之賜哉？全家額手尸祝湛恩，乞附名案尾，以誌感忱，幸甚！』

方伯張七澤夫人，患飲食不進，小便不禁。余曰：『六脈沉遲，水泉不藏，是無火也。』投以八味丸料，兼進六君子，加益智肉桂，二劑減，數劑安。

文學俞元倩憂憤經旬，忽然小便不禁，醫皆以固脬補腎之劑投之，凡一月而轉甚，余謂之曰：『六脈舉之則軟，按之則堅，此腎肝之陰有伏熱也。』用牡丹皮白茯苓各二錢，苦參八分，甘草梢六分，黃連一錢，煎成，調黃雞腸與服六劑而安矣。有吳門醫者云：『旣愈當大補之。』數月後，仍復不禁，再來求治，余曰：『肝家素有鬱熱，得溫補而轉熾。』遂以龍膽瀉肝湯加黃雞腸服之，四劑卽止。以四君子加黃連山梔，一月而痊。

郡守王鏡如痰火喘嗽正甚時，忽然小便不通，自服車前木通茯苓澤瀉等藥，小腹脹閉，點滴不通。余曰：『右寸數大，是金燥不能生水之故。惟用紫菀五錢，麥冬三錢，五味十粒，人參二錢。』一劑而小便湧出如泉。若淡滲之藥愈多，則反致燥急之苦，不可不察也。

先兄念山謫官浙江按察，鬱怒之餘，又當盛夏，小便不通，氣高而喘，以自知醫，服胃苓湯四貼，不效。余曰：『六脈見結，此氣滯也。』但用枳殼八錢，生薑五片，急火煎服，一劑稍通，四劑霍然矣。

不可忍，臥少頃，下血塊如拳者數枚，小便如黑豆汁一二升，痛止得愈，此藥猛峻，氣虛血弱者，宜斟酌之。

醫方考曰：宋季饒醫熊彥誠年五十五歲，病前後便溺不通，五日腹脹如鼓，同輩環視，皆不能措力。與西湖妙果僧慧月相善，遣信邀至訣別。月驚馳而往，於釣橋逢一異客，揖之曰：『方外高人，何孑孑走趨若是？』月曰：『一善友久患祕結，病危急，欲往問。』客曰：『易事耳。待奉施一藥。』即脫靴入水，探一大螺而出，曰：『事濟矣，抵家，以鹽半匙，和殼生擣，置病者臍下一寸三分，用寬帛緊繫之，仍辦溺器以須其通。』月未以為然，姑巽謝之。至熊家，彥誠昏不知人，妻子聚泣，知諸醫無他策，慢使試之，曾未安席而暴下。諸醫愧歎而散。月歸訪異人，無所見矣。熊後十六年乃終。崑謂便溺不通者，熱祕之也，大螺性寒而善分清，散濁水之中，一著大螺，便能澄澈，劑之以鹽，取其善潤而已。

寓意草曰：姜宜人得奇證，簡本草經疏治交腸用五苓散之說，以為神祕。余見之，辨曰：『交腸一證，大小二便易位而出，若交易然。古用五苓治之，專為通前陰而設也。若此證閉在後陰，二便俱從前陰而出，擬之交腸，誠有似是實非者。況交腸乃暴病，驟然而氣亂於中，此證乃久病，以漸而血枯於內，有毫釐千里之不同，安得擬之？原夫疾之所始，始於憂思結而傷脾。脾統血者也，脾傷則不能統攝而錯出下行，有若崩漏，實名脫營。脫營病宜大補急固，迺悞認為崩漏，以涼血清火為治，則脫出轉多，不思天癸已盡，潮汛已絕，萬無是病，其年高氣弱，無血以實漏卮者，毫不念也。於是胞門子戶之血，日漸消亡，勢不得不借資而仰給矣。借資於大腸，轉將大腸之血，運輸而滲入胞囊，久之大腸之血亦盡，而大腸之氣附血而行者，孤而無主，為拳為塊，奔騰渙散，與林木池魚之殃禍同矣。又如救荒者，剝鄰國為立盡之墟所不顧矣，猶未也。仰給於胃脘，轉將胃脘之血，吸引而滲入胞囊，久之胃脘之血亦盡，下脫之血，始無源自止。夫胃脘之血，所以榮週身而灌百脈者，今迺暗歸烏有，則苞稂失潤而黍離，足憂血盡而止，較之血存而脫又倍遠矣。故血盡然後氣亂，氣亂然後水穀舍故趨新，舍寬趨隘，江漢兩渠，併歸一路，身中為之大亂，勢必大

濇，右關弦濇。』時五月請治，余意乃命門火衰，不能生脾土，而肺金又剋肝木，憂其金旺之際不起。後果然。

劉天錫內有濕熱，大便滑利，小便澀滯，服淡滲劑愈加滴瀝，小腹腿膝皆腫，兩眼脹痛，此腎虛熱在下焦，服淡滲導損陽氣，則陰無以化，遂用地黃滋腎二丸，小便如故，更以補中益氣，加麥門五味兼服而愈。

一富商飲食起居失宜，大便乾結，常服潤腸等丸，後胸腹不利，飲食不甘，口乾體倦，發熱吐痰，服二陳黃連之類，前證益盛，小便滴瀝，大便泄瀉，腹脹少食，服五苓瞿麥之類，小便不通，體腫喘嗽，用金匱腎氣丸，補中益氣湯而愈

大司徒許函谷在南銀臺時，因勞發熱，小便自遺，或時不利，余作肝火陰挺不能約制，午前用補中益氣，加山藥黃蘗知母，午後服地黃丸，月餘全安。

司徒邊華泉小便頻數，濇滯短赤，口乾唾痰，此腎經陽虛熱躁，陰無以化，用六味滋腎二丸而愈。

考功楊樸菴口舌乾燥，小便頻數，此膀胱陽燥陰虛，先用滋腎丸以補陰，而小便愈，再用補中益氣，六味地黃以補肺腎而安

一儒者發熱無時，飲水不絕，登廁則小便濇痛，大便牽痛，此精竭所致，用六味丸加五味，又補中益氣，喜其謹守得愈。若肢體畏寒，喜熱飲食，用八味丸

劉大參年踰六旬，形氣瘦弱，小便不禁或頻數，內熱口乾，或欬痰喘運，余以爲肺腎氣虛，用六味丸益氣湯以滋化源。彼不信，反服補陰降火澀精之劑，陰竅作痛，或小便不利，仍服前藥，不兩月而愈

證治準繩曰：甲午秋治一婦人，年五十，初患小便澀，醫以八正散等劑，展轉小便不通，身如芒刺加於體。予以所感霖淫雨濕，邪尚在表，因用蒼朮爲君，附子佐之，發其表，一服即汗，小便即時便通。

司參政之年八旬，初患小便短濇，因服藥分利太過，遂致閉塞，涓滴不出，予以飲食太過，傷其胃氣，陷於下焦。用補

醫部彙考二百六十八

淋濁遺精門一

黃帝素問

㊀六元正紀大論

陽明司天之政，初之氣小便黃赤，甚則淋。

註 陰凝於外，則陽鬱於內，故民病便赤及淋等證。

㊁生氣通天論

陰者藏精而起亟者也，陽者衞外而爲固者也，風客淫氣，精乃亡，邪傷肝也。

註 風爲陽邪，客於膚表，則淫傷於氣矣。陽氣傷則陰寒，精自出矣。風木之邪，內通肝氣，肝主藏血，肝氣受邪，則傷其血矣。

靈樞經

㊀本神篇

腸之故道復通，乃可撥亂返治，與五苓一方，全無干涉。又況水穀繇胃入腸，另有幽門，泌別清濁，今以滲血之故，釀爲穀道，是幽門關爲坦徑矣。尚可用五苓再關之乎？又況五苓之劫陰，爲亡血家所深戒乎？今之見一病，輒有一藥橫於胷中，與夫執成方奉爲靈祕者，大率皆悞人者也。若宜人之病，余三指纔下，便問曰：『病中多哭泣否？』婢媪曰：『時時泣下。』乃知臟燥者，多泣，大腸方廢而不用也。交腸云乎哉？今大腸之脈，纍纍而現於指，可虞之時，其來春棗葉生乎？棗葉生而言果驗。

諸淋者[illegible]

或因迷寵而眞髓多輸或驚惶不定或憂思不寧，或饑飽過時，或奔馳不定或隱忍大小便或寒入膀胱或發泄久興，或暑中胞囊傷茲不遵愼致起斯疾，狀候變異，名亦不同，則有冷、熱、氣、勞、膏、砂、虛、實之八種耳。冷者小便數而色白如泔。熱者小便澀而赤色如血。氣者臍腹滿悶小便不通利而痛。勞者小便淋瀝不絕如水滴漏而不斷絕。膏者小便中出物如脂膏。砂者臍腹隱痛，小便難，其痛不可忍，須臾如小便中下如砂石之類有大如皂角子，或赤或白，色澤不定。此因腎氣弱，貪於女色閉而不泄，泄而不止，虛傷眞氣，邪熱漸深，結聚成砂。又如水煮鹽，火大水少，鹽漸成石之類。蓋腎者水也鹹歸於腎，鹹積於腎，水畱於下，虛熱日甚煎結而生，又非一時之作也。蓋遠火乃痊，或五歲敗，即三年壯人五載禍必來，宜乎急攻。八淋之中，惟此最爲危矣，其脈盛大而實者可治，虛小而澁者不可治。虛者腎與膀胱俱虛，精滑夢泄小便不禁者也。實者謂經絡閉塞，水道不利，莖痛腿酸者也。又諸淋之病，與脈相從者活，反者死。治療之法亦在詳酌耳。

晉王叔和脈訣

㊀遺精淋病脈

腎脈歌曰：實滑小便澀淋痛澀騂騂。

脈濇精頻漏，恍惚夢魂多。

芤脈歌曰：指下尋之中且虛，邪風透入小腸居，病時淋瀝兼疼痛，大作湯圓必自除。

尺部見芤虛在腎，小便遺瀝血凝膿。

恐懼而不解，則傷精，精傷則骨痠痿厥，精時自下。是故五臟主藏精者也，不可傷，傷則失守而陰虛，陰虛則無氣，無氣則死矣。

註 恐傷腎，故恐懼不解，則傷腎臟之精。腎主骨，故精傷則骨痠痿厥。精時自下者，臟氣傷而不能藏也。神氣生於精，故五臟之精不可傷，傷則失守而陰虛，陰虛則神氣絕而死矣。

漢張機金匱要略

(一)淋

五臟篇曰：熱在上焦者，因欬為肺痿，熱在中焦者則為堅，熱在下焦者則尿血，亦令淋祕不通。

淋病篇曰：淋之為病，小便如粟狀，小腹弦急，痛引臍中。

淋家不可發汗，發汗則必便血。

(二)失精

血痹篇曰：勞之為病，其脈浮大，手足煩，春夏劇，秋冬瘥，陰寒精自出，酸削不能行。

男子脈浮弱而濇，為無子，精氣清冷。

夫失精家少腹弦急，陰頭寒，目眩，髮落，脈極虛芤遲，為清穀亡血失精。脈得諸芤動微緊，男子失精，女子夢交，桂枝龍骨牡蠣湯主之。

脈弦而大，弦則為減，大則為芤，減則為寒，芤則為虛，虛寒相搏，此名為革。婦人則半產漏下，男人則亡血失精。

虛勞裏急，悸衄，腹中痛，夢失精，四肢痠疼，手足煩熱，咽乾口燥，小建中湯主之。

不知此皆利小便之要藥[illegible]
愈也。

㈡小便渾濁

小便渾濁，天氣熱則水渾濁，寒則淸潔，水體淸而火體濁故也。又如淸水爲湯，則自然濁也。

㈢虛勞爲白淫

思想無窮，所願不得，意淫於外，入房太甚，筋縱發爲筋痿，及爲白淫太過者，白物爲淫隨溲而下，故爲勞弱，祕眞丸主之。

元李杲十書

㈠小便淋閉論

難經云：病有關有格，關則不得小便。又云：關無出之謂，皆邪熱爲病也，分在氣在血而治之，以渴與不渴而辯之。如渴而小便不利者，是熱在上焦肺之分，故渴而小便不利也。夫小便者，是足太陽膀胱經所主也，長生於申，申者西方金也，肺合生水，若肺中有熱，不能生水，是絕其水之源。經云：虛則補其母，宜淸肺而滋其化源也，故當從肺之分，助其秋令，水自生焉。又如雨如露如霜，皆從天而降下也，乃陽中之陰，明秋氣自天而降下也。且藥有氣之薄者，乃陽中之陰，是感秋淸肅殺之氣而生，可以補肺之不足，淡味滲泄之藥是也。茯苓、澤瀉、琥珀、燈心、通草、車前子、木通、瞿麥、篇蓄之類，以淸肺之氣，泄其火，資水之上源也。如不渴而小便不通者，熱在下焦血分，故不渴而大燥，小便不通也。熱閉於下焦者，腎與膀胱也，乃陰中之陰，陰受熱邪，閉塞其上流，易老云：寒在胷中，遏絕不入，熱在下焦，塡塞不便，須用感北方寒水之化，氣味俱陰之藥，以除其熱，泄其閉塞。內經云：無陽則陰無以生，無陰則陽無以化，若服

唐孫思邈千金方

㊀淋閉

熱結中焦，則爲堅；下焦則爲溺血，令人淋閉不通，此多是虛損人服大散，下焦客熱所爲，亦有自然下焦熱者，但自少可善候之。凡氣淋之爲病，溺難澀，常有餘瀝。石淋之爲病，莖中痛，溺不得卒出。膏淋之爲病，尿似膏自出。勞淋之爲病，勞倦卽痛，引氣衝下。熱淋之爲病，熱卽發，甚則尿血，治之皆與氣淋同。

金劉完素六書

㊀淋

淋，是小便澀痛，乃熱客膀胱，鬱結不能滲泄故也。或曰：小便澀而不通者爲熱，遺尿不禁者爲冷，豈知熱甚客於腎部，干於足厥陰之經，廷孔鬱結極甚，而氣血不能宣通，則痿痺而神無所用，故液滲入膀胱，而溲溺遺失，不能收禁。經曰：目得血而能視，耳得血而能聽，手得血而能攝，掌得血而能握，足得血而能步，臟得血而能液，腑得血而能氣。夫血隨氣運，氣血宣行，則其中神自清利，而應機能爲用矣。又曰：血氣者，人之神，不可不謹養也。故諸所運用時習之，則氣血通利，而能爲用；閉壅之，則氣血行微，而其道不通利，故劣弱也。若病熱極甚，則鬱結而氣血不能宣通，神無所用，而不遂其機，隨其鬱結之微甚，是故目鬱則不能視色，耳鬱則不能聽聲，鼻鬱則不能聞香臭，舌鬱則不能知味，至如筋痿骨痺，諸所出不能爲用，皆熱甚鬱結之所致也。故仲景論少陰病熱極，曰溲便遺失，狂言，目反直視者，腎先絕也。

[illegible]

血淋一證，須看血色分冷熱，色鮮者心小腸實熱，色瘀者腎膀胱虛冷，若的是冷淋及下元虛冷血色瘀者，並宜漢椒根剉碎，不以多少，白水煎，候冷服。

若熱極成淋，服藥不效者，宜減桂五苓散，加木通、滑石、燈心、瞿麥各少許，蜜水調下。

諸淋皆屬於熱，余每用黃蘗滋腎丸，每百丸用四物湯加甘草梢、杜牛膝、木通、桃仁、滑石、木香煎湯，空心吞服，兼灸三陰交，如鼓應桴，累試累效者。

㈡赤白濁

濁主濕熱，有痰有虛，赤屬血，白屬氣，痢帶同治。

寒則堅凝，熱則流通。

大率皆是濕痰流注，宜燥中宮之濕，用二陳加蒼朮、白朮，燥去其濕。赤者乃是濕傷血也，加白芍藥，仍用珍珠粉丸，加臭椿根、白皮、滑石、青黛作丸藥。

虛勞用補陰藥，大概不宜熱一作涼藥。

肥白人必多痰，以二陳湯去其濕熱。

胃弱兼用人參，以柴胡升麻升其胃中之氣，丸藥用黃蘗炒褐色、乾薑炒微黑、滑石、蛤粉、青黛，糊丸服。

胃中濁氣下流，為赤白濁，用二陳加柴胡、升麻、蒼朮、白朮，丸藥用樗皮末、蛤粉炒、乾薑炒、黃蘗，胃中濁氣下流，滲入膀胱，青黛、蛤粉，肝脈弦者，用青黛以瀉肝。又方用炒黃蘗一兩、生蘗一兩、滑石三兩、神麯半兩，為末，滴水丸。

燥濕痰，南星、半夏、蛤粉、青黛為末，神麯糊丸，青黛為衣。

有熱者，青黛、滑石、黃蘗之類水丸。

淡滲之藥，其性乃陽中之陰，非純陽之劑，陽無以化，何能補重陰之不足也？須用感地之水運而生太苦之味，感天之寒藥而生大寒之氣，此氣味俱陰，乃陰中之陰也。大寒之氣人稟之生膀胱，寒水之運人感之生腎，此藥能補腎與膀胱，受陽中之陽熱火之邪而閉其下焦，使小便不通也。夫用大苦寒之藥，治法當寒因熱用，又云必伏其所主而先其所因，其始則氣同，其終則氣異也。

朱震亨心法

㈠淋

淋有五，皆屬乎熱，解熱利小便，山梔子之類，山梔子去皮一合，白湯送下。

淋者，小便淋瀝，欲去不去，不去又來，皆屬於熱也。

諸淋所發，皆腎虛而膀胱生熱也，水火不交，心腎氣鬱，遂使陰陽乖舛，清濁相干，蓄在下焦，故膀胱裏急，膏、血、砂石從小便道出焉。於是有欲出不出，淋瀝不斷之狀，甚者窒塞其間，則令人悶絕矣。大凡小腸有氣，則小便脹，小腸有血，則小便澀，小腸有熱，則小便痛，痛者為血淋，不痛者為尿血，敗精結者為沙，精結散者為膏，金石結者為石，小便澀常有餘瀝者為氣，揣本揆原，各從其類也。執劑之法，並用流行滯氣，疏利小便，清解邪熱，其於調平心火，又三者之綱領焉。心清則小便自利，心平則血不妄行，最不可用補氣之藥，氣得補而愈脹，血得補而愈澀，熱得補而愈盛，水竇不行，加之穀道閉遏，未見其有能生者也。雖然腎氣虛弱，囊中受寒，亦有挾冷而小便淋澀，其狀先寒戰而後溲便，蓋冷氣與正氣交爭，冷氣盛則寒戰而成淋，正氣盛則寒戰解而得便溺也。又有胞系轉戾之不通者，是不可不辯。胞轉證臍下急痛，小便不通，凡強忍小便，或尿急疾走，或飽食忍尿，飽食走馬，忍尿入房，使水氣上逆，氣迫於

色，下元虛憊，[illegible]不交，腎氣不溫，津道閉塞，或出汗太過，或失血太多，津道欲枯竭，皆成勞淋。五者得名而不及熱與冷，何哉，蓋五者皆有冷有熱，血有熱血、有瘀血，氣有熱氣、有冷氣，勞有虛冷有虛熱，若與湯藥過差，精不由其道，妄行不禁，與溺俱出，此乃熱劑之傷，未可概以為冷也。

治法除的然虛冷之外，其餘諸證，若用本題藥不效，便宜施以調氣之劑。蓋津道之逆順，皆一氣之通塞為之。如木香流氣飲，却為的當，其中自有木通、麥冬、腹皮輩。此如不效，但宜投以益血之方，蓋小便者血之餘也，血既充滿，則滋腴下潤，自然流通，如火府丹却為的當，其中有地黃輩。然此非特言血淋、氣淋，一應淋皆可用，獨不可用之虛冷耳。淋病小便之色，多是見赤，未可便以赤為熱，氣道蘊結故如此爾。

有淋病下諸通便劑愈不通，用木香流氣飲，或別用通氣香劑纔愈者，此乃氣淋，出於冷熱淋之外。

有似淋非淋，小便如米泔，或有如鼻涕之狀，此乃精尿俱出，精塞竅道，故便欲出不能而痛，宜大菟絲子丸，鹿茸丸之類，然此即膏淋，謂其非淋亦不可。

血淋一證，須看血分冷熱，色鮮者心小腸實熱，色瘀者腎膀胱虛冷。若的是冷淋及下元虛冷，血色瘀者，並宜漢椒根剉碎，不拘多少，白水煎，候冷服。

小便澀痛常急，欲溺及去點滴，莖中痛不可忍者，此五淋病，生料五苓散加阿膠七分，或五苓散加車前子末少許，或五苓散和益元散等分，或五苓散並可吞火府丹，佐以導赤散

若熱極成淋，服藥不效者，宜減桂五苓散，加木通、滑石、燈心、瞿麥各少許，仍令其研麥門冬、草連根、車前草、白龍草，蜜水調下。

若淋瀝有血者，宜加味五苓散，或生料五苓散和五淋飲，或導赤散，仍研地錦草水解服。進冷劑愈甚者，此是冷淋，

人之五臟六腑，俱各有精，然腎爲藏精之腑，而聽命於心，貴乎水火升降，精氣內持，若調攝失宜，思慮不節，嗜慾過度，水火不交，精元失守，由是而爲赤白濁之患。赤濁是心虛有熱，因思慮得之。白濁腎虛有寒，過於淫慾而得之。其狀漩白如油，光彩不定，漩脚澄下，凝如膏糊。治法：赤者當淸心調氣，白者溫補下元。又當淸上，使水火旣濟，陰陽協和，精氣自固矣。

二陳湯治濁，能使大便潤而小便長。

濁氣只是濕痰，又有白濁人服元兔丹不愈，服附子八味丸即愈者，不可不知。亦有小便如常，停久纔方漩濁者。

㊂夢遺

夢遺一證，專主乎熱，與帶下脫精同。治法用青黛、海石、黃蘗。內傷氣血虛不能固守，常服八物湯，加服吞樗樹根丸。

思想成病，其病在心，安神丸帶補藥。

熱則流通，宜用知母、黃蘗、蛤粉、青黛爲丸服。蓋精滑專主濕熱，黃蘗、知母降火，牡蠣粉、蛤粉尿濕故也。然得病之因有四：有用心過度，心不攝腎，以致失精者；有因思色慾不遂，精乃失位，輸精而出者；有慾太過滑泄不禁者；有年高氣盛，久無色欲，精氣滿泄者；然其狀不一，或小便後出多不可禁者，或不小便而自出，或莖中出而癢痛，常如欲小便者；並宜先服辰砂妙香散，或威喜丸，或分淸飮，別以綿裹龍骨同煎。又或分淸飮半貼，加五倍子、牡蠣粉、白茯苓、五味子各半錢，煎服。

夢遺俗謂之夜夢鬼交，宜溫膽湯去竹茹，加人參、遠志、蓮肉、酸棗仁、炒茯神各半錢。

明戴思恭證治要訣

以鹿茸丸，山藥丸，大菟絲子丸，固陽丸之類。審是壯盛滿溢者，本事方清心丸，仍服黃芪六一湯，便雖非對緣精髓滿溢，姑以此燥之。

遺瀝比之遺精稍少，小便有數點稠粘，莖頭微痛，或小便已停止時，方有一二滴沾褪，其病不出前所因，宜審用前藥。

夢遺俗謂之夜夢鬼交，宜溫膽湯去竹茹，加人參、遠志、蓮肉、棗仁、茯神各半錢，呑玉華白丹並固陽丸。

夢遺亦備前四證，宜審其所感用前藥。

治小便汼桿甘瘡，用腦子二錢半，雁爪黃連一錢半，蘆甘石一錢，葱頭七箇，陳荷葉一片，花椒一撮，先以葱頭、荷葉、花椒煎湯二椀，待溫時留瓶內浸洗，小便乾淨，將前蘆甘石用火煅紅，於煎黃連水內浸濕，又燒又浸，燒烊爲度，安於冷地上，以椀蓋之，候冷研末，入腦子和勻，將前湯洗淨用藥，不過二三度卽愈。

樓英醫學綱目

㈠遺精

白淫夢遺，先賢治法有五：其一、古法用辰砂、磁石、龍骨之類，鎭墜神之浮游是也。其二、思想結成痰飲，迷於心竅而遺者，許學士用猪苓丸之類，導引其痰是也。其三、思想傷陰者，潔古珍珠粉丸，用蛤粉、黃蘗，降火補陰是也。其四、思想傷陽者，謙甫鹿茸、蓯蓉、菟絲子等補陽是也。其五、陰陽俱虛者，丹溪治一形瘦人便濁夢遺，作心虛治，用珍珠粉丸、定志丸服之；定志丸者，遠志、菖蒲、茯苓、人參

宜地髓湯下附子八味丸。有因服五苓散等藥不效者，用生料鹿茸丸却愈，此證病於下元虛冷之故。

有小便艱澀如淋，不痛而癢者，此亦屬虛，宜八味丸、生料鹿茸丸之類。若因思慮用心過度，致淋，辰砂妙香散、吞威喜丸，或妙香散和五苓散。

㈡白濁

有白濁人服元兔丹不愈，服附子八味丸卽愈者，不可不知。

有小便如常，停久纔方淀濁，有小便出卽如泔，若小兒疳病者，並宜分清飲加白茯苓半錢。

如服藥未效，宜四七湯、吞青州白丸子及辰砂妙香散，吞元兔丹及小菟絲子丸，山藥丸。如白濁甚下淀如泥，或稠粘如膠，頻逆而澀痛異常，此非是熱淋，此是精濁窒塞竅道而結，宜五苓妙香散，吞八味丸、小菟絲子丸。精者血之所化，有濁去太多，精化不及，赤未變白，故成赤濁，此虛之甚也。何以知之？有人天癸未至，強力好色，所泄半精半血。

若溺不赤，無他熱證，縱雖赤濁，不可以赤爲熱，只宜以治白濁施之。

若溺赤，下濁亦赤，口渴時發熱者，辰砂妙香散，吞靈砂丹，或清心蓮子飲。發熱不退，口燥舌乾之甚者，此乃精虧內燥，腎枯不潤，四物湯吞元兔丹，和八味丸，久服乃效。

㈢遺精

遺精得之有四：有用心過度，心不攝腎，以致失精者；有因思色欲不遂，精已失位，輸瀉而出者；有欲太過，滑泄不禁者；有年壯氣盛，久無色欲，精氣滿泄者。然其狀不一，或小便後去多不可禁者，或不小便而自出，或莖中出而癢痛，常如欲小便者，並宜先用辰砂妙香散，吞玉華白丹，佐以威喜丸，或分清飲，別以綿裹龍骨同煎，或分清飲半貼，加五倍、牡蠣粉、白茯苓、五味子，各半錢。

氣淋必澀滯，餘瀝不盡，沉香散或益元散、加茴香、木香、檳榔。

血淋必澀痛，遇熱則發，白薇、赤芍等分為末，酒調服二錢，或犀角地黃湯、單車前飲，四物湯加知蘗選用。色鮮者，心與小腸虛熱也，導赤散去甘草、加黃芩。色如豆汁者，腎與膀胱火也，五淋散。又有一種小便見血而不痛者，為溺血非淋也，四物湯加山梔、滑石、牛膝，或單苦蕒菜飲，單髮灰散，單琥珀散。

石淋則溺有砂石，莖強痛甚，單牛膝膏，單鼈甲為末、酒調服。

膏淋者，血淋如膏，用黑豆一百二十粒，甘草一寸，水煎臨熟入滑石末一錢，空心調服，或海金砂散。

勞淋者，痛引氣衝，遇勞則發，痛墜及尻，透膈散、勞傷四物湯加知蘗、滑石、琥珀；虛甚者鹿角霜丸。

熱淋者，暴淋痛甚，八正散或五苓散、合敗毒散，加味石膏湯；急痛者六一散二錢，加木香、檳榔、小茴各一錢為末，服。

冷淋必先寒慄而後溲便澀數，竅中腫痛，生附散、二朮散。

淋皆屬熱，間有冷者，外因當風取涼，冒暑、濕熱鬱滯，胞內痿痹，神不應用；內因七情，心腎氣鬱，小腸膀胱不利，或忿怒房勞、忍溺，酒肉濕熱，下流膀胱，干於肝經，挺孔鬱結，初則熱淋血淋，久則火爍為砂石淋，如湯礶煎久則生礆。

熱在上焦，氣分渴而小便不利者，肺中伏熱，水不能降，宜氣薄淡滲之藥，清金瀉火，以滋水之上源，清肺飲子。熱在下焦，血分不渴而小便不利者，腎與膀胱無陰而陽氣不化，水枯火升，宜氣味俱陰之藥，除熱瀉閉，以滋水之下源，滋腎丸、腎氣丸。其消渴以渴為主，而分氣血，故血分亦有渴者，此以淋為主而分氣血，故血分有不渴者。但渴而多汗亡津，又未可以輕滲也。

治暑淋、熱淋、血淋、山梔仁一味足矣。若發汗則死。

治膏淋、石淋，鬱金、琥珀開鬱，青皮、木香行氣，蒲黃、牛膝破血，黃蘗、生地滋陰。東垣用藥凡例小腹痛，用青皮疏肝，黃

是也。

治夢遺有數種：下元虛憊，精不禁者；宜服茴香丸；年壯氣盛，久節淫欲，經絡壅滯者，宜服清心丸；有情欲淫動，經謂所願不得，名曰白淫，宜良方茯苓散。正如瓶中煎湯，氣盛盈溢者，如瓶中沸湯而溢；欲動心邪者，如瓶傾側而出；憊虛不禁者，如瓶中有罅而漏，不可一概用藥也。經曰：腎氣閉卽精泄。素問曰：腎者作強之宮，伎巧出焉。又曰：腎藏精蓋腎能攝精氣以生育人倫者也，或育或散，皆主於腎，今腎氣衰，則一身之精氣無所管攝，故妄行而出不時也。猪苓丸一方，正爲此設。

王綸明醫雜著

㈠夢遺精滑

夢遺精滑，世人多作腎虛治，而用補腎澀精之藥，不效。殊不知此證多屬脾胃飮酒厚味，痰火濕熱之人多有之。蓋腎藏精，精之所生，由脾胃飮食化生而輸歸於腎，今脾胃傷於濃厚，濕熱內鬱，中氣濁而不淸，則其所化生之精亦得濁氣，腎主閉藏，陰靜則甯，今所輸之精既有濁氣，則邪火動於腎中，而水不得寧靜，故遺而滑也。此證與白濁同。丹溪論白濁爲胃中濁氣下流，滲入膀胱，而云無人知此也。其有色心太重，妄想過用而致遺滑者，自從心腎治，但兼脾胃者多，須要審察。

註按遺精有四，有用心過度，心不攝腎而致者；有因色慾不遂，精氣失位，輸精而出者；有色慾太過，滑泄不禁者；有年壯氣盛，久無色慾，精氣滿溢者；有小便出多不禁者，或不出小便而自出者，或莖中出而癢痛，常如欲小便者，宜辰砂妙香散，或威喜丸。

胞痹即寒淋，小便痛引臍腹，上有清涕，腎著湯；熱者瀉腎湯。

㈡赤白濁

脾胃濕熱，中焦不清，濁氣滲入膀胱爲濁，如夏月天熱則萬木流津。赤者血分濕熱甚，心與小腸主之，導赤散，四物二陳湯加樗白皮、青黛、滑石。白者氣分濕熱微，肺與大腸主之，清心蓮子飲、或五積散合四君子湯。肥人多濕痰，二陳湯加蒼朮、白朮；赤濁加白芍，氣虛加參芪，傷暑加澤瀉、麥門冬、人參；傷風加防風。挾寒加薑桂，甚則加附子。有熱加黃蘗、知母、山梔、或星半蛤粉丸。因七情生痰者四七湯。瘦人多濕火，加味逍遙散，四物湯加知母黃蘗，或眞珠粉丸，樗蘗丸。虛挾痰火，腎氣丸，補陰丸，不可純寒藥以傷血，亦不可純僭藥以助火。蓋寒則堅凝，熱則流通，俱宜清上固下。思慮勞心虛者，妙香散、十味溫膽湯、金蓮丸。房欲傷腎虛者，萆薢分清飲、小菟絲子丸、腎氣丸、八味丸，心腎俱虛無火者，還少丹。虛冷小腹痛不可忍者，酒煑當歸丸。土燥水清，思亦傷脾，精生於穀，故久則宜升胃補脾，二陳湯加升麻、柴胡，以升胃氣。素有痰火，恐升動痰火，胃滿者，再加枳殼、香附、神麯、白朮，或用此吐以提之。如虛勞者，補中益氣湯。脾濕不斂者，蒼朮難名丹、四炒固眞丹、白朮膏、威喜丸，久甚古龍蠣丸、石蓮散、遠志丸。

㈢夢遺

交感之精，雖常有一點白膜裹藏於腎，而元精亦爲此精之本者。實在乎心，日有所思，夜夢而失之矣。治宜黃連清心飲，或十味溫膽湯、妙香散、定志丸。

蘖滋腎，蓋小腹小便，乃肝腎部位。

小腹脹滿甚者，瀉腎湯、火府丹。凡小腸有氣則脹，有血則澀，有熱則痛。又土燥火濁，宜四君子湯加滑石、澤瀉、麥冬、竹葉；痛者六君子湯加知蘗、石葦、琥珀。

肝經氣滯有熱者，用甘草梢五錢、青皮、黃蘗、澤瀉各一錢，水煎服，或三味葶藶散。莖痛引脅者，參苓琥珀湯。腸痛引腰背者，磁石湯。虛者清肝解鬱湯、清肝益榮湯。

腎虛淋瀝，莖中澀痛者，加減八味丸，以補陰。小便頻而黃者，四物湯加參朮、麥門冬、五味子以滋肺腎。小便短而黃者，補中益氣湯加麥門冬、五味子、山藥，以補脾腎。熱結膀胱者，五苓散以清熱。脾肺氣燥者，苓梔二味以清肺，若膀胱陰虛，陽無以生者，滋腎丸。膀胱陽虛，陰無以化者，腎氣丸。

精敗竭者，童男精未盛而御女，老人陰已痿而思色以降其精，則精不出而內敗，莖中痛澀爲淋者，八味丸料，加車前子、牛膝煎服，若精已竭而復耗之，則大小便中牽痛，愈痛則愈欲大小便，愈便則愈痛，倍附子救之。凡此當滋化源，不可誤用知蘗淡滲等劑，既瀉眞陽，復損眞陰。

中氣既弱，不能運通水道，下輸膀胱者，補中益氣湯。凡汗多亡津，瀉久胃乾，諸瘡失血，俱宜滋補，不可過利小便。

積痰在肺，以致膀胱不通，譬之水壺上竅閉，則下竅不出，宜二陳湯探吐，或灸百會穴，皆以開上竅也。蓋膀胱雖主水道，而肺金爲水之化源也。

脬系轉戾，臍下併急而痛，小便不通，名曰轉脬。有因熱逼，或強忍小便，氣逆脬轉者，二石散加車前子、木通等分，水煎，外用炒鹽熨臍，冷即易之。

因氣者先用良薑、葱白、蘇葉煎湯熏洗小腹、外腎、肛門，拭乾伸脚仰臥，後用葵子、赤茯苓、赤芍、白芍等分，入鹽一字，

喜怒不時，虛實不調，臟腑不和，致腎虛而膀胱熱，腎虛則小便數，膀胱熱則水下澀，數而且澀，則淋瀝不宣，小腹弦急，痛引於臍，分石淋、勞淋、血淋、氣淋、膏淋、冷淋六種。石淋者，有如沙石，膀胱畜熱而成，正如湯瓶久在火中，底結白礁也。勞淋者，因勞倦而成，多屬脾虛。血淋者，心主血，心遺熱於小腸，搏於血脈，血入胞中，與溲俱下。氣淋者，肺主氣，氣化不及，州都胞中氣脹，少腹滿堅，溺有餘瀝。膏淋者，滴下肥液，極類脂膏。冷淋者，寒客下焦，水道不快，先見寒戰，然後成淋。更有過服金石，入房太甚，敗精強閉，流入胞中，亦有濕痰日久，注滲成淋，由是則致淋之故，殆有多端，若不求其本，未有獲痊者也。

石淋，清其積熱，滌去沙石，則水道自利，宜神效琥珀散、如聖散、獨聖散，隨證選用。

勞淋，有脾勞腎勞之分。多思多慮，負重遠行，應酬紛擾，勞於脾也，宜補中益氣湯與五苓散，分進。專因思慮者，歸脾湯。若強力入房，或施泄無度，勞於腎也，宜生地黃丸、或黃芪湯。腎虛而寒者，金匱腎氣丸。

血淋，有血瘀、血虛、血冷、血熱之分。小腹硬滿，莖中作痛，欲死，血瘀也，一味牛膝煎膏，酒服，大效。但虛人能損胃耳，宜四物湯，加桃仁、通草、紅花、牛膝、丹皮。血虛者，六味丸，加側柏葉、車前子、白芍藥，或八珍湯，送益元散。血色鮮紅，心與小腸實熱，脈必數而有力，柿蒂、側柏葉、黃連、黃蘗、生地黃、牡丹皮、白芍藥、木通、澤瀉、茯苓。血色黑黯，面色枯白，尺脈沉遲，下元虛冷也，金匱腎氣丸，或用漢椒根四五錢，水煎冷服。然有內熱過極，反兼水化，而色黑者，未可便以爲冷也，須以脈證詳辨之。

氣淋，有虛實之分。如氣滯不通，臍下妨悶而痛，沉香散、石葦散、瞿麥湯。氣虛者，八珍湯，加杜仲、牛膝、倍茯苓。

膏淋者，似淋非淋，小便色如米泔，或如鼻涕，此精溺俱出，精塞溺道，故欲出不快而痛，鹿角霜丸、大沉香散、沉香丸、海金沙散、菟絲子丸，隨證選用。

人身之精，貴於金寶，初因君火不甯，久則相火擅權，精元一於走而不固，甚則夜失連連，日亦滑溜不已，宜坎離丸、有火盛，精中多有紅絲，令溺於桶，澄視之，便見，後雖生子，一歲身生紅絲瘤不救，宜救陰丸、腎氣丸。

氣宜降，精宜升，慾心一動，精隨念去，凝滯久則莖中癢痛，常如欲小便，然或從小便而出，或不從便出而自流者，謂之遺精，比之夢遺尤甚。宜萆薢分清飲，或八物湯，眞珠粉丸。

日久爲有虛無寒，若水虧火益燥者，滋陰降火湯。若君火失權而相火乘脾，濕與熱合，脾土全是死陰，少運飲食，易於侵犯，宜樗蘗丸。脾虛弱者，三灰樗蘗丸，猪肚丸。如原非心腎不交，果因飲酒厚味，乃濕熱內鬱，中氣不清，所化之精亦皆濁氣，歸於腎中，而水不甯靜，故遺而滑也，宜補陰藥中加人參、升麻、柴胡，以升胃中清氣，更宜節飲食以固命根也。噫！精字從米從青，生於穀之清氣也，養生者味之！

四十以後，勞傷氣血，不能固守者，養榮湯加減，吞單樗皮丸，或小菟絲子丸。如早年慾過陽脫者，究源心腎丸、青蛾丸、黑錫丹、縮泉丸、金鎖正元丹。氣陷者神芎湯

有曰，年壯久不御女，精滿而溢者，深爲可笑。人之臟腑，惟氣與血，神則主宰其中而無形迹，可見精乃一時交感，三焦之火吸撮而成，豈先有畜積於中耶？惟節色氣血漸盛，而精不清薄理也。其不御女而漏者，或聞淫事，或見美色，或思想無窮，所願不得，或曾入房太甚，宗筋弛縱，發爲筋痿，而精自出者，謂之白淫，蓋腎藏天一，以慳爲事，至意內治則精全而固，去思外淫，居室太甚，宜乎滲漏而不振也。用茴黃蘗丸最妙。

亦有清心靜坐，養精神者，但好色種子，猶不免有時發露，或被盲人指示房中補益之說，謂可以止精不漏，然對景忘情，實際不復戀乎猥褻之事矣。故曰學仙不斷淫，蒸砂飯不成，養生者愼之！通用單五味子膏，金櫻膏，水陸二仙丹，金鎖思仙丹，芡實丸，秋石固眞丸，固精丸，單韭子散，威喜丸，石蓮散，金櫻丸。

瀉心火，瀉而不效，卽以補中益氣用升麻柴胡至一二錢，舉其氣上而不下，往往有功，詎可補之不效，澀之無靈，遂委之命也哉？

四濁

按經文及細考前哲諸方論，而知濁病卽精病，非溺病也。故患濁者莖中如刀割火灼，而溺自清，惟竅端時有穢物，如瘡之膿，如目之眵，淋漓不斷，與便溺絕不相混。大抵由精敗而腐者十之六七，由濕熱流注與虛者十之二三。其有赤白之分者，何也？精者血之所化，濁去太多，精化不及，赤未變白，故成赤濁，此虛之甚也，所以少年天癸未至，強力行房，所泄半精半血，壯年施泄無度，亦多精血雜出，則知丹溪以赤屬血，白屬氣者，未盡然也。又以赤爲心虛有熱，由思慮而得，白爲腎虛有寒，因嗜欲而得，亦非確論。總之心動於慾，腎傷於色，或強忍房事，或多服淫方，敗精流溢，乃爲白濁，虛滑者血不及變，乃爲赤濁。挾寒則脈來沉遲無力，小便清白，萆薢分清飲、八味丸、內補鹿茸丸之類。挾熱則口渴便赤，脈必滑數有力，清心蓮子飲、香苓散。有胃中濕痰流注，蒼白二陳湯加升麻柴胡。有屬虛勞者，六味丸加蓮鬚、芡實、菟絲、五味、龍骨、牡蠣。有因伏暑，四苓散加香薷、麥門冬、人參、石蓮肉之類。有稠粘如膠，澀痛異常，乃精塞竅道，香苓散送八味丸，或金匱腎氣丸。有熱者萆薢分清飲、茯菟丸。有思想太過，心動煩擾，則精敗下焦，加味清心飲、瑞蓮丸之類。此其大略也。若夫五臟之傷，六淫之變，難以枚舉，臨證之頃，愼無輕忽！

王肯堂證治準繩

㈠淋

淋之爲病，嘗觀病源論謂由腎虛而膀胱熱也。膀胱與腎爲表裏，俱主水，水入小腸，與胞行於陰爲溲便也。若飲食

冷淋多是腎虛，肉蓯蓉丸、澤瀉散、金匱腎氣丸。

胞痹膀胱者，州都之官，津液藏焉，氣化則能出矣，風寒濕邪，氣客於胞中，則氣不能化出，故胞滿而水道不通，小腹膀胱按之內痛，若沃以湯，澀於小便，以足太陽經其直行者，上額交巔入絡腦下，灌鼻則爲清涕也，腎著湯、腎瀝湯、巴戟丸。

㈡脈候

少陰脈數，婦人則陰中生瘡，男子則氣淋，盛大而實者生，虛小而澀者死。

㈢遺精

按古今方論，皆以遺精爲腎氣衰弱之病，若與他臟不相干涉。不知經言五臟六腑，各有精，腎則受而藏之，以不夢而自遺者，心腎之傷居多，夢而後遺者，相火之強爲害。若乎五臟各得其職，則精藏而治，苟一臟不得其正，甚則必害心腎之主精者焉，治之之法，獨因腎病而遺者，治其腎，由他臟而致者，則他臟與腎兩治之。如心病而遺者，必血脈空虛，本縱不收；肺病而遺者，必皮革毛焦，喘急不利；脾病而遺者，色黃肉消，四肢懈惰；肝病而遺者，色青而筋痿；腎病而遺者，色黑而髓空，更當以六脈參詳，昭然可辨。然所因更自多端，有用心過度，心不攝腎，而失精者，宜遠志丸、佐以靈砂丹。有色慾不遂，而致精泄者，四七湯吞白丸子；甚者耳聞目見，其精即出，名曰白淫，妙香散吞玉華白丹。有色慾過度，精竅虛滑，正元散加牡蠣粉、肉蓯蓉各半錢，吞靈砂丹，仍佐以鹿茸丸、山藥丸、大菟絲子丸、固陽丸之類。有壯年久曠，精滿而溢，清心丸。有飲酒厚味，痰火濕熱，擾動精府，蒼朮、白朮、半夏、橘紅、茯苓、甘草、升麻、柴胡，俾清升濁降，脾胃健運，則遺滑自止。有脾虛下陷者，補中益氣湯。有腎虛不固者，五倍子二兩，茯苓四兩，爲丸服之神驗。然其證狀亦復不同，或小便後出多不可禁者，或不小便而自出，或莖中癢痛，常如欲小便者，或夢女交者，並從

或問精滑，何因得之？曰：金匱要略謂虛勞之病，脈浮[illegible]陰寒精自出[illegible]小腹弦急，陰頭寒，脈動微緊，男子失精，女子夢交通。巢氏病源以虛勞病分出五勞、七傷、六極、二十三蒸之名，於七傷中精連、蒸病中玉房蒸，男則遺瀝漏精，與尿精、聞見精出及失精等候，皆混同，仍類虛勞門，爲腎主藏精，故盡作腎氣衰弱之病，似若他臟無損焉，豈其然哉！夫五臟皆藏精者也，嘗考靈樞本神篇首謂天之在我者德也，地之在我者氣也，德流氣薄而生者也，故生之來謂之精，兩精相搏謂之神，如是者通言主一身主宰之精神也，因心腎是水火之臟，法天地施化生成之道，故藏精神爲五臟之宗主。其次言所以任物者謂之心，心有所憶謂之意，意有所存謂之志；因志而存變謂之思；因思而遠慕謂之慮；因慮而處物謂之智，如是者皆因心神隨物所感變而分之，是謂五志，遂有五神臟之名。五神既分，則於德化、政令、性味各司其屬者之用，於是心腎之水火，亦俯從五神之列，然而所主之精神則並行，未始相離，而五神五變者分之如此，則精亦從神之所變，隨處與之合矣。故五臟各得藏其精神以行其用，是之謂臟眞。主所以屬本氣之生化者也，苟有一臟之眞不得其正，則一臟之病作矣。苟一臟之精神傷之甚者，則必害其心腎之主精神者也。如所謂怵惕思慮則傷神，神傷則恐懼流淫而不止，喜樂恐懼則傷精，精傷則骨痠痿厥而不舉。喜樂者憚散而不藏，恐懼者蕩憚而不收，是故主藏精者不可傷，傷則失守而陰虛，陰虛則無氣，無氣則死矣。如是者精神之在五臟，傷之則淫邪立至。心之在志爲喜，在氣爲火爲熱；腎之在志爲恐，在氣爲水爲寒。於是怵惕思慮傷其神，神傷則火動不止，火動不止則腎水恐懼之志者並矣；恐其不解，則動中而腎自傷，腎主藏精，與所受五臟六腑所輸至之精皆不得藏而時自下矣，此乃以心腎主宰精神者言也。至若他臟之精各得而泄，有所據乎？曰：內經所謂思想無窮，所願不得，意淫於外，入房太甚，宗筋弛縱，發爲白淫，其病筋痿，筋痿者，生於肝使內也。王註以白淫是白物淫衍如精之狀，因溲而下，雖云如精，殆非將化未成之精而徑出者乎？何以言之？精有謂生來之精者，先身生之精也，有謂食氣入胃，散精於五臟者，有謂水飲自脾肺輸腎而四布五經並行之

不節，喜怒不時，虛實不調，臟腑不和，致腎虛而膀胱熱，腎虛則小便數，膀胱熱則水下澀，數而且澀，則淋瀝不宣，故謂之淋。其狀小腹弦痛，引於臍下，便出少氣，及分石淋、勞淋、血淋、氣淋、膏淋、冷淋。其石淋者，有如砂石；勞淋者勞倦卽發；血淋者心主血氣，通小腸，熱甚則搏於血脈，血得熱則流行入胞中，與溲俱下；膏淋者，肥液若脂膏，又名肉淋，氣淋者，胞內氣脹，小腹堅滿，出少喜數，尿有餘瀝；冷淋者冷氣客於下焦，邪正交爭，滿於胞內，水道不宣，先寒戰，然後便數成淋，可謂悉病情矣。考之內經，則淋病之因又不止此，大綱有二：曰濕、曰熱，謂太陰作初氣，病中熱脹，脾受積濕之氣，小便黃赤，甚則淋，少陽作二氣，風火鬱於上，主熱，其病淋。蓋五臟六腑十二經脈氣皆相通移，是故太陽主表，上行則統諸陽之氣，下行則入膀胱。又肺者通調水道，下輸膀胱，脾胃消化水穀，或在表在上在中，凡有熱則水液皆熱，轉輸下行，然後膀胱得之而熱矣。且小腸是心之腑，主熱者也，其水必自小腸滲入膀胱胞中，諸熱應於心者，其小腸必熱，胞受其熱，經謂胞移熱於膀胱者，則癃溺血是也。由此而言，初起之熱邪不一，其因皆得傳於膀胱而成淋，若不先治其所起之本，止從末流胞中之熱施治，未爲善也。予嘗思之：淋病必由熱甚生濕，濕生則水液渾凝結而爲淋。不獨此也，更有人服金石藥者，入房太甚，敗精流入胞中，及飲食痰積滲入者，則皆成淋。丹溪嘗治一小兒在胎，受久服金石藥之餘毒，病淋一十五年，以紫雪治愈。凡治病不求其本可乎？

㈡赤白濁

溺與精所出之道不同：淋病在溺道，故綱目列之肝膽部；濁病在精道，故綱目列之腎膀胱部，今患濁者雖便時莖中如刀割火灼，而溺自清，惟竅端時有穢物，如瘡膿，目眵，淋漓不斷，初與便溺不相混淆，猶河中之濟焉，至易辨也。每見時醫以淋法治之，五苓八正，雜投不已，而增劇者，不可勝數，予每正之而難以戶曉也。蓋由精敗而腐者什九，由濕熱流注與虛者什一。

至臥，故成夢而泄矣。但夢者因虛陽虛而得之，故精脫之後，其氣未能卒復，未免形體衰憊，不比平人接內之氣，一二時便可復也。曰：治法當何如？曰：病從他臟而起，則以初感病者為本。腎肝，聚病處為標。若由腎肝二臟自得者，獨治腎肝。由陰陽離決，水火不交通者，則既濟之。陰陽不相抱負者，則因而和之。陽虛者補其氣，陰虛者補其血，陽強者瀉其火，火有正治反治，從多從少，隨其攸利。經曰：思想無窮，所願不得，意淫於外，入房太甚，宗筋弛縱，發為白淫，夢遺等證，先賢治法有五：其一、用辰砂、磁石、龍骨之類，鎮墜神之浮游，河間祕眞丸，本事八仙丹之屬是也。其二、思想結成痰飲，迷於心竅而遺者，許學士用猪苓丸之類，導利其痰是也。其三、思想傷陰者，潔古珍珠粉丸、海藏大鳳髓丹，本事清心丸、丹溪用海蛤粉、青黛、香附、黃蘗、知母之類，降火升陰是也。其四、思想傷陽者，謙甫鹿茸、蓯蓉、菟絲子等補陽是也。其五陰陽俱虛者，丹溪治一形瘦人便濁夢遺，作心虛治，用珍珠粉丸、定志丸是也。

大智禪師云：夢遺不可全作虛冷，亦有經絡熱而得之者，嘗治一男子至夜脊心熱夢遺，用珍珠粉丸、猪苓丸，遺止，終服紫雪，脊熱始除。又一男子脈洪腰熱遺精，用沉香和中丸下之，導赤散治其火而愈。於此知身有熱而遺者，皆熱遺也。若是用心過度而得之，宜遠志丸，用交感湯加蓮肉，五味吞下，仍佐以靈砂丹。若是思色欲不遂得之，宜以四七湯吞白丸子，甚者耳聞目見，其精即出，名曰白淫，妙香散吞玉華白丹。初虞世治精滑不禁，用青州白丸子、辰砂為衣，服之甚效。若審是色欲過度，下元虛憊，泄滑無禁，宜正元飲、加牡蠣粉、肉蓯蓉各半錢，吞養氣丹或靈砂丹，仍佐以鹿茸丸、山藥丸、大菟絲子丸、固陽丸之類，然此項藥太僭燥，若妄用過劑，則陰水耗竭，壯火獨炎，枯脂消肉，骨立筋痿而成不救之疾矣，用者審之！

醫家大法曰：嘗治脫眞不止者，以澀劑收止之，則不能收，不能止，不若瀉心火，若瀉心火不能止者，不若用升陽之劑，加風藥之類止之。非此能止之也，舉其氣上而不下也。

精者，此水穀日生之精也。然飲食日生之精，皆從生來元精之所化，而後分布，其臟盈溢則輸之於腎，腎乃元氣之本，生成之根，以始終化之養之之道也。若飲食之精遇一臟有邪，則其臟之食味化之不全，不得入與元精俱藏，而竟泄出，與夫所謂脾移熱於腎，少腹寃熱而痛出白者，義亦如之。王註雖謂消脂爍肉，無乃消其腎所藏之精歟？蓋使二臟無病，則此白物其不爲精乎？使二臟有病，則所藏之精其不變爲白物而出之乎？以此比例，則肺脾二臟之精，甯不有似肝臟之傷神動氣，致精失守而走泄者乎？然則治當何如？曰獨腎泄者，治其腎，由他臟而致腎之泄者，則兩治之。在他臟自泄者，治其本臟，必察四屬以求其治。大抵精自心而泄，則血脈空虛，本縱不收；自肺而泄者，皮革毛焦，喘急不利；自脾而泄者，色黃肉消，四肢懈惰；自肝而泄者，色青而筋痿；自腎而泄者，色黑髓空而骨惰，卽脈亦可辨也。

或問夜夢交接之理何如？曰：內經曰：腎者主水，受五臟六腑之精而藏之。又曰：主蟄封藏之本，精之處也。又曰：陰陽之要，陽密乃固，陽強不能密，陰氣乃絕。陰平陽秘，精神乃治，陰陽離決，精氣乃絕。又曰：陰陽總宗筋之會，會於氣街。靈樞淫邪發夢篇曰：厥氣客於陰器，則夢接內。蓋陰器者，宗筋之所繫也，而足太陰、陽明、少陰、厥陰之筋，皆結聚於陰器，與衝、任、督三脈之所會，然厥陰主筋，故諸筋皆統屬於厥陰也。腎爲陰，主藏精，肝爲陽，主疏泄，陰器乃泄精之竅，是故腎之陰虛則精不藏，肝之陽強則氣不固，若遇陰邪客於其竅，與所強之陽相感，則精脫出而成夢矣。所謂陽強者，非臟之眞陽強也，乃肝臟所寄之相火強耳。蓋水爲陰，火爲陽，故統言火爲陽，然分言之則爲二。若火盛不已，反消亡其臟之眞陽也。肝乃魂之居，臟之眞陽虛，則遊魂爲變，變則爲夢，與肝虛病者多夢亡人無異。曰：如子所言，夢遺則從肝腎得之乎？曰：不然。病之初起，亦有不在腎肝，而在心肺脾胃之不足者，然必傳於肝腎，而後精方走也。蓋有自然相傳之理存焉。何則？宗筋者，上絡胷腹，挾臍下，合橫骨，故內經謂其總陰陽之會，會於氣街，主束骨而利機關也。夫五臟俱有火，其相火之寄於肝者，善則發生，惡則爲害，獨甚於他火，故平人肝氣之剛勇，充於筋，而爲

白淫，皆男子之疝也。若血涸不月，月罷腰膝上熱，足躄，嗌乾，癃閉，小腹有塊，或定或移，前陰突出，後陰痔漏，皆女子之疝也。惟女子不曰疝而曰瘕。

景岳全書

臣張介賓著

㈠淋濁論證

便濁證有赤白之分，有精溺之辨。凡赤者多由於火，白者寒熱俱有之；由精而爲濁者，其動在心腎，由溺而爲濁者，其病在膀胱肝脾。

赤濁之證，有溺之赤色者，有帶血而赤者。若見鮮血，則當從血證門溺血條下治之。若溺之黃赤者，此固多有火證，然必赤而痛濇，乃別有火脈火證，方可以火證赤濁論治。或以勞倦久病，酒色耗傷眞陰，或以素服清涼等藥，愈服愈赤，愈見短少，而且無痛濇等證者，此係水虧液涸，全非赤濁之比。經曰：中氣不足，溲便謂之變，卽此類也。但當溫補下元，使之氣化，水必自清，切不可因小便黃赤，一槪皆從火治。

白濁證有濁在溺者，其色白如泔漿，凡肥甘酒醴辛熱炙煿之物，用之過當，皆能致濁，此濕熱之由內生者也。又有炎熱濕蒸，主客時令之氣，侵及臟腑，亦能致濁，此濕熱之由外入者也。然自外而入者少，自內而生者多，總之必有熱證熱脈，方是火證，清去其火，則濁無不愈矣。有濁在精者，必由相火妄動，淫慾逆精，以致精離其位，不能閉藏，則源流相繼，淫溢而下，移熱膀胱，則溺孔濇痛，清濁並至，此皆因於熱也。及其久也，則有脾氣下陷，土不制濕，而水道不清者；有相火已殺，心腎不交，精滑不固，而遺濁不止者，此皆無熱證也。有熱者當辨心腎而清之，無熱者當求脾腎而固之，舉之，治濁之法，無出此矣。

趙獻可醫貫

㈠夢遺精滑論

治以腎肝爲主，經曰：陰陽之要，陽密乃固；陽強不能密，陰氣乃絕。陰平陽祕，精神乃治；陰陽離決，精氣乃絕。夫所謂陽強者，乃肝腎所寄之相火強也，所謂陰絕者，乃腎中所藏之眞陰絕也。腎爲陰主藏精，肝爲陽，主疏泄，是故腎之陰虛則精不藏，肝之陽強則火不祕，以不祕之火，加臨不藏之精，有不夢，夢卽泄矣。或問曰：何故不爲他夢而偏多淫夢耶？曰：靈樞經淫邪發夢篇云厥氣客於陰器，則夢接內，蓋陰器者，泄精之竅，主宗筋，足太陰、陽明、少陰、厥陰之筋，與夫衝、任、督三脈之所會，諸筋皆結聚於陰器，而其中有相火寄焉，凡平人入房而強於作用者，皆此相火充其力也，若不接內，不與陰氣合，則精不泄，一接內與陰相合，則三焦上下內外之火翕然而下從，百體元府悉開，其滋生之精盡趨於陰器以泄，而腎不藏矣。若其人元精堅固者，淫氣不能搖，久戰而尙不泄，況於夢乎？縱相火動而成宵夢，夢亦不遺，此謂陰平陽祕無病人也。今人先天稟賦原虛，兼之色慾過度，以致腎陰衰憊，陰虛則相火動，相火之系上係於心。心爲君火，感物而動，動則相火翕然而隨，雖不交會而精已離其位，卽客於陰器間矣。夜臥時當所寄之相火一遇與接內時與陰氣相合同，故臥而卽夢，夢而卽遺也。若腎不虛，則無復是夢，夢亦不遺矣。故治是證者，先以腎肝爲主。或問曰：陰虛火動而夢遺，服丹溪補陰丸以滋陰降火，則證與藥相對，每依法服之而不效，何也？曰：此未得丹溪滋陰之本意也。蓋丹溪心法第一方，原以腎氣丸爲滋陰之要藥也，今人不會其意，以黃蘗知母爲君，槩用坎離丸固本之類，凡此俱是沉寒瀉火之劑，苦寒極能瀉水，腎有補而無瀉，焉能有裨於陰哉？獨薛立齋發明丹溪之所未發，專用六味地黃以補腎而治夢遺，屢效，縱有相火，水能滋木，水升而木火自息矣。倘有脾胃不足，濕熱下流，當以前丸爲主，煎服補中益氣以升提之。有用心過度，心不能主令而相火代事者，亦以前丸爲主，仍兼用

之血淋，則多由衝任經脈之病，大與男子不同，婦人門另有正條。

㈢遺精論證

夢遺、精滑、總皆失精之病，雖其證有不同，而所致之本則一。蓋遺精之始，無不病由乎心，正以心爲君火，腎爲相火，心有所動，腎必應之，故凡以少年多慾之人，或心有妄思，或外有妄遇，以致君火搖於上，相火熾於下，則水不能藏而精隨以泄。初泄者不以爲意，至再至三，漸至不已，及其久而精道滑，則隨觸皆遺，欲遏不能矣。斯時也，精竭則陰虛，陰虛則無氣，以致爲勞爲損，去死不遠也。蓋精之藏制雖在腎，而精之主宰則在心，故精之蓄泄無非聽命於心。凡少年初省人事，精道未實者，苟知惜命，先須惜精，苟欲惜精，先宜靜心。但見伶俐乖巧之人，多有此病，而田野愚魯之夫，多無此病，其故何也？亦總由心之動靜而已，此少年未病之前所當知也。及其旣病而求痊，則尤以持心爲先，然後隨證調理，自無不愈。使不知求本之道，全恃藥餌而欲望成功者，蓋亦幾希矣。

遺精之證有九：凡有所注戀而夢者，此精爲神動也，其因在心。有慾事不遂而夢者，此精失其位也，其因在腎。有值勞倦卽遺者，此筋力有不勝，肝脾之氣弱也。有因用心思索過度輒遺者，此中氣有不足，心脾之虛陷也。有因濕熱下流，或相火妄動而遺者，脾腎之火不淸也。有無故滑而不禁者，此下元之虛，肺腎之不固也。有素稟不足而精易滑者，此先天元氣之單薄也。有久服冷利等劑，以致元陽失守而滑泄者，此誤藥之所致也。有壯年氣盛，久節房慾而遺者，此滿而溢者也。凡此之類，是皆遺精之病，然心主神，肺主氣，脾主濕，肝主疏泄，腎主閉藏，則凡此諸病五臟皆有所主，故治此者亦當各求所因也。若滿而溢者則去者自去，生者自生，勢出自然，無足爲意也。

因夢而出精者，謂之夢遺，不因夢而精自出者，謂之滑精。夢遺者，有情有火，有虛有溢，有因情動而夢者，有因精動而夢者；情動者當清其心，精動者當固其腎。滑精者無非腎氣不守而然，若暴滑而兼痛者，則是亦白濁。

淋之爲病，小便痛澀，滴瀝，欲去不去，欲止不止者是也。是亦便濁之類，而實濁之甚者。但濁出於暫，久而不已，則爲淋證。其證則或有流如膏液者，或出如砂石而痛不可當者，或有如筋條者，或時爲溺血血條者。此淋之與濁，誠有不同，故嚴氏有五淋之辨，曰氣、石、血、膏、勞是也。氣淋爲病，小便澀，常有餘瀝；石淋莖中痛，溺如砂石，不得卒出；膏淋溺如膏出；勞淋勞倦卽發，痛引氣衝；血淋遇熱卽發，甚則溺血，候其鼻頭色黃者，小便難也。大抵此證多由心腎不交，積蘊熱毒，或酒後房勞，服食燥熱，七情鬱結所致，此嚴氏之說固已盡之。然淋之初病，則無不由乎熱劇，無容辨矣。但有久服寒涼而不愈者，又有淋久不止及痛澀皆去而膏液不已，如白濁者，此爲中氣下陷，及命門不固之證，必以脈證而察其寒熱與虛，庶乎無誤。

(二)論治

熱畜膀胱，溺赤熱甚而或痛或澀者，必當專去其火，宜先用抽薪飲、大分清飲、七正散之類主之。若小水不利，而煩熱難解者，惟菉豆飲爲最妙。若兼大便燥結者，宜八正散主之。若微熱不甚，或熱勢稍退者，宜加減一陰煎，或導赤散、火府丹、清心蓮子飲之類主之。若小水不利者，宜清肺飲子主之。

溺白證凡如泔如漿者，亦多屬膀胱水道之熱，宜導赤散、徙薪飲之類以清之。若無內熱而溺白者，多由飲食濕滯，宜小分清飲，或苓朮二陳湯，減去乾薑以燥之利之。大都濕在腸胃，或在膀胱者，宜二陳湯，或半夏丸丹之類，皆可擇用。若胞氣不固，而液濁不清者，亦敗精之屬，宜祕元煎，或水陸二仙丹以固之。濁在精分者，必因相火妄動，或逆精而然，以致精溺並至，若兼澀痛之甚者，亦宜抽薪飲、大分清飲之類，先去其火，然後再安精氣。及其稍久，痛澀俱去，而惟精濁不止者，當用寧心固腎等劑，宜祕元煎、菟絲煎，或人參丸、定志丸、心虛白濁飲之類主之。命門虛寒，陽氣不固，則精濁時見而久不能愈者，但當培補命門，宜右歸丸、益志湯、石刻安腎丸、八味地黃丸之類主之。若虛本不固而包氣散寒不禁者，宜萆薢分清飲主之。

[illegible]末，蜜丸，早晚白滾水吞下，各一兩，十日必無溺石之苦矣。此證成之最苦，欲溺而不溺，不溺而又欲溺，尿管中痛如刀割，用盡氣力，止溺一塊，其聲錚然，見水不化，乃膀胱之火熬煎而成，此異病也。其色或紅或白或黃或青或黑不一，總皆水鬱而火煎之也。此方之妙，全不去治石淋，而徑去補腎水之不足，水足而火自消，火消而水自化，其中有妙旨也。倘治膀胱，則氣不能出，又何以化水哉？

㈡遺精

夢遺之病，多成於讀書飄蕩之子，或見色而思，或已洩而戰，或用心作文，以取快於一時，或夜臥不安而漁色，遂至風情大勝，心氣不寧，操守全無，玉關不閉，往往少年坐困也。今立一方，熟地、芡實、白朮、山藥各八兩，山茱萸、炒棗仁各四兩，北五味、麥冬、茯苓、車前子各三兩，遠志一兩，各為末，蜜為丸，每日白滾水送下一兩，一料全愈，不再發。此方妙在用芡實山藥為君，而以熟地山茱萸之類為佐，直補其心腎之陰，而又以白朮利其腰臍，而元精自不外洩。況夢遺原無止法，愈止而愈洩，不若補其陰氣，總或走失亦不狼狽，何必補澀而後不走失乎？然則不閉之閉，正深於閉，又何必牡蠣金櫻子之為得哉？車前利小便而不走氣，利其水則必存其精，又不可不知其功。

夢遺之證，久則玉關不閉，精盡而亡，人往往用澀精之藥，所以不救。倘於未曾太甚之時，大用補精補氣之藥，何至於此。方用芡實山藥各一兩，蓮子五錢，炒棗仁三錢，茯神二錢，人參一錢，水煎服。此方名保精湯，先將湯飲之後，加白糖五錢，拌勻連查同服，每日如此，不須十日即止矣。藥味平淡，收功獨神者，蓋芡實山藥固精添髓，蓮子清心止夢，茯神棗仁安魂利水，得人參以運用於無為，不必止夢而夢自無，不必止精而精自斷，又何至玉關不閉，至於夭亡哉！

(四)論治

精道滑而常夢常遺者，此必始於慾念，成於不謹，積漸日深，以致腎氣不固而然。惟苓朮菟絲丸爲最佳，其次則小菟絲子丸，金鎖思仙丹之類，皆可擇用。

君火不清，神搖於上，則精遺於下，火甚者宜先以二陰煎之類，清去心火；火不甚者宜先以柏子養心丸，天王補心丹，或人參丸，遠志丸之類，收養心氣，然後用苓朮菟絲丸之類固之。若相火易動，肝腎多熱而易於疏泄者，宜經驗猪肚丸爲最，或固精丸之類主之。然須察其火之微甚，宜清者，亦當先清其火。

凡思慮勞倦每觸即遺者，但培補心脾，勿得誤爲清利。惟壽脾煎或歸脾湯，減去木香，或用祕元煎主之，皆其宜也。其有氣分稍滯，不堪芪朮者，宜菟絲煎主之，或以人參湯吞苓朮菟絲丸亦妙。

先天素稟不足，元陽不固，每多遺滑者，當以命門元氣爲主；如左歸、右歸、六味、八味等丸，五福飲、固陰煎，菟絲煎之類，隨宜用之，或經驗祕眞丸亦可酌用。濕熱下流，火伏陰中而遺者，宜四苓散，或大小分清飲之類主之。

過服寒涼冷利等藥，以致陽氣不固，精道滑而遺泄不止者，速當溫補脾腎，宜五君子煎、壽脾煎，或右歸丸、八味地黃丸、家韭子丸之類主之。

治遺精法，凡心火盛者，當清心降火；相火盛者，當壯水滋陰；氣陷者當升舉；滑泄者當固澀；濕熱相乘者，當分利；虛寒冷利者，當溫補下元；元陽不足，精氣兩虛者，當專培根本。今人之治遺泄，動以黃蘗知母爲君，或專用固本丸、坎離丸之類，不知苦寒之性，極能沉降瀉水，腎虛者尤非所宜，腎有補而無瀉，此輩亦何裨於腎？而凡用於非火滑泄者，適足爲腎之害耳。

石室祕籙　臣陳士鐸著

醫部彙考二百六十九

淋濁遺精門二

方

㊀茯神湯濟生方　治欲心太熾，思想太過，夢洩不禁，夜臥不寧，心悸。

茯苓去皮一錢半，遠志，棗仁炒各一錢二分，石菖蒲，人參，白茯苓，當歸酒洗各一錢，黃連，生地黃各八分，甘草四分。右水二鍾，蓮子七枚，槌碎，煎八分，食前服。

㊁大金花丸河間六書下同　一名既濟解毒丸，治中外諸熱，溺血淋閟。

黃連，黃蘗，黃芩，大黃各半兩。右爲末，滴水丸，如小豆大，每服二三十丸，新汲水下，自利去大黃加梔子。小兒丸如麻子三五丸。

㊂祕眞丸　治白淫，小便不止，精氣不固，及有餘瀝，或夢陰人通洩。

訶子皮大者五箇，縮砂仁半兩去皮，龍骨研，硃砂各一兩研細，一分爲衣。右爲末，麪糊丸，如菉豆大，每服一丸，空心溫酒下，冷水亦得，不可多服。大便祕，葱白湯茶下。

㊃治淋方千金方下同　治諸淋。

白薇，赤芍各等分。右爲末，每服二錢，溫酒調下，立效。或加檳榔。

㊂又方　治淋。

人參一錢，白朮一錢半，澤瀉，赤茯各七分。甘草，麥門冬，滑石各半錢。竹葉三十片，燈心二十莖。

右剉作一服，水煎。

㊃生附湯　治冷淋，小便祕澀，數起不通，竅中苦痛，憎寒凜凜，多因飲水過度，或爲寒濕，心虛志耗，皆有此證。

附子炮去皮臍，滑石水飛各半兩，瞿麥，木通各七錢半，半夏。右剉碎，每服三錢，水一鍾，生薑三片，燈心二十莖，蜜半匙，煎，空心服。

㊄又方　治赤濁。

黃蘗炒黑一兩，生蘗二兩。蛤粉三兩，神麴半兩。右爲末，水丸服。

㊅定志丸　治白濁。

遠志，石菖蒲各二兩。人參，白茯苓各二兩。右爲末，蜜丸，梧子大，硃砂爲衣，每服七丸，加至二十九，空心米湯送下。

㊆通滑散　治熱結，小便赤澀不通，水道中痛，尿卽號啼。

滑石一兩，通草七錢半，冬葵子，赤茯苓，車前子，黃芩各半兩。右爲末，每服半錢，或一錢，食前溫熱水調下。

㊇又方　治遺精。

滑石，石葦，苦蔞根各二兩。右三味，治下篩大麥飲，服方寸匕日三。

⑤又方　治五勞七傷、八風、十二痹、勞結爲血淋，熱結爲肉淋，小便不通，莖中及小腹痛不可忍者。

滑石，桂心，王不留行，通草，冬葵子，車前子各二分，甘遂一分，石葦四分。右八味治下篩，以麻子飲五合，和服方寸匕，日三。尿砂石出。一方加榆木白皮三分。

⑥又方　治血淋，小便澀痛。

鷄蘇二兩，通草，滑石各五兩，竹葉一把，生地黃半斤，小薊根一兩。右六味㕮咀，水九升煎取三升，去滓，分三服，溫服。

⑦石葦散　治血淋。

石葦，當歸，蒲黃，芍藥各等分。右四味，治下篩，酒服方寸匕，日三。

⑧小薊飲子濟生方下同　治下焦結熱血淋。

生地黃洗四兩，小薊根，滑石，通草，藕節，蒲黃炒，淡竹葉，當歸去蘆酒浸，山梔子仁，甘草炙各半兩。右㕮咀，每服四錢，水一盞半，煎至八分，去滓溫服，空心食前。

⑨固精丸　治嗜慾過度，勞傷腎經，精元不固，夢遺白濁。

肉蓯蓉酒浸薄切焙，陽起石火煆研極細，鹿茸燎去毛酥炙，韭子炒，赤石脂火煆七次，龍骨生用，川巴戟槌去心，白茯苓，鹿角霜，附子炮去皮臍各等分。右爲末，酒糊爲丸，如梧桐子大，每服七十丸，空心鹽酒鹽湯任下。

⑩又方丹溪下同　治老人氣虛而淋者。

人參，白朮，木通，山梔，或湯或丸，適宜。

茯苓，豬苓，澤瀉各二錢，琥珀，車前子炒，木通，瞿麥，萹蓄各一錢。通草，燈心各五分。右作一服，水二鍾，煎至一鍾，食遠熱服。此證八正散五苓散，多宜服之。

㉗豬苓湯　治五淋。

豬苓，赤茯苓，阿膠炒，澤瀉，滑石各二錢。右作一服，水二鍾，煎至一鍾，食前服。

㉘榆皮飲　治小便卒暴，淋澀不通。

榆白皮洗，瞿麥穗，梔子仁，赤茯苓去皮，郁李仁湯浸去皮尖炒，雞蘇葉，木通各半兩。右㕮咀，每服三錢匕，水一大鍾，煎七分，去滓，不拘時溫服。

㉙通草散　治腎氣不足，膀胱有熱，水道不通，淋瀝沙石，痛不可忍，或出鮮血，並皆治之。

通草二兩，切作片，以糯米飲拌，日中曬乾，桂心，白芍藥，石葦去毛，蒲黃炒各一兩，滑石，王不留行各半兩，葵子一兩半，甘遂三錢。右為細末，每服三錢，食前用沸湯調服。

㉚王不留行散　治熱淋疼痛不止。

王不留行，車前子，木通各一兩，葵子，滑石各一兩五錢，當歸微炒，蒲黃，赤芍藥，甘遂煨，桂心半各半兩。右為細末，每服一錢，食前用粥飲調服。

㉛當歸湯　治血淋及五淋等疾。

當歸，淡竹葉，燈心，竹芫荽，紅棗，麥冬，烏梅，木龍，一名野葡萄藤。甘草。右等分，煎濃作熟水，患此疾者，多渴，隨意飲之。

㉜羚羊角散　治血淋，小便熱結澀痛。

良薑三錢，黃蘗，芍藥各二錢，並燒灰存性，樗根白皮一兩半。右爲末，糊丸，每服三十丸。

㊈威喜丸　治夢泄。

白茯苓去皮作塊用豬苓一分同於磁器內煮二十沸，取出日乾，不用豬苓。　黃蠟各四兩。　右以茯苓爲末，溶蠟搜丸，如彈子大，每服一丸，空心細嚼，津液嚥下，小便清爲度，忌米酢。

㊉珍珠粉丸寶鑑下同　治白淫夢泄遺精，及滑出而不收。

眞蛤粉，黃蘗各一斤，新瓦上炒赤。　右爲末，滴水丸，如桐子大，每服一百丸，空心溫酒送下。

㊁補眞玉露丸　治陽虛陰盛，精脫淫濼脛痠。

白茯苓去皮，白龍骨水飛，韭子酒浸炒，菟絲酒浸各等分。　右火日修合爲末，酢糊丸，桐子大，每服五十丸，溫酒送下，鹽湯亦得。空心食前，少時以飯羹壓之。

㊂王瓜散　治小便自利，如泔色，此腎虛也。

王瓜根，桂心各一兩。　白石脂，菟絲子酒浸，牡蠣鹽泥裹燒赤，候冷去泥各二兩。　右爲末，每二錢，大麥煎粥湯調下，一日三服，食前。

㊂導赤散直方下同　治心虛蘊熱，小便赤淋，或成淋痛。

生地黃四錢，木通三錢，甘草二錢。　右作一服，水二鍾，竹葉十片，煎至一鍾，不拘時服。

㊃瞿麥散　治血淋尿血。

瞿麥穗，赤芍藥，車前子，白茅根無根用花。　赤茯苓，桑白皮炒，石葦去毛，生地黃，阿膠炒，滑石，黃芩，甘草炙各二錢。　右爲末，每二錢，入血餘燒灰一錢，食前沸湯調服。

㊄琥珀散　治小便淋澀，及下焦結熱，氣不施化，或五種淋疾，癃閉不通。

[illegible]川楝子去皮核取肉焙　當歸，　禹餘糧火煅酢淬各三兩，　韭子微炒　山茱萸　破故紙炒，　赤石脂，　龍骨另研各半兩，　滴乳香二錢半。　右爲細末酒調糯米末煮糊爲丸，如梧桐子大，每服七十丸；食前用白茯苓煎湯送下。

㊃四精丸　治白濁煩渴。

鹿茸，　肉蓯蓉　山藥　茯苓去皮各等分。　右爲細末，米糊爲丸，如梧桐子大，每服三十丸，空心用棗湯送下。

㊃玉鎖固眞丹　治心氣不足。思慮太過，腎經虛損，眞陽不固，漩有遺瀝，小便經歲白濁，或淡赤，或如膏，夢寐精泄，甚則身體拘倦，骨節酸痛，飮食不進，面色黧黑，容枯肌瘦，脣口乾燥，虛煩盜汗，舉動乏力，多服取效。

白龍骨半斤，　磁石火煅酢淬七次，　牡蠣煅，　遠志甘草煮去心，　白茯苓，　吳茱萸焙，　巴戟，　官桂去粗皮，　肉蓯蓉酒浸焙，　桑螵蛸酒浸焙，　桑寄生，　附子炮去皮臍，　川楝去核炒，　當歸　蒼朮酒炒，　木香，　黃芪，　茴香，　硃砂各一兩，　紫梢花兩半；　菟絲子酒浸焙，　家韭子各二兩半。　右爲細末，煉蜜和丸，如梧桐子大，每服五十丸，空心用溫酒或鹽湯送下。

㊃桑螵蛸丸　治下焦虛冷，精滑不固，遺瀝不斷。

桑螵蛸七箇炒，　附子炮去皮臍，　五味子，　龍骨各半兩。　右爲細末，糯米糊爲丸，如梧桐子大，每服五十丸，空心用鹽酒送下。

㊃仙方固眞丹　專治精泄不禁。

禹餘糧，　石中黃，　赤石脂，　紫石英，　石燕子俱用炭火內煅通紅，酢三升淬，研爲細末，各一兩，　白茯苓四兩，

羚羊角屑，梔子仁，葵子炒各一兩，青葙子，紅藍花炒，麥門冬，大青，大黃炒各半兩。右搗篩，每服三錢匕，水一盞煎七分，去滓，不拘時溫服。

㉝鷄蘇飲子　治血淋不絕。

鷄蘇一握切，石膏八分碎，竹葉一握切，生地黃一升切，蜀葵子四分爲末。右四味，以水五升煑二升，去滓，下葵子末，分溫二服，如人行五里久，進一服。忌蕪荑、蒜麪、炙肉等。

㉞金黃散　治小便血淋疼痛。

大黃煨，人參，蛤粉，黃蜀葵花焙，右等分爲末，每服一錢匕，燈心煎湯調服，日三。

㉟神效方　治血淋。

海螵蛸，生乾地黃，赤茯苓各等分。右爲細末，每服一錢，用柏葉、車前草煎湯調服。

㊱如聖散　治沙淋。

馬蘭花，麥門冬去心，白茅根，車前子，甜葶藶，苦葶藶炒，檀香，連翹各等分。右爲末，每服四錢，水煎服。如渴加黃芩同煎，臨熟入燒鹽少許，服之。

㊲取石方　治石淋小便時沙石下流，塞其水道，疼痛不可勝忍，經及時日，水道不通，其氣上攻頭痛面目浮腫，重則四肢八節俱腫。其石大者如梅核，堅硬如有稜角，其石小者惟碎石相結，通下即碎。

冬葵子，滑石，射干，知母各一分，通草三分。右爲細末，每服二錢半，水一盞半，苦竹葉十片，同煎，取一盞去滓，食前熱服。又大腑熱頭痛，若體氣壯健，先進後方藥兩三盞，然後進取石方。

㊳體氣壯健先進方　治石淋水道不通，却頭痛膈昏，宜先服此藥。

黃，芒硝，射干，荊芥穗，紫菀，防風，知母，蔓荊子，牽牛各一分，半夏二銖。右爲末，每二錢，水

白龍骨一兩，韭子一合。右爲細末，每服二錢匕，空心用酒調服。此二味藥大能澀精固眞氣煖下元。

(五〇)枸杞丸 補精氣。

枸杞子冬採者佳，黃精，右各等分，爲細末，二味相和搗成塊，捏作餅子，乾復搗爲末，煉蜜爲丸，如梧桐子大，每服五十丸，空心溫水送下。

(五一)葛眞人百補交精丸 治夢泄精滑不禁。

熟地黃酒浸一宿，切焙乾四兩，五味子六兩，杜仲去粗皮炒斷絲三兩，肉蓯蓉酒浸焙乾，山藥，牛膝剉酒浸一宿焙乾各二兩，澤瀉，山茱萸，茯神，遠志，石膏火煅令赤去火毒，赤石脂，巴戟，柏子仁微炒別研各一兩。右爲細末，煉蜜爲丸，如梧桐子大，每服二十丸，空心用酒送下，男女並宜服之。

(五二)王荊公妙香散 安神、閉精、定心氣。

五色龍骨，益智仁，人參各一兩，白茯苓，遠志，茯神各半兩，朱砂研，甘草炙各一分。右爲細末，每服二錢，空心用溫酒調服。

(五三)香茸丸 滋補精血，益養眞元，治下焦陽竭，臍腹疞痛，飲食減少，目視䀮䀮，夜夢鬼交，遺泄失精，肌肉消瘦。

鹿茸，麋茸俱用火燎去毛，酥炙各二兩，沉香，五味子，白茯苓，白龍骨火煅，肉蓯蓉酒浸一宿，切焙乾各一兩，麝香別研半兩。右爲細末，和勻，用熟地黃三兩，焙乾爲細末，以酒二升熬成膏子，搜藥入臼內，搗千杵，如硬，更入酒少許，丸如梧桐子大，每服五十丸，空心溫酒鹽湯任下。

(五四)人參湯 一名棗仁湯，治虛勞失精，便溺白濁，形體枯瘦，腰膝疼痛。

人參二兩，青鹽一兩。右爲細末，再研勻，用無灰酒煮糊，和丸如小指頭大，以硃砂爲衣，每服二三丸，用溫酒或鹽湯送下，空心臨睡服。

㊹鎖陽丹　治脫精不禁。

白茯苓，龍骨另碾各一兩，桑螵蛸三兩瓦上焙。右爲細末，麪糊爲丸，如梧桐子大，每服七十丸，食前用茯苓煎湯入鹽少許送下。

㊺鎖精丸　治精滑不禁。

獨活，續斷，穀精草，石蓮肉去殼，乾菱米，金櫻子，白茯苓，川楝子去核炒，木猪苓，小茴香，藕節，雞頭，蓮蕊，五色龍骨各等分。右爲細末，用雞子清爲丸，如梧桐子大，每服四五十丸，空心用鹽湯送下，以乾物壓之。

㊻無名丹　補虛守神，濇精固陽道，男子服之有奇效，非筆可盡述。其作用非至神不能處之，遂無名可稱其效，故曰無名。

茅山蒼朮一斤，不用泔浸，入藥臼以麵杖舂令精滑淨，篩去粗皮，亦不須過當，龍骨別研如粉。川烏頭大者炮去皮臍各一兩，赤石脂二兩研，川楝子三兩去核微炒，破故紙三兩微炒，舶茴香一兩半微炒。右爲細末，合和勻，酒煮麪糊爲丸，如梧桐子大，硃砂爲衣，多可百丸，少止三十丸，食前溫酒米飲鹽湯任下。如欲恃藥力，冷酒下五十丸。婦人無子服之有益。一方加遠志，蓮肉，並去心，白茯苓三味各一兩，用蘇合香丸酒下。一方無赤石脂。

㊼煨腎附子散　治腎臟虛憊遺精盜汗。

豶猪腎一雙，附子一錢爲末。右將猪腎批開，入附子末在內，以濕紙裹煨熟，空心稍熱服之，即飲酒一盞送下。

㊽心腎丸　治心腎不足，精少血燥，心下煩熱，怔忡不安，或口乾生瘡，目赤頭運，小便赤濁，五心煩熱

鎔和丸，如梧桐子大。如無敗蠟，以蠟糊代之。每服三五十丸，空心用麥門冬湯送下，日進二服。如覺陽道衰微，小便清，夢遺止，卽住服，忌酒幷熱麪動風等物。如欲陽道如故，卽以麝香酒解之。此藥治大衰，痿陽道，止妄心，惟修眞養性之士宜服之。

（六二）二參丸　治虛勞，小便餘瀝，尿精。

人參，　菟絲子酒浸一宿，另搗各半兩，　澤瀉　麥冬去心焙各一兩，　官桂，　牡蠣煅研成粉，　黃檗蜜炙，　細莘，　附子炮去皮臍　山芋，　苦參各三分。　生地黃焙，乾薑炮各一分。　右爲細末，煉蜜和丸，如梧桐子大，每服三十丸，空心用溫酒送下。如瘰痹，加附子炮裂去皮臍一分；婦人血傷，加生地黃焙半兩，黃檗去粗皮蜜炙一分。

一方用熟地黃　治虛勞失精，小腹弦急，隱隱頭疼，目痛髮落。

（六三）椒腎丸　治虛勞內傷，腎氣衰冷，小便餘瀝，精氣滑泄。

漢椒去目幷合口者，微炒出汗，　鹿茸去毛酥炙，　雞頭實生用，　龍骨各二兩，　肉桂，　白礬煅，　桑螵蛸微炒，　乾薑炮，　白朮土炒各一兩半，　補骨脂微炒一兩。　右爲細末，入鹽花二兩，研令勻，用豶猪腎十枚，切去脂膜，研令爛，以酒三升，漸入，熬成膏，次入藥末和搗二三百杵，丸如梧桐子大，每服三十丸，食前溫酒送下。

（六四）韭子丸　治房室過度，精泄自出不禁，腰背不得屈伸，食不生肌肉，兩脚苦弱，此藥治之。

韭子一升，　桂心，　當歸，　紫石英，　遠志，　天雄，　紫菀，　山茱萸，　薯蕷，　細莘，　人參，　禹餘糧，　川芎，　白朮，　附子，　石菖蒲，　杜仲，　乾薑，　鈫石斛，　白茯苓，　白殭蠶，　天門冬，　甘草各一兩半，　肉蓯蓉，　菟絲子，　乾地黃，　蛇牀子，　黃芪各二兩，　乾漆，　牛髓各四兩，　大棗五十枚。　右爲細末，以白蜜入牛髓，棗膏合搗三五千杵，丸如梧桐子大，每服十五丸，加至二十丸，空心溫酒鹽湯任下。

人參，官桂，芍藥各三錢。白茯苓，白龍骨，牡蠣煆，黃芪，甘草炙各半兩，酸棗仁，澤瀉各一分。
半夏湯洗去滑焙乾二兩。右粗搗每服三錢水一盞入生薑半分搗碎煎至七分去滓空心溫服。

㉟韭子丸　治虛勞漏精。

韭子炒，車前子，菟絲子酒浸別搗，龍骨，天雄炮去皮臍各一兩，鹿茸燎去毛酒炙，桑螵蛸炙，乾薑炮各三分。右爲細末，煉蜜和丸，如梧桐子大每服二十丸，空心用黃芪煎湯送下。

㊱固氣丸　治清精自下。

天雄，菟絲子，五味子，龍骨各兩半，乾薑，桑螵蛸，山茱萸，巴戟各一兩。韭子二兩。右爲細末，煉蜜和丸，如梧桐子大，每服三四十丸，空心用溫酒任下，或乾薑減半亦可。一方有木賊一兩半。

㊲內固丸　澀精健陽。

天雄，龍骨，鹿茸，牡蠣　韭子各半兩。右爲細末，酒煮麪糊爲丸，如梧桐子大，每服三十丸，空心用冷酒送下，臨臥時再服。

㊳安中湯　治腎經虛寒，遺精白濁，四肢煩倦，時發蒸熱，精滑不禁。

熟地黃，川巴戟，龍骨，茯苓，遠志，天雄，五味子，山藥各三錢半。肉蓯蓉酒浸去皺皮，川續斷各四錢，菟絲子，蛇牀子各四錢半。右爲細末，每服二錢，食前用酒調服。

㊴金鎖玉關丸　治遺精白濁，心虛不寧。

雞頭肉，蓮子肉，蓮花蕊，藕節，白茯苓，白茯神，乾山藥各二兩。右爲細末，用金櫻子二斤去毛槌碎，水一斗熬至八分，去滓再熬成膏，仍用少麪糊同和爲丸，如梧桐子大，每服五七十丸，不拘時溫米飲送下。

㊵通靈散　治心氣不足，小便滑赤白二濁，

枸杞，牛膝酒浸，甘草炙各一錢。右作一服，水二鍾，生薑五片，鹽少許，煎一鍾，空心服。

⑩祖傳經驗秘眞丹　治好色腎虛，遺精夢泄，白淫白濁等證。

鹿角膠炒珠一兩半，菟絲子，韭子，柏子仁，補骨脂，乾薑炒黑色各一兩，龍骨，牡蠣粉，山茱萸肉，赤石脂各半兩，遠志，覆盆子，巴戟，枸杞子，黃蘗鹽酒炒，山藥各七錢半，金櫻子半青黃者去皮核取肉焙乾二兩，芡實，杜仲薑汁炒絲斷各五兩。右爲細末，煉蜜爲丸如梧桐子大，每服一百丸，空心薑鹽湯下。

⑪金鎖正元丹和劑　治眞氣不足，吸吸短氣，四肢倦怠，脚膝痠軟，目暗耳鳴，遺精盜汗，一切虛損之證。

五倍子八兩，補骨脂酒浸炒十兩，龍骨二兩，茯苓六兩，肉蓯蓉洗去鱗甲，紫巴戟去心，胡盧巴炒各一斤。硃砂三兩別研。右爲末，入研藥令勻，酒糊丸，如梧子大，每服二十丸，空心溫酒鹽湯任下。

⑫金鎖丹本事方　治夢泄遺精，關鎖不固。

木香一兩半，舶上茴香，胡盧巴，破故紙炒，白龍骨各一兩，胡桃三十箇去殼研如膏，羊腎三對批開，用鹽半兩，擦炙熟搗研如膏。右爲末，和二膏研勻，酒浸蒸餅杵熟，丸如梧桐子大，每服三五十丸，空心鹽湯下。

⑬固眞丹寶鑑　治證同上。

晚蠶蛾二兩，肉蓯蓉，白茯苓，益智各一兩。龍骨半兩另研。右爲細末，用鹿角膠酒浸化開，丸如梧桐子大，每服三粒，空心溫酒下，乾物壓之。

⑭既濟丹　治水火不濟，心有所感，白濁遺精，虛敗不禁，腎虛不攝精髓，久而不治，若更多服熱藥，遂

㊄摶金散　夫便濁之疾，皆緣心腎水火不濟，或因酒色，遂至以甚，謂之土淫，蓋心有虛熱而腎不足，故土邪干水，史載之嘗言夏則土燥而水濁，冬則土堅而水清，此其理矣。醫者往往峻補其疾，反甚，此方中和服之，使水火既濟，而土自堅，其流清矣。

人參，　龍骨煆各一兩。　白茯苓，　絡石各二兩。　右爲細末，每服一錢，空心用米飲調下，臨睡再服。

㊅坎離丹　既濟水火，滋補心腎，止白濁夢遺。

酸棗仁淨肉研，　辰砂各一兩，　乳香半兩研，　附子一箇炮去皮臍。　右爲細末，研勻，煉蜜爲丸，如雞頭實大，每服五丸，燈心湯溫酒送下，須是臘月合，以磁器收之。

㊆三仙丸　治夢泄。

益智仁二兩，用鹽二兩炒去鹽，　烏藥一兩半炒，　山藥一兩爲末打糊。　右爲細末，用山藥末煮糊和丸，如梧桐子大，每服五十丸，空心臨睡用鹽湯送下，以硃砂末爲衣。凡病精泄不禁，自汗頭眩，虛極，或寒或熱，用補澀之藥，不效，其脈浮軟而散，蓋非虛也，亦非房室過度，此無他，心有所覩，因有所慕，意有所樂，慾想方興，不遂所欲，而致斯疾。既以藥補且固，不效，將何治之？緣心有愛則神不歸，意有想則志不甯，當先和榮衛，榮衛和則心安，次調其脾，脾氣和則志舍定，心腎交媾，精神內守，其病自愈。其法用人參三錢，當歸一錢，洗焙爲末，作三服，糯米飲調服。服畢自汗止而寒熱退，頭眩未除，川芎三錢，人參一錢，焙爲末，作三服，沸湯調服，頭眩遂瘥。精不禁者，用白芍藥半兩，丁香、木香各三錢，剉散，每服用生薑五片，棗二枚，以水同煎，空心服，即心安神定，精固神悅。

㊇赤脚道人龍骨丸　治白濁。

龍骨，　牡蠣各半兩。　右研爲末，同入鯽魚腹內，用紙裹入火內炮熟，取出去紙，將藥同魚肉搜和丸，如梧桐子大，

茯苓，　黃芩各六分。　甘草四分，　右剉水二盞，煎藥至一盞半入大黃煎至七分去滓下硭硝攪勻空心服

(八二)紫石英丸直方　治虛勞，夢與鬼交失精虛竭至甚。

麝香半兩研，　紫石英水飛，　桑螵蛸炒，　人參，　龍骨，　柏子仁別研各二兩。　硃砂細研水飛，　肉蓯蓉酒浸一宿，刮去皺皮炙乾，各一兩。　右爲細末，入別研藥，令勻煉蜜和搗二三百杵，丸如梧桐子大每服二十丸，食前用溫酒送下。

(八三)沉香散三因方下同　治膏淋臍下妨悶，不得快利。

沉香，　陳皮湯浸去白焙，　黃芪各七錢半。瞿麥三兩，　榆白皮，　韭子炒，　滑石各一兩。　黃芩，　甘草炙各半兩。　右爲細末，每服二錢食前用清粥飲調服。

(八四)沉香丸　治膏淋。

沉香，肉蓯蓉酒浸切焙，　荊芥穗，　黃芪，　磁石火煆酢淬三七次，　滑石各一兩。　右爲末，蜜丸如桐子大，每服三十丸，溫酒送下。

(八五)磁石丸　治膏淋。

澤瀉，　肉蓯蓉酒浸去鱗甲切焙，　滑石末，　磁石火煆酢淬三七次各一兩。　丸服法同上。

(八六)海金砂散　治膏淋。

海金砂，　滑石各一兩爲末，　甘草二錢半爲末。　右研勻，每服二錢，食前煎麥門冬湯調服，燈心湯亦可。

(八七)地黃丸　治腎虛勞，膀胱結淋濇。

生地黃切焙，　黃芪各一兩半。　防風，　黃芩，　遠志甘草水煮，　茯神去木淨，　鹿茸去毛酥炙，　苦蔞各一兩。

致日增其病，腰脚無力，日漸羸弱。

天門冬去心焙， 桑螵蛸蜜炙， 黃連去鬚， 雞膍胵炒， 麥門冬去心焙， 海螵蛸蜜炙， 遠志， 牡蠣煅， 五色龍骨， 澤瀉各一兩。 右爲細末，煉蜜丸如梧子大，硃砂爲衣，每服三十丸，空心用燈心棗湯吞下，日二三服。

(十五)桂枝加龍骨牡蠣湯金匱下同 夫失精家少腹弦急，陰頭寒，目眩髮落，脈極虛芤、遲，爲清穀亡血失精，脈得諸芤動微緊，男子失精，女子夢交，此方主之。

桂枝， 芍藥， 生薑， 龍骨煅， 牡蠣煅各三兩， 甘草二兩， 大棗十二枚。 右七味，以水七升，煮取三升，分溫三服。

(十六)天雄散 治失精。

天雄炮， 龍骨各三兩， 白朮八兩， 桂枝六兩。 右四味，杵爲散，酒服半錢匕，日三服。不止，稍增之。

(十七)滑石散直指方 治沙石淋，痛如割。

滑石， 石膏各三錢。 石葦， 瞿麥， 木通， 蜀葵子各二錢。 右爲末，每服二錢，以葱白二莖，燈心一握，蜜一匙，煎湯空心調下。

(十八)硼砂散 治沙石淋急痛。

硼砂， 琥珀， 赤茯苓， 蜀葵子， 陳皮各三錢。 右爲末，每二錢以葱白一莖，麥門冬二十粒，蜜一匙煎湯空心調下。

(十九)秋石丸直指方 治濁氣干清精散而成膏淋，黃赤白黯，如肥膏油蜜之狀。

白茯苓一兩， 桑螵蛸炙， 鹿角膠， 秋石各五錢。 右爲末，糯糊和丸梧子大，空心人參湯下五十丸。

錢水一盞煎至六分去滓食前溫服

㊃牛膝膏　治死血作淋

桃仁去皮炒，當歸尾酒洗各一兩，川芎五錢，牛膝四兩酒浸，赤芍藥，生地黃酒洗各兩半，俱剉用甜水十鍾，炭火慢慢煎至二鍾，入麝香少許，分作四服，空心服。如夏月，用涼水浸之不壞。

㊄神效琥珀散　治石淋，水道澀痛，頻下沙石。

琥珀，桂心，滑石，大黃微炒，葵子，膩粉，木通，木香，磁石火煅酒淬七次水飛各半兩。右爲細末，每服二錢，用燈心葱白湯調下。

㊅如聖散　治沙淋。

馬蘭花，麥門冬去心，白茅根，車前子，甜葶藶，苦葶藶炒，檀香，連翹各等分。右爲細末，每服四錢，水煎服。如渴，加黃芩同煎，入燒鹽少許服。

㊆立效散　治小便淋閉作痛，有時尿血，下焦結熱。

瞿麥穗，山梔子炒，甘草各三錢。右作一服，水二鍾，煎至一鍾，食前服。

㊇白芍藥丸　治勞淋，小腹疼痛，小便不利。

白芍藥，熟地黃，當歸，鹿茸各一兩。右爲細末，煉蜜爲丸，如梧桐子大，每服三十丸，阿膠湯送下。

㊈肉蓯蓉丸　治冷淋。

肉蓯蓉，牛膝並酒浸切焙，熟地黃，山藥，石斛，官桂，檳榔各半兩，附子炮去皮臍，黃芪炙各一兩，細辛，甘草炙各二錢半，黃連七錢半。右爲細末，蜜丸，如梧子大，每服二十丸，鹽酒下。

㊉必效散醫鑑下同　治一切淋。

石葦，當歸焙各半兩。赤芍藥，戎鹽研，蒲黃，甘草炙各七錢半。車前子，滑石各二兩，人參一兩二錢半。右爲細末，煉蜜爲丸如桐子大，每服二十丸，食前溫酒下，鹽湯亦可。

(八八)地膚子湯濟生方　治諸病後體虛觸熱，熱結下焦，遂成淋疾，小便赤澀數，起少出，莖痛如刺，或尿出血。

地膚子，猪苓各一錢半，海藻洗去鹹，通草，甘草梢，瞿麥去梗，黃芩，知母，枳實麸炒，升麻，葵子各一錢。右作一服，水二鍾，生薑三片，煎一鍾，不拘時服。千金方無甘草梢。

(八九)石葦散和劑局方　治腎氣不足，膀胱有熱，水道不通，淋瀝不宣，出少起數，臍腹急痛，蓄作有時，勞倦即發，或尿如豆汁，或便出砂石，並皆治之。

芍藥，白朮，滑石，葵子，瞿麥，石葦去毛，木通各二兩。當歸，甘草炙，王不留行各一兩。右爲細末，每服二錢，煎小麥湯調下，日二三服，空心下。千金方無當歸，治一切淋。

(九〇)麥門冬散　治心熱氣壅，澀滯成淋，臍下妨悶。

麥門冬去心，木通，赤芍藥，葵子各一兩，滑石二兩，芒硝一兩半。右爲散，每服四錢，水一盞，薑一片，葱白二莖，煎六分，去滓，食前溫服。

(九一)四汁飲　治熱淋，小便赤澀，疼痛。

葡萄自然汁，生藕汁，生地黃汁，白蜜各五合。右和勻，每服七分，於銀石器內慢火熬沸，不拘時溫服。

(九二)瞿麥湯頁方下同　治氣淋澀滯。

瞿麥穗，黃連，大黃蒸，枳殼麸炒，當歸焙，羌活，木通，牽牛，延胡索，桔梗，大腹皮，射干各一

㉘秘精丸丹溪　一名固精丸，治下虛脬寒，小便白濁。

牡蠣煅，菟絲子酒製，龍骨生，五味子，韭子炒，茯苓，白石脂煅，桑螵蛸酒炙各等分。右爲細末，酒糊和勻，丸如梧子大，空心鹽湯下七八十丸。

㉙固本丸正傳　治小便濁。

甘草炙三兩，猪苓二兩半，白茯苓，縮砂，益智仁，半夏薑製，黃檗炒各一兩，黃連，蓮花蕊各二兩。右爲末，湯浸蒸餅和丸，梧子大，空心溫酒下五七十丸。

㉚加味清心飲同春　治心熱小便赤濁。

蓮肉，白茯苓各一錢半，益智仁，麥門冬，遠志，人參各八分，石菖蒲，車前子，白朮，澤瀉，甘草各五分。右剉作一貼，入燈心二十莖，空心水煎服。

㉛妙應丸丹溪　治赤白濁。

菟絲子酒製，桑螵蛸酒炙，川楝肉各五錢，牡蠣煅三錢，龍骨，辰砂，石菖蒲，白茯苓，益智仁，蓮肉，縮砂各二錢半。右爲末，山藥糊和丸，梧子大，午間人參酸棗仁湯下五七十丸，臨臥粳米湯下五十丸。

㉜水火分清飲醫鑑　治赤白濁。

赤茯苓一錢，益智仁，萆薢，石菖蒲，猪苓，車前子，澤瀉，白朮，陳皮，枳殼麩炒，升麻各七分，甘草五分。右剉一貼，酒水相半，煎，空心服。

㉝桑螵蛸散直指方　小便白如稠米泔，日數十次，心神恍惚瘦瘁，此以女勞得之也。

桑螵蛸鹽水拌蒸，遠志薑製，石菖蒲鹽炒，龍骨煅另研，小麥，白茯苓，當歸酒洗焙，鼈甲酒炙各五

當歸，生地黃，赤茯苓，滑石，牛膝，枳殼，山梔仁，麥門冬，萹蓄，木通，知母酒炒，黃蘗酒炒各七分，甘草五分。右剉作一貼，入燈心一團，空心水煎服。

㉛海金沙散　治五淋一服如神。

當歸酒洗，大黃酒浸，牛膝酒洗，木香，雄黃，海金沙各五錢。右為末，每二錢，臨臥好酒調下。

㉜星半蛤粉丸入門下同　治濕熱白濁

蛤粉二兩，南星薑製，半夏薑製，蒼朮，青黛各一兩。右為末，薑汁煎神麴作糊和丸，梧子大，空心薑湯下五七十丸。

㉝樗蘗丸　治澀腸濕熱痰火，小便濁。

黃蘗二兩，樗根皮一兩，青黛，乾薑各三錢，滑石，蛤粉，神麴各五錢。右為末，神麴糊丸，梧子大，空心白湯下五七十丸。

㉞金蓮丸　一名瑞蓮丸，治思慮傷心，小便赤濁。

石蓮肉，白茯苓，龍骨，天門冬，麥門冬，柏子仁，當歸，酸棗仁，紫石英，遠志，乳香，龍齒各一兩。右為末，蜜丸梧子大，朱砂為衣，空心溫酒或棗湯下七十丸。

㉟萆薢分清飲　治小便白濁凝脚如糊。

甘草五分，石菖蒲，烏藥，益智仁，萆薢，白茯苓各一錢。右剉作一貼，空心入鹽一捻，水煎服。

㊱蒼朮難名丹直指方　治脾精不禁，小便白濁，淋瀝不止，手足乏力，腰背痠疼。

蒼朮製四兩，茴香炒，川楝子肉各七錢半。川烏炮，破故紙炒，白茯苓，龍骨各一兩。右為末，酒麪糊

左腎之元陰而精血自充矣，宜此方主之。

大懷熟八兩，山藥炒，枸杞，山茱萸肉，菟絲製，鹿膠炒珠，龜膠炒珠各四兩無火者不用。川牛膝酒洗蒸熟三兩。精滑者不用 右先將熟地蒸爛，杵膏加煉蜜丸，梧桐子大，每食前用滾湯或淡鹽湯送下百餘丸。

㊂右歸丸 治元陽不足，或先天稟衰，或勞傷過度，以致命門火衰，不能生土而爲淋濁遺精等證。

大懷熟八兩，山藥炒，枸杞微炒，菟絲子製，鹿角膠炒珠，杜仲薑汁炒各四兩，山萸微炒，當歸各三兩。便溏勿用。 肉桂二兩，漸可加至四兩，製附子自二兩漸可加至五六兩。 右丸法如前，或丸如彈子大，每嚼服二三丸，以滾白湯送下，其效尤速。

㊂五福飲 凡五臟氣血虧損而致夢遺者，此能兼治之，足稱王道之最。

當歸二三錢，白朮炒一錢半，炙甘草一錢，人參隨宜，熟地隨宜，水二鍾煎七分，食遠温服，或加生薑三五片。凡治氣血俱虛等證，以此爲主，或宜温者加薑附，宜散者加升麻柴葛，左右逢源，無不可也。

㊂加減一陰煎 此治水虧火勝之劑，故曰一陰。凡腎水眞陰虛損而脈證多陽虛火發熱，及陰虛遺濁等證。

生地，芍藥，麥冬各二錢。熟地三五錢，炙甘草五七分，知母，地骨皮各一錢。水二鍾煎服。

㊂二陰煎 治心經有熱淋濁遺精，水不制火之病，故曰二陰。

生地，麥冬各二三錢。棗仁二錢，生甘草，黃連各一錢，元參，茯苓，木通各一錢半。水二鍾，加燈草二十根，或竹葉亦可，煎七分，食遠服。

㊃苓朮二陳煎 治痰飲水氣停畜心下，嘔吐吞酸，白濁遺精等證。

錢，甘草炙二錢半。右爲末，每二錢，臨臥以人參茯苓桑白皮煎湯調下。蓋桑皮行水，接螵蛸歸腎經之意也。

㉔內補鹿茸丸寶鑑下同　治勞傷思想，陰陽氣虛，益精髓，止白淫。

鹿茸酥炙，菟絲子酒浸蒸焙，蒺藜炒，紫菀，沙苑蒺藜，肉蓯蓉，蛇牀子酒浸蒸，黃芪，桑螵蛸，陽起石，附子炮，官桂各等分。右爲細末，蜜丸，桐子大，每服三十丸，食前溫酒下。

㉕水陸二仙丹　治白濁。

金櫻子去子洗淨，甑中蒸熟，用湯淋之，取汁入銀銚內，慢火熬稀膏，芡實肉研爲粉，各等分。右以前膏同酒糊和芡粉爲丸，如梧桐子大，每服三十丸，食前溫酒下。一方用乳汁丸，鹽湯下。

㉖地黃丸　治心腎水火不濟，或因酒色，遂至已甚，謂之土淫。蓋脾有虛熱而腎不足，故土邪干水，先賢常言夏則土燥而水濁，冬則土堅而水清，此其理也。醫者往往峻補，其疾反甚，此方中和水火，既濟而土自堅，其流清矣。

熟地黃十兩，九蒸九曝，附子炮去皮臍一兩，菟絲子酒浸曬乾，鹿角霜各五兩，白茯苓，柏子仁各三兩。右爲細末，另用鹿角膠煮糊爲丸，如梧桐子大，每服一百丸，空心用鹽酒送下。

㉗子午丸　治心腎俱虛，夢寐驚悸，體常自汗，煩悶短氣，悲憂不樂，消渴引飲，漩下赤白，停凝濁甚，四肢無力，面黃肌瘦，耳鳴眼昏，頭運惡風，怯寒，並皆治之。

榧子肉二兩，蓮肉去心，枸杞子，白龍骨，巴戟，破故紙炒，琥珀另研，楮實，白礬枯，赤茯苓，白茯苓，蓮花鬚鹽蒸，白牡蠣煅，芡實，文蛤各一兩，硃砂一兩半另研爲末。右爲細末，用肉蓯蓉一斤二兩酒蒸爛研膏，和丸如桐子大，硃砂爲衣，每服五十丸，空心濃煎萆薢湯下。忌勞力房事，專心服餌，渴止濁清奇效。

遠志炒八分，山藥炒，芡實炒，金櫻子去核，棗仁炒搗碎各二錢。白朮炒，茯苓各錢半，炙甘草一錢，人參一二錢，五味十四粒。畏酸者去之。水二鍾，煎七分，食遠服。此治久遺無火不動而滑者乃可用之，如尙有火覺熱者，加苦參一二錢。

㉝固陰煎　治陰虛滑泄帶濁淋遺等證，此方專主肝腎。

人參隨宜，熟地黃三五錢，山藥炒二錢，山茱萸一錢半，遠志炒七分，炙甘草一二錢，五味十四粒，菟絲子炒香二三錢。水二鍾，煎七分，食遠溫服。

㉞菟絲煎　治心脾氣弱，凡遇思慮勞倦，卽苦遺精者。宜此。

人參二三錢，山藥炒二錢，當歸，棗仁炒，茯苓各錢半。菟絲子製四五錢，遠志製四分，炙甘草一錢或五分。右用水一鍾半，煎成，加鹿角霜末四五匙，調服，食前。或加白朮一二錢。

㉟苓朮菟絲丸　治脾腎虛損，不能收攝，以致夢遺精滑，及困倦等證。

白茯苓，白朮米泔洗炒，蓮肉去心各四兩，五味酒蒸，山藥炒各二兩。杜仲酒炒三兩，菟絲子淘淨酒浸一日，煮極爛，搗爲餅，焙乾十兩，炙甘草五錢。右用山藥末以陳酒煮糊爲丸，梧子大，空心滾白湯或酒下百餘丸。

猪苓，澤瀉，茯苓各一錢半。半夏二三錢，炙甘草八分，乾薑炒黃，白朮各一二錢。陳皮一錢，水一鍾半煎服。

㉕小分清飲　治小水不利淋濁等證，此方主之。

茯苓，澤瀉，猪苓各二三錢。薏仁二錢，枳殼，厚朴各一錢。水一鍾半，煎七八分，食前服。

㉖抽薪飲　治淋濁遺精火熾盛而不宜補者。

黃芩，石斛，木通，梔子炒，黃檗各一二錢。枳殼，澤瀉各錢半。細甘草三分。水一鍾半煎七分，食遠溫服。內熱甚者冷服佳。

㉗徙薪飲　治一切內熱未甚者，宜以此劑。甚者宜抽薪飲。

陳皮八分，黃芩二錢，麥冬，芍藥，黃檗，茯苓，牡丹皮各一錢半。水一鍾半，煎七分，食遠溫服。

㉘大分清飲　治積熱閉結，淋閉等證。

茯苓，澤瀉，木通各二錢。猪苓，梔子，或倍之。枳殼，車前子各一錢。水一鍾半，煎八分，食遠溫服。

㉙菉豆飲　凡火熱極不能退者，用此最妙。

菉豆不拘多寡，寬湯煮糜爛。右入鹽少許，或蜜亦可，待冰冷或厚或稀，或湯，任意飲食之，日或三四次不拘。此物性非苦寒，不傷脾氣，且善於解毒、除煩、退熱、止渴，大利小水，乃淺易中之最佳最捷者也。若火盛口甘，不宜厚味，但略煮半熟，清湯冷飲之尤善。除煩清火。

㉚五君子煎　治脾胃虛寒，土濕淋濁者。

人參二三錢，白朮，黃土炒，白茯苓各二錢。炙甘草一錢，乾薑炒黃一二錢，水一鍾半煎服。

醫部彙考二百七十

淋濁遺精門三

單方

小便淋痛，用眞定瓷器煆研二兩，生熟地黃末各一兩，每用二錢，木通煎湯服。適用方。

卒淋不通，好墨燒一兩爲末，每服一錢，溫水服。普濟方。

小便氣淋，比輪錢三百文，水一斗煑取三升，候溫服之。千金方。

沙石淋痛，古文錢煑汁服。普濟方。

小便淋疾，溫水和雲母粉服三錢。

血淋，沙淋，小便澀痛，用黃爛浮石爲末，每服二錢，生甘草煎湯調服。直指方。

石淋破血浮石滿一手爲末，以酢一升，水三升和煑二升，澄淸，每服一升愈。適用方。

石淋取細白砂三斤炒熱，以酒三升淋汁服一合，日再服。

小便淋痛，石燕子七枚搗黍米大新桑根白皮三兩拌勻分作七貼，每貼用水一盞煎七分，空心午前各一服。濟衆方。

[illegible]白濁腹滿，不拘男婦，[illegible]

小便淋瀝，生續斷搗絞汁服，即馬薊根也。古今錄驗

小便血淋，苧根煎湯，頻服，大妙，亦治諸淋。聖惠方。

五種淋疾，苧蔴根兩莖打碎，以水一碗半煎半碗，頓服即通，大妙。斗門方。

沙石熱淋，馬藺花七枚，燒故筆頭二七枚，燒粟米一合炒爲末，每服三錢酒下，日二服，名通神散。

男婦血淋，亦治五淋多年，煮酒瓶頭箬葉三五年至十年者尤佳，每用七箇燒存性，入麝香少許，陳米飲下，日三服。

有人患此，二服愈。百一選方。

尿白如注，小腹氣痛，茶籠內箬葉燒存性，入麝香少許，米飲下。經驗方。

血淋澀痛，芭蕉根，旱蓮草各等分，水煎服。聖惠方下同。

小便血淋，生地黃汁，車前葉汁各三合，和煎服。

小便淋痛，或尿血，或砂石脹痛，用川牛膝一兩，水二盞煎一盞，溫服。一婦人患此十年，服之得效。杜牛膝亦可，或入

麝香，乳香爲良。

小便血淋，葵子一升，水三升煮汁，日三服。千金方。

小便淋痛，葵花根洗剉，水煎五七沸服，神效。寶鑑。

小便血淋，蜀葵花根二錢，車前子一錢，用水煮，日服之。簡便單方。

石淋破血，五月五日收葵子炒研，食前溫酒下一錢，當下石出。聖惠方。

沙石淋痛，黃蜀葵花一兩，炒爲末，每米飲服一錢，名獨聖散。普濟方。

小便淋濁或不通，地膚草搗自然汁服之愈，或水煎服之。

血淋心煩，石燕子，商陸，赤小豆，紅花等分爲末，每服一錢，葱白湯調下。

漏精血濁，雪白鹽一兩，幷藥緊固濟煅一日出火毒，白茯苓山藥各一兩爲末，棗肉和蜜丸梧子大，每棗湯下三十丸。蓋甘以濟鹹，脾腎兩得也。

五種淋疾，勞淋，氣淋，血淋，熱淋，石淋，及小便不通至甚者，用透格散，硝石一兩，不夾泥土，雪白者生研爲末，每服二錢，各依湯使，勞淋勞倦虛損，小便不出，小腹急痛，葵子末煎湯下，通後便須服補虛丸散。小便不出，時下血，疼痛滿急，血淋也，小便熱赤色，臍下急痛，熱淋也，幷用冷水調下。氣淋小腹滿急，尿後常有餘瀝，木通煎湯下。石淋莖內痛，尿不能出，內引小腹膨脹急痛，尿下砂石，令人悶絕，將藥末先入撈勻隔紙炒至紙焦爲度，再研用溫水調下。小便不通，小麥湯下。卒患諸淋，只以冷水下，幷空心調藥，使硝如水乃服之。靈苑方。

氣虛白濁，黃芪鹽炒半兩，茯苓一兩，爲末，每服一錢，白湯下。經驗良方。

沙淋石淋，人參焙，黃芪鹽水炙等分爲末，用紅皮大蘿蔔一枚，切作四片，以蜜二兩，將蘿蔔逐片蘸炙，令乾再炙，勿令焦，以蜜盡爲度，每用一片蘸藥食之，仍以鹽湯送下，以瘥爲度。三因方。

小便卒淋，萎蕤一兩，芭蕉根四兩，水二大椀煎一椀半，入滑石二錢，分三服。聖惠方。

小便卒淋，紫草一兩爲散，每食前用井華水服二錢。千金翼。

血淋熱痛，黃芩一兩，水煎熱服。千金方。

小便血淋濇痛，山慈姑花同地蘗花陰乾，每用二錢，水煎服。聖惠方。

小便熱淋，白茅根四升，水一斗五升，煮取五升，適冷暖飲之，日三服。肘后方。

血淋熱淋，白薇芍藥各一兩爲末，酒服方寸匕，日三服。千金方。

小便氣淋，結澀不通，白芷醋浸焙乾二兩爲末，煎木通甘草酒調下一錢，連進二服。普濟方。

小便石淋，葛葎掘出根挽斷，以杯於坎中承取汁服一升，石當出，不出更服。范汪方

五淋澁痛，赤藤，卽做草鞋者，白茯苓苧麻根等分爲末，百沸湯下，每服一錢如神。究原方。

小便淋痛，石葦，滑石等分爲末，每飲服刀圭最駛。聖惠方。

小便血淋，酸草搗汁煎五苓散服之，俗名酢啾啾是也。百一選方。

諸淋赤痛，三葉酸漿草洗研，取自然汁一合，酒一合，和匀，空心溫服立通。靈苑方。

小便血淋，血風草井水擂服，三度，卽愈。經驗方。

又方。乳石發動，小便淋瀝，心神悶亂，船底青苔半雞子大煎汁，溫服，日三四次。聖惠方。

小便沙淋，屋上瓦松煎濃湯，乘熱熏洗小腹，約兩時卽通。經驗良方。

熱淋莖痛，馬藺子，蔓菁子各五合，炒黃，緋袋盛，以井華水三升浸之，每食前服一錢。聖惠方。

五淋澀痛，冬麻子半斤研碎，水濾取汁，入粳米二合煮稀粥，下葱椒鹽豉，空心食。心鏡。

熱淋脹痛，麻皮一兩，炙甘草三分，水二盞煎一盞服，日二，取效。聖惠方

老人五淋，身熱腹滿，小麥一升，通草二兩，水三升，煮一升，飲之卽愈。奉親書。

男子白濁，蕎麥炒焦爲末，雞子白和丸，梧子大，每服五十丸，鹽湯下，日三服，名濟生丹。

夜小便腳停白濁，老人虛人多此證，令人卒死，大能耗人精液，主頭昏重，用糯米五升，炒赤黑，白芷一兩爲末，糯粉糊丸，梧子大，每服五十丸，木饅頭煎湯下。無此用局方補腎湯下。若後生稟賦怯弱，房室太過，小便太多，水管蹇澀，

小便如膏脂，入石菖蒲，牡蠣粉甚效，名白糯丸。經驗良方。

小便白濁，糯稻草煎濃汁，露一夜服之。摘元妙方。

小便石淋，宜破血瞿麥子搗爲末，酒服方寸匕，日三服，三日當下石出。外臺祕要。

小便血淋作痛，車前子曬乾爲末，每服二錢，車前葉煎湯下。普方。

石淋作痛，車前子一升，以絹袋盛，水八升，煑取三升，服之，須臾石下。肘后方。

老人淋病，身體熱甚，車前子五合，綿裹，煑汁，入青粱米四合，煑粥食，常服明目。壽親養老書。

小便五淋，苦杖爲末，每服二錢，用飯飲下。集驗方。

熱淋濇痛，扁竹煎湯頻飲。生生編。

男婦諸般淋疾，苦杖根洗淨，剉一合，以水五合，煎一盞，去查，入乳香麝香少許服之，神效。

熱淋急痛，海金沙草陰乾爲末，煎生甘草調服二錢。一方加滑石。夷堅志

膏淋如油，海金沙滑石各一兩，甘草梢二錢半，爲末，每服二錢，麥門冬煎湯服，日二次。仁存方。

血淋痛澀，海金沙末，新汲水或砂糖水服一錢。普濟方。

赤白濁淋，好大黃爲末，每服六分，以雞子一箇，破頂入藥，攪勻，蒸熟，空心食之，不過三服愈。簡便方。

溲數白濁，熟附子爲末，每服二錢，薑三片，水一盞，煎六分，溫服。普濟方。

白濁夢遺，半夏一兩，洗十次，切破，以木豬苓二兩同炒黃，出火毒，去豬苓，入煅過牡蠣一兩，以山藥糊丸，梧子大，每服三十丸，茯苓湯送下。腎氣閉而一身精氣無所管攝，妄行而遺者，宜用此方。蓋半夏有利性，豬苓導水，使腎氣通也，與下元虛憊者不同。本事方。

小便淋瀝，菟絲子煑汁飲。范汪方。

小便赤濁，心腎不足，精少血燥，口乾煩熱，頭運怔忡，菟絲子麥門冬等分爲末，蜜丸梧子大，鹽湯每下七十丸。

小便血淋，牽牛二兩，半生半炒，爲末，每服二錢，薑湯下，良久熱茶服之。

又方。用白柿,烏豆,鹽花煎湯入墨汁服之。經驗。

熱淋澀痛,乾柿燈心等分,水煎日服。朱氏方。

小便白濁,生白果仁十枚,搗水飲,日一服,取效止。

石淋痛楚,便中有石子者,胡桃肉一升,細米煮漿粥一升相和,頓服即瘥。海上方。

冷淋莖痛,槲葉研末,每服三錢,水一盞,葱白七寸煎六分,去查,食前溫服,日二。孫眞人方。

小便淋痛,麪煨檳榔,赤芍藥各半兩爲末,每服三錢,入燈心,水煎空心服,日二服。十便良方。

血淋作痛,檳榔一枚,以麥門冬煎湯,磨濃汁一盞,頓熱空心服,日二服。

膏痹尿多,其人飲少,用秦椒二分出汗,瓜蔕二分,爲末,水服方寸匕,日三服。傷寒類要。

沙石淋痛,胡椒朴硝等分爲末,每服用二錢,白湯下,日二,名二拗散。普濟。

五淋血淋,用野葡萄藤,竹芫荽,淡竹葉,麥門冬連根苗,紅棗肉,燈心草,烏梅,當歸各等分,煎湯代茶飲之妙。百一選方。

男婦熱淋,野葡萄根七錢,葛根三錢,水一鍾煎七分,入童子小便二分,空心溫服。乾坤祕韞。

小便熱淋,生藕汁,生地黃汁,葡萄汁各等分,每服一盞,入蜜溫服。

小便血淋,蓮房燒存性爲末,入麝香少許,每服二錢半,米飲調下,日二。經驗良方。

淋癃溺血,取乳香中夾石者研細,米飲服一錢。得效方。

尿渾白濁,用厚朴薑汁炙一兩,白茯苓一錢,水酒各一碗,煎一碗,溫服。經驗良方。

腎消膏淋,病在下焦,苦楝子茴香等分,炒爲末,每溫酒服一錢。聖惠。

小便淋閉,皂角刺燒存性,破故紙等分爲末,無灰酒服。聖濟總錄。

五淋澀痛，青粱米四合，入漿水煮粥，下土蘇木三兩，每日空心食之。

沙石熱淋，痛不可忍，用薏苡仁或子葉根皆可，用水煎熱飲，夏月冷飲，以通爲度。楊氏經驗方。

小便血淋，大豆葉一把，水四升，煮二升服。聖惠方。

熱淋血淋，不拘男女，用赤小豆三合，慢炒爲末，煨葱一莖，擂酒熱調，三錢服。修眞祕旨。

老人淋痛，青豆二升，橘皮二兩，煮豆粥，下麻子汁一升，空心漸食之，并飲其汁甚驗。養老書。

急淋陰腫，泥葱半斤，煨熟杵爛，貼臍上。外臺。

小便淋澀，或有白者，以赤根樓葱近根截一寸許，安臍中，以艾灸七壯。經驗方。

小便淋瀝，或有或無，用大蒜一箇，紙包煨熟，露一夜，空心新水送下。集驗方。

小便白濁，生蘿蔔剜空留蓋，入吳茱萸塡滿，蓋定簽住，糯米飯上蒸熟，取去茱萸，以蘿蔔焙研末，糊丸梧子大，每服五十丸，鹽湯下，日三服。普濟方下同。

沙石諸淋，疼不可忍，用蘿蔔切片，蜜浸少時，炙乾數次，不可過焦，細嚼鹽湯下，日三服，名瞑眩膏。

小便淋痛，水芹菜白根者，去葉搗汁，井水和服。聖惠方。

小便卒淋，繁縷草滿兩手，水煮，常常飲之。東陽方。

氣淋脹痛，雞腸草三兩，石葦去毛一兩，每用三錢，水一盞煎服。

小便熱淋，馬齒莧汁服之。聖惠。

血淋疼痛，茄葉熏乾爲末，每服二錢，溫酒或鹽湯下，隔年者尤佳。經驗良方。

男子白濁，陳冬瓜仁炒爲末，每空心米飲服五錢，即愈。救急易方。

不淋痛澀，鬚髮燒存性研末，每服用一錢匕，井水服之。

血淋苦痛，亂髮燒存性二錢，入麝香少許，用米飲服之。聖惠。

小便血淋，海螵蛸末一錢，生地黃汁調服。

又方。海螵蛸，生地黃，赤茯苓等分爲末，每服一錢，柏葉車前湯下。經驗良方。

石淋破血，牛角燒灰酒服方寸匕，日五服。總錄。

卒患淋疾，牛耳中毛燒取半錢，水服，尾毛亦可。集驗方。

下石淋，用燕屎末以冷水服五錢，旦服，至食時當尿石水下。

遺精白濁，盜汗虛勞，桑螵蛸炙，白龍骨等分爲細末，每服二錢，空心用鹽湯送下。外臺祕要。

熱淋如血，蠶種燒灰，入麝香少許，水服二錢，極效方也。衞生家寶。

血淋疼痛，晚蠶蛾爲末，熱酒服二錢。聖惠。

夢中失精，蘇子一升，熬杵研末，酒服方寸匕，日再服，愈。外臺祕要。

腎虛遺精，北五味子一斤，洗淨水浸，挼去核，再以水洗核取盡餘味，通置砂鍋中，布濾過，入好冬蜜二斤，炭火慢熬成膏，瓶收，五日出火性，每空心服一二茶匙，百滾湯下。保壽堂方。

腎虛白濁，及兩脅幷背脊穿痛，五味子一兩炒赤爲末，酢糊丸，梧子大，每酢湯下三十丸。經驗良方。

夢遺溺白，韭子每日生吞一二十粒，鹽湯下。藏器。

虛勞傷腎，夢中洩精，用韭子二兩微炒爲末，食前溫酒服二錢匕。聖惠。

虛勞溺精，用新韭子二升，十月霜後采之，好酒八合漬一宿，以晴明日，童子向南搗一萬杵，平旦溫酒服方寸匕，日

虛勞白濁，榆白皮二升，水二斗煑取五升，分五服。千金。

小便氣淋，榆枝石燕子煎水，日服。普濟方下同。

五淋澀痛，榆白皮陰乾焙研，每以二錢，水五合煎如膠，日二服。

血淋不止，椶櫚皮半燒半炒爲末，每服二錢。衞生家寶方。

小便白濁，構葉爲末，蒸餅丸，梧子大，每服三十丸，白湯下。經驗良方下同。

血淋澀痛，生山梔子末滑石等分，葱湯下。

沙石淋痛，胡椒朴硝等分爲末，每服用二錢，白湯下，日二，名二拗散。普濟。

五淋白濁，螺螄一碗，連殼炒熟，入白酒三碗，煑至一碗，挑肉食之，以此酒下，數次卽效。扶壽精方。

氣結淋病，不通，用好綿四兩燒灰，麝香半分，每服二錢，溫葱酒連進三服。

沙石淋痛，用九肋鼈甲酢炙研末，酒服方寸匕，日三服，石出瘥。肘后方。

小便血淋，蜣螂研水服。鮑氏方。

小便五淋，用石決明去粗皮研爲末，飛過，熟水服二錢，每日二服。如淋中有軟硬物，卽加朽木末五分。勝金方。

小便淋痛，多年木梳燒存性，空心冷水服，男用女，女用男。救急方。

石淋疼痛，雞矢白曬半乾，炒香爲末，以酸漿飲服方寸匕，日二，當下石出。古今錄驗。

虛勞白濁，羊骨爲末，酒服方寸匕，日三。千金。

小便膏淋，羊骨燒研，榆白皮煎湯服二錢。聖惠。

治石淋，用鯉魚齒一斤研末，以三年酢和，分三服，一日服盡。外臺治卒淋，用酒服。

又方熬鹽熱熨小腹，冷復易，亦治小便血。

熱淋，大棗二十七枚，葵根切一升，冬用子，夏用苗，二味以水三升煮取一升二合，分二服，熱加黃芩一兩。出難，加滑石末二兩；血加茜根三兩；痛者，加芍藥二兩，加藥亦加水也。

血淋以水五升煮生大麻根十枚，取二升頓服；亦治小便出血。

沙石淋方。黑豆一百二十粒，生粉草一升，以水煎，乘熱入滑石末一錢，空心服。丹溪下同。

又方。治小便淋痛，下砂石，或赤澀，萱草根用一握，搗取汁服，或嫩苗煮食之亦可。

又方。治淋莖中痛，是肝經氣滯有熱，甘草梢一味，用水煎，空心服。

氣淋臍痛，鹽和醋服之。廣利方。

驚悸遺精，木饅頭炒，白牽牛等分為末，每服二錢，用米飲調下。乾坤祕韞。

勞心夢洩，龍骨、遠志等分為末，煉蜜丸如梧子大，硃砂為衣，每服三十丸，蓮子湯下。心統。

小便白濁，清明柳葉煎湯代茶，以愈為度。集簡方。

心虛夢洩，或白濁，白茯苓末二錢，米湯調下，日二服，蘇東坡方也。直指方。

虛滑遺精，白茯苓二兩，縮砂仁一兩，為末，入鹽二錢，精羊肉批片，摻藥炙食，以酒送下。普濟。

小便淋瀝，由心腎氣虛，神室不守，或夢遺白濁，赤白茯苓等分為末，新汲水飛去沫，控乾，以地黃汁同搗，酒熬作膏，和丸彈子大，空心鹽湯嚼下一丸。三因方。

小便淋瀝，琥珀為末二錢，麝香少許，白湯服之，或萱草煎湯服，老人虛人，以人參湯下亦可；蜜丸，以赤茯苓湯下。普濟。

再服之。外臺祕要。

小便遺精，蓮子心一撮爲末，入辰砂一分，每服一錢，白湯下，日二。醫林集要。

夢寐遺精，乳香一塊，拇指大，臥時細嚼，含至三更嚥下，三五服卽效。

內熱遺精，鐵鏽末冷水服一錢，三服止。活人心統。

心虛遺精，猪心一箇批片相連，以飛過朱砂末摻入，線縛，白水煮熟食之。經驗方。

大便寒滑，小便精出，赤石脂乾薑各一兩，胡椒半兩，爲末，酢糊丸，梧子大，每空心米飮下五七十丸。有人病此，熱藥服至一斗二升，不效，或教服此，終四劑而愈。寇氏衍義。

夢遺便溏，牡蠣粉酢糊丸，梧子大，每服三十丸，米飮下，日二服。丹溪。

腎虛遺精，多汗，夜夢鬼交，用猪腎二枚切開去膜，入附子末一錢，濕紙裹煨熟，空心食之，飮酒一杯，不過三五服效。經驗方。

盜汗遺精，鹿角霜二兩，生龍骨炒，牡蠣煅各一兩，爲末，酒糊丸，梧子大，每鹽湯下四十丸。普濟。

虛勞尿精，白膠二兩炙爲末，酒二升，和溫服。外臺祕要

夢中洩精，狗頭鼻梁骨燒研，臥時酒服一錢。

睡卽洩精，白龍骨四分，韭子五合，爲散，空心酒服方寸匕。梅師方。

小便遺精，蓮子心一撮爲末，入辰砂一分，每服一錢，白湯下，日二。醫林集要。

遺精白濁，晚蠶蛾焙乾去翅足爲末，飯丸，菉豆大，每服四十丸，淡鹽湯下。此丸當以火烘，否則易於糜濕也。唐氏方。

腎虛失精，水膠二兩，研末，酒二碗化服，日三。千金下同。

血淋，氣海丹田各灸三七壯。

醫學綱目曰：遺精白濁夜夢鬼交，取心俞一分，沿皮向外一寸半，先補後瀉，灸不宜多。又取白環俞一寸半，瀉六吸，補一呼。

又法。取白環俞一寸半，灸五十壯，與中極相平，腎俞中極，灸隨年壯。

又法。取腎俞，心俞，膏肓，關元，三陰，不已，取下穴。

腰脊冷，溺多白濁失精，灸脾募三七壯，曲泉。

虛勞失精，陰縮莖中痛，灸大赫三七壯，中封。

遺精五臟虛竭，灸曲骨端四七壯，在陰橫骨中央，曲如月中央是也。

溺血精出，取列缺臥針五分。

導引

古今醫統曰：遺精法，半夜子時分，陽正興時仰臥，瞑目閉口，舌頂上齶，將腰拱起，左手用中指頂住尾閭穴，右手用大指頂住無名指根拳著，又將兩腿俱伸兩腳十指俱摳，提起一口氣，心中存想脊背腦後，上貫至頂門，慢慢直下至丹田方將腰腿脾手從容放下，再照前行，陽則衰矣；如陽未衰，再行二三次，如初行時，陽未興，勉強興之方可行。夫人之所以有虛疾者，因年少慾心太盛，房事過多，水火不能相濟，以致此疾。能行此法，不惟速去洩精之病，久而腎氣上升，心火下降，則水火既濟，永無疾病矣。

又法。遺精不禁，以牀鋪安短窄臥如弓，彎二膝并臍縮，或左或右側臥，用手扎陰囊，一手伏丹田，切須甯心靜臥，戒

小便熱淋，馬薊根搗汁服。聖惠。

五種淋疾，苧麻根兩莖打碎，以水一椀半煎半椀，頓服即通，大妙。斗門方。

小便淋閉，服血藥不效者，用牡蠣粉，黃蘗炒等分爲末，每服一錢，小茴香湯下，取效。集成。

小便淋瀝，痛不可忍，雞肫內黃皮五錢，陰乾燒存性，作一服，白湯下立愈。集要下同。

遺精白濁，白菓蓮肉江米各五錢，胡椒一錢，爲末，烏骨雞一隻，如常治淨，裝雞腹內，煑熟，空心食之。

小便遺精，蓮子心一撮，爲末，入辰砂一分，每服一錢，白湯下，日二。

鍼灸

千金方曰：氣淋，臍中著鹽，灸二壯。

又法，灸關元五十壯，又灸俠玉泉相去一寸半，三十壯。

石淋臍下三十六種病，不得小便，灸關元三十壯，又灸氣門三十壯，又灸水泉三十壯，足大敦是也。

勞淋，灸足太陰百壯，在內踝上三寸，三報之。

血淋，灸丹田，隨年壯，又灸伏留五十壯。一云隨年壯。

五淋不得小便，灸懸泉十四壯，穴在內踝前一寸，斜行小脈上，是中封之別名。

五淋，灸大敦三十壯。

卒淋，灸外踝尖七壯。

淋病，九部諸疾，灸足太陽五十壯。

癃。閉謂小溲不行，癃爲淋瀝。此乙木之病，非小腸與腎也。木爲所抑，火來乘之，故熱在脬中，下焦爲之約，結成沙石，如湯瓶煎煉日久，熬成湯鹻。夫羊豕之脬吹氣令滿，常不能透，豈有眞沙石而能漏者邪？故知前人所說，服五石丸散而致者，恐未盡然。經曰：木鬱則達之，先以瓜蔕散越之，次以八正散加湯鹻等分頓啜之，沙石自化而下。

屈村張氏小兒年十四歲，病約一年半矣，得之麥秋，發則小腸大痛，至握其莖，跳躍轉旋，號呼不已，小溲數日不能下，下則成沙石，大便祕澀，肛門脫出一二寸。諸醫莫能治，乃負其子而哀請戴人。戴人曰：『今日治，今日效。』時日在辰巳間矣，以調胃承氣僅一兩，加牽牛頭末三錢，汲河水煎之，令作三五度嚥之。又服苦末丸，如芥子許六十粒，日加晡，上涌下泄，一時齊出，有膿有血。涌瀉既覺定，令飲新汲水一大盞，小溲已利一二次矣，是夜凡飲新水二三十遍，病去九分，止哭一次。明日困臥如醉，自晨至暮，猛然起走，索食，與母歌笑自得，頓釋所苦。繼與太白散、八正散等調一日，大瘥。恐暑天失所養，留五日而歸。戴人曰：此下焦約也，不吐不下，則下焦何以開？不令飲水，則小溲何以利？大抵源淸，則流淸也。

柏亭劉十三之子年六歲，病沙石淋，戴人以苦劑三涌之，以益腎散三下之，立愈。

鹿邑一閥閱家，有子二十三歲，病膏淋三年，鄉中醫不能治，往京師，徧訪，多作虛損，補以溫燥，灼以鍼艾，無少減。戴人曰：『惑蠱之疾也，亦曰白淫，實由少腹熱，非虛也，可以涌以泄。』其人以時暑，憚其法峻，不決者三日。浮屠一僧曰：『予以暑病，近覺頭痛。』戴人曰：『亦可涌，願與君同之，毋畏也！』於是涌痰三升，色如黑礬汁，內有死血并黃綠水，又瀉積穢數行，尋覺病去。方其來時，面無人色，及治畢，次日面如醉。戴人慮其暑月路遠，又處數方，使歸以自備云。

丹溪心法曰：一人便濁經年，或時夢遺，形瘦，作心虛主治，用珍珠粉丸和定志丸，服而愈。

除房室思欲之事，固精不洩，可保身矣。

又法。側身曲臥戌亥之間，一手兜外腎，一手搓臍下八十一次，然後換手，每手各九次，兜搓九日見效，八十一日成功。

保生祕要曰：白濁白帶，導引法，腎俞氣海各掐九九，擦之亦然，兼運後功。

運功，用雙手抱兩膝，吹吸，念臍下，繼尾閭升氣降回，吸而咽之。

凡白濁，以兩手抱兩膝，吹而吸之，念臍而坐，行久即愈。此要升氣而後降之，吹而咽之。有一種煩亂，其心志須定神而後可行。白帶與痢同證，淋與白濁同法，蓋濁之不愈成淋，二種俱是氣滯與心勞。

夢遺漏精導引法，用大頸壺盧一箇，口上安帶得法，套陽具如意睡去，如陽物每夜覺起時，勿失其候，急起煖衣提運三十六足數，運散四肢，照此勤心行之，永無患矣。

運功，常要守靜，存心念臍，勿令弛放，後意想一條水下膀胱，繼尾閭分行二路，上兩腎分左右運收臍輪，臨臥時摩擦足心及腎腧穴，曲一足而側臥，精自固矣。

外法，中夜盤坐，先摩兩足心，次摩兩腎腧，安神靜心，伏枕縮足而臥，精自不遺。

小便時，以右脚踏左足肋，面向右肩者三，待小便畢，面又向左肩者三，或陽動，顧臍念令兩盤縮，其精自不洩。

自汗盜汗，兼遺精導引法，先念臍想火於內旋轉，又以手覆臍念次，想臍下一條水下膀胱上尾閭，又至背穿出心頭洗之，非遺精不用行臍下一條水法。

醫案

[illegible]安

醫學綱目曰：一男子[illegible]腰熱遺精，用[illegible]遺也。

一壯年男子夢遺白濁，少腹有氣衝上，每日腰熱，卯作酉涼，腰熱作則手足冷，前陰無氣，腰熱退則手足溫。又旦多下氣，暮多噫，時振，隔一旬二旬必遺，脈且弦滑而大，午洪大。予知其有鬱滯也，先用沉香和中丸大下之，次用加減八物湯吞滋腎丸百粒，或稍與蛤粉等澀藥則遺與濁反甚，或一夜二遺。遂改用導赤散大劑煎湯服之，遺濁皆止，漸安。

一中年男子夢遺，醫或與澀藥反甚，連遺數夜。愚先與神芎丸大下之，却製此猪苓丸服之，皆得痊安。

愚壯年得夢遺證，每四五十日必一遺。累用鳳髓丹，河間秘眞丸，雖少效，終不除根；後改用菖蒲，遠志，韭子，桑螵蛸，益智，酸棗仁，牡蠣，龍骨，瑣陽等劑爲丸，服之良愈。

一中年男子夢遺，以珍珠粉丸等藥與服，了無一效，亦以遠志菖蒲等劑服之，隨手而愈。

王元珪虛而泄精，脈弦大，累與加減八物湯，吞河間秘眞丸，及珍珠粉丸，其泄不止。後用五倍子一兩，茯苓二兩爲丸服之，良愈。此則五倍子澀脫之功，敏於龍骨牡蠣也。

醫宗必讀曰：邑宰嚴知非患淋經年，痛如刀錐，凡淸火疎利之劑，計三百貼，病勢日甚。歲暮來就診，余曰：兩尺數而無力，是虛火也。從來醫者皆泥痛無補法，愈疎通則愈虛，愈虛則虛火愈熾。』遂以八味地黃丸料，加車前，沉香，人參服八劑，痛減一二，而頻數猶故，原醫者進云『淋證作痛，定是實火，若多溫補，恐數日後必將悶絕，不可救矣。』知非疑懼，復來商之。余曰：『若不宜溫補則服藥後病勢必增；今既減矣，復何疑乎？』朝服補中益氣湯，晚服八味丸，逾月而病去其九，更倍用參芪，十四日而霍然矣。

大司寇杜完三夫人淋瀝兩載，靡藥不嘗，卒無少效。余診之，見其兩尺沉數，爲有瘀血停留，法當攻下。因其年高，不敢輕投，但於補養氣血之中加琥珀牛膝，此等緩劑，須以數十劑收功，而夫人躁急求功，再劑不效，輒欲更端，遂致

一婦人年近六十，形肥奉養膏粱，飲食肥美，中焦不清，濁氣流入膀胱，下注白濁。用二陳去痰，加升麻柴胡，升胃中清氣，加蒼朮去濕，白朮補胃，全在活法。服四貼後，濁減大半，却覺胷滿，因柴胡升麻升動胃氣，痰阻滿悶，又用本湯加炒麯白朮香附而痊。若素無痰者，雖升動不滿也。

鎮守萬戶蕭伯善便濁精滑不禁，百藥不效，與試倒倉法而安。

朱郎小便淋痛，脈左大右濇，此爲勞傷經血，勿作淋治，可補血行肝經滯血自愈。用生地，當歸，赤芍，杜牛膝各一錢；川芎，條芩，甘草梢各三分，陳皮，木通各五分，黃蘗二分炒，紅花豆大，以桃仁泥研滑石同煎，待淋病退，去滑石，桃仁，杜牛膝，木通，入川牛膝代木通，分兩倍之而痊。

衞生寶鑑曰：至元己巳，上都住，夏月，太保劉仲晦使引進史柔明來曰：近一兩月作伴數人皆有淋疾，是氣運使然，是水土耶？予思之，此間別無所患，此疾獨公所有之，殆非運氣水土使然。繼問柔明，近來公多食甚物？曰『宣使賜木瓜百餘對，遂多蜜煎之，每客至以此待食，日三五次。』予曰『淋由此也。內經曰：酸多食之令人癃，可與太保言之，奪飲則已。』一日，太保見予問曰：『酸味致淋，其理安在？』予曰『小便主氣。鍼經云：酸入於胃，其氣濇以收，上之兩焦，弗能出入也，不出則留胃中，胃中和溫則下注膀胱之胞，胞薄以儒，得酸則縮綣，約而不通，水道不行，故癃而濇，乃作淋也。』又曰：『陰之所生，本在五味，陰之五官，傷在五味，五味口嗜而欲食之，必自裁制，勿使過焉；五味過則皆能傷其正，豈止酸味耶？』太保歎曰『凡爲人子，不可不知醫，信哉！』

中統三年六月中，黃明之小便淋，莖中痛不可忍，相引脅下痛，制方服之大效，用人參五分，茯苓去皮四分，川楝子去核剉炒，生甘草各一錢，元胡索七分，澤瀉，柴胡，當歸梢，琥珀各三分，九味㕮咀，都作一服，用長流水三盞煎至一盞，去粗，溫服，空心食前，尋愈。

醫學正傳曰：蓮塘朱顯二里病遺精潮熱，不起牀三月矣，召予治。脈之左右寸關皆浮虛無力，兩尺洪大而軟，與補

一男子白濁夢遺，口乾作渴，大便閉澀，午後熱甚，用補中益氣加芍藥，元參，并加減八味丸而愈。

舉人陳履賢色慾過度，丁酉孟冬發熱無時，飲水不絕，遺精不止，小便淋瀝。或用四物芩連之類，前證益甚，更加痰涎上湧，口舌生瘡。服二陳黃蘗知母之類，胷膈不利，飲食少思，更加枳殼，香附，肚腹作脹，大便不實，脈浮大，按之微細。余朝用四君爲主，佐以熟地，當歸，夕用加減八味丸，更以附子唾津調搽湧泉穴，漸愈。後用十全大補湯，其大便不通，小腹作脹，此直腸乾澀，令猪膽通之，形體殊倦，痰熱頓增。急用獨參湯而安，再用煎藥而愈。但勞發熱無時，其脈浮洪。余謂其當愼起居，否則難治。彼以余言爲迂，至乙巳夏復作，乃服四物黃蘗知母而歿。

一男子食少胷滿，手足逆冷，飲食畏寒，發熱吐痰，時欲作嘔。自用淸氣化痰及二陳枳實之類，胷腹膨脹，嘔吐痰食，小便淋漓。又用四苓，連蘗，知母，車前，小便不利，諸病益甚。余曰：「此脾胃虛寒無火之證，故食入不消而反出。」遂用八味丸補火以生土，用補中益氣加薑桂培養中宮，生發陽氣，尋愈。

司馬李梧山莖中作痛，小便如淋，口乾唾痰。此思色精降而內敗，用補中益氣六味地黃而愈，

下堡顧仁成年六十有一，痢後入房，精滑自遺，二日方止。又房勞感寒，怒氣，遂發寒熱，右脅痛連心胷，腹痞，自汗盜汗如雨，四肢厥冷，睡中驚悸，或覺上升如浮，或覺下陷如墜，遂致廢寢。或用補藥二劑，益甚，脈浮大洪數，按之微細。此屬無火虛熱，急與十全大補，加山藥，山茱萸，丹皮，附子一劑，諸證頓愈而痊。此等元氣，百無一二。

一儒者口乾發熱，小便頻濁，大便祕結，盜汗夢遺，遂致廢寢。用當歸六黃湯二劑，盜汗頓止，用六味地黃丸，二便調和，用十全大補湯及前丸，兼服，月餘而悉愈。

古今醫統曰：鄭憲使之子年十六，生七箇月後得淋病，五七日必一作，其發則大痛，水道下如漆如粟者一盞方定。脈之輕則濇，重則弦，視其形瘦而長，色靑而蒼。意其必因其父服熱藥，遺熱在胎，留於子之命門而然，遂以紫雪和黃蘗末丸，梧桐子大，曬乾，熱湯下百丸，半日又下二百丸，食物壓之。又半日，痛大作連腰腹，水道乃行，下漆如粟者

痼疾。

文學顧以功科試南都，歸即患精滑，小便後及夢寐間俱有遺失，自服金櫻子膏，經月不驗。問治於余。余曰：『氣虛而神動，非遠志丸不可。』服十日而減半，一月而全愈。

武科張甯之稟質素強，縱飲無度。忽小便畢有白精數點，自以為有餘之疾，不肯醫治，經三月以來，雖不小便，時有精出，覺頭目眩運。醫者以固精澀脫之劑，治療二月，略不見功。迎余治之，但見六脈滑大。此因酒味濕熱下干精臟，遂以白朮，茯苓，橘紅，甘草，乾葛，白蔻加黃蘗少許，兩劑後即效，不十日康復如常。

儒者錢用賓色慾過度，夢遺精滑。先服清相火之劑，不效；繼服固澀之劑，又無效。求余治之，余以玉華白丹濃煎人參湯送二錢，二服後稍固，兼進六味地黃丸，加蓮鬚，芡實，遠志，五味子，凡一月而愈。

光祿卿吳伯玉閉精行房，時有文字之勞，患白濁，莖中痛如刀割。自服清火疎利之劑，不效，改服補腎之劑，又不效。商治於余，余曰：『敗精久畜，已足為害，况勞心之餘，水火不交，坎離順用也！』用萆薢分清飲加茯神，遠志，肉桂，黃連，四劑即效。兼服補中益氣，六味地黃丸，半月而安。後因勞復發，但服補中益氣一二劑即愈。

歸德郡侯李易齋患白濁，服五苓散數劑無功。余診之，兩尺大而濇，是龍火虛炎，精關竅道，用牛膝，茯苓，黃蘗，麥門冬，山藥，遠志，細辛，甘草，十劑而安。

薛己醫按曰：少宰汪涵齋頭運白濁，余用補中益氣，加茯苓，半夏，愈而復患腰痛，用山藥，山茱萸，五味，萆薢，遠志，頓愈。又因勞心盜汗，白濁，以歸脾湯加五味而愈。後不時眩運，用八味丸全愈。

一男子素遺精，腳跟作痛，口乾作渴，大便乾燥，午後熱甚，用補中益氣加芍藥，元參，及六味丸而愈。

司廳陳石鏡久患白濁，發熱體倦，用補中益氣加炮薑，四劑，白濁稍止，再用六味地黃兼服，諸證悉愈。

光祿柴黼庵因勞患赤白濁，用濟生歸脾，十全大補二湯間服而愈

司廳張檢齋陰囊腫痛，時發寒熱，若小腹作痛，則莖出白津，用小柴胡加山梔，膽草，茱萸，芎，歸而愈。

6513132 62.32
283
:21-30
图书集成医部全録 (21-30册)

62.32
283
:21-30

62.32
283
:21-30

6513132

注 意

1. 借书到期請即送还。
2. 請勿在书上批改圈点、折角。
3. 借去图书如有污損遺失等情形須照价賠償。

椀許，痛減十之八。後與陳皮一兩，桔梗木通各半兩，又下一合許而安。父得燥熱，尚能病子，況母得之者乎？

醫貫曰：予治鄭魯叔二十餘歲攻舉子業，四鼓猶未臥，遂病臥間玉莖但著被與腿，便夢交接脫精，懸空則不夢，飲食日減，倦怠少氣。此用心太過，二火俱起，夜不得睡，血不歸肝，腎水不足，火乘陰虛，入客下焦，鼓其精房，則精不得聚藏而欲走，因玉莖著物，猶厥氣客之，故作接內之夢。於是上補心安神，中調脾胃，升其陽，下用益精生陰固陽之劑，不三月而安。

昔吳茭山有治遺精得法，論治一男子因病後用心過度，遂成夢遺之患，多痰瘦削，諸醫以清心蓮子飲久服無效。余診其脈緊濇，知冷藥利水之劑太過，致使腎氣獨降，服此愈劇矣。予以升提之法，升坎水而濟於離火，降陽氣而滋陰血。次用鹿角膠人乳塡補精血，不踰月而愈。因思夢遺多端，難作一途而治，有因用心積熱而泄者，有因多服門冬茯苓車前知母黃蘗冷利之藥而泄者，有久泄玉門不閉而泄者。治療之法，積熱者當清心降火，冷利者溫補下元，腎氣獨降者當升提，使水火交而坎離自安定位矣。

圖書
椀許，痛
醫
食

中科院植物所图书馆
S0047952